

ԿԵՐԻ ԱՐՏԱԳՐԱՆՔԻ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑՆԵՐ

Հ. Գ. Բաաթկյան, Դ. Պ. Ջալալյան

ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆՈՒՄ

Մեր ուսպուրիկայի անասնաբուժություն կերային կաշուն բազմա-
տեսգծելու գործում մեծ նշանակություն ունի սիլոսային կուլտուրաների
մշակման տարածությունները քնդարձակումը: Կերային բույսերից առանձ-
նապես օրակյալ կանաչ կեր ու սիլոս է տալիս եգիպտացորենը:

Եգիպտացորենը լավ է աճում մեր սևասպուրիկայի տարրեր ջրջաննե-
րում: Մ. Գ. Թումանյանի, Գ. Խ. Աղաջանյանի, Հ. Գ. Կուրդինյանի, Հ. Տ.
Սմբատյանի, Հ. Թ. Մեսրոպյանի ուսումնասիրությունները, ինչպես նաև
առաջավոր կուլտուրատեխնիկաների փորձը ցույց են տալիս, թե Հայկական
ՍՍՌ-ի կլիմայական պայմանները օրքան նպաստավոր են այդ կուլտու-
րայի մշակության համար:

Մեր փորձերը կատարվել են Ստեփանավանի պայմաններում 1954 թ.
եգիպտացորենի Սպիտակահատ № 10, Հյուսիս-կովկասյան գեղահատ № 1,
Գրուշևսկի, Հյուսիս-գագոտյան սորտերի վրա: Մեր նպատակն է եղել
ուսումնասիրել եգիպտացորենի բույսերի փորձադիմը, նրանց աճման քն-
թացքը, ինչպես նաև կենսականությունը Ստեփանավանի պայմաններում
ցանքի տարրեր ժամկետներում՝ 20/IV, 14/V, 28/VII 1954 թ.:

Ինչպես ցույց են տալիս նախնական ուսումնասիրությունները (աղ. 1),
եգիպտացորենի բույսերը Ստեփանավանի պայմաններում ինտենսիվ կերպով
սկսում են աճել հուլիս և օգոստոս ամիսներին: Այսպես օրինակ, Սպիտա-
կահատ № 10 սորտի բույսերի բարձրությունը 14/V—1954 թ. ցանքի գեպ-
քում 15/VI եղել է 7 սմ, տերևների երկարությունը՝ 13,5 սմ, տերևների լայ-
նությունը՝ 1,7 սմ, (չափվել է տերևի ամենաբարձր մասը), 30/VI նույն հա-
ջորդականությամբ եղել է 15,5 սմ, 28,4 սմ, 3,4 սմ, 25/VI 69 սմ, 52,9 սմ,
5,3 սմ, 25/VIII 115 սմ, 62,3 սմ, 6,5 սմ: Նման աճման տեմպ մենք
տեսնում ենք նաև Հյուսիս-կովկասյան № 1, Գրուշևսկի և Հյուսիս-գագոտ-
յան սորտերի մոտ: Եվ այդ հասկանալի է. հուլիս և օգոստոս ամիսներին
եղանակները առաքանում են, ցերեկվա տեմպությունը երկարում է, եգիպ-
տացորենն էլ սկսում է ավելի արագ աճել և տալ հուրաններ ու կողեր:

Բազմաթիվ հետազոտողներ ցույց են տվել, որ ցանքի համար ստան-
դարտ ժամկետների կիրառումը և շտապողականությունը վնաս են հասց-
նում բույսերի բերքատվությանը: Հատկապես այդ տեղի է ունենում այն
գեպքում, երբ հաշվի չեն առնվում տվյալ շրջանի կլիմայական պայման-
ները:

Նույնը տեսնում ենք նաև մեզ մոտ հեղիտացորենի տարրերի ժամկետների ցանքի ղեկավարում: Այսպես, օրինակ, երբ Սպիտակահատ № 10 սորտը (ազ. 2) ցանվել է 20/IV—54թ., բույսերի միջին բարձրությունը բեր-

Աղյուսակ 1

Եղիտացորենի բույսերի ուսումնասիրությունը աճման տարրեր շրջաններում

1 9 5 4 թ.

Սորտերի անունները	15/VI			30/VI			25/VII			25/VIII		
	բույսի բարձր. սմ-ով	տերևի լայն. սմ-ով	երկար. տերևի սմ-ով	բույսի բարձր. սմ-ով	տերևի լայն. սմ-ով	երկար. տերևի սմ-ով	բույսի բարձր. սմ-ով	տերևի լայն. սմ-ով	երկար. տերևի սմ-ով	բույսի բարձր. սմ-ով	տերևի լայն. սմ-ով	երկար. տերևի սմ-ով
Սպիտակահատ № 10	7,0	1,7	13,5	15,5	3,4	28,4	69	5,3	52,9	115	6,5	62,
Հյուսիս-կովկասյան ղեղնահատ № 1	6,0	1,6	12,3	16,0	2,8	28,4	100	8,4	79,0	165	9,4	81,
Գրուշեակի	4,7	1,5	12,7	16,0	3,5	30,2	100	9,0	79,9	150	9,0	82,
Հյուսիս-զաղուսյան	7,2	1,8	18,0	16,0	3,5	44,0	120	10,0	60,0	105	11,2	65,

քահավաքի ժամանակ (25/IX) եղել է 125 սմ, կշիռը կողրերի հետ միասին 277 գ, մեկ կողրի կշիռը՝ 111 գ, կողրերի երկարությունը՝ 18 սմ, խակ եր ցանքը կատարվել է 14/V—54 թ., նույն հաջորդականությունում եղել է 15 սմ, 408 գ, 160 գ, 20 սմ: Նման տարրերություններ մենք տեսնում ենք նաև ուսումնասիրվող մյուս 3 սորտերի մոտ (ազ. 2):

Աղյուսակ 2

Եղիտացորենի բույսերի աճման ցուցանիշները ցանքի տարրեր ժամկետներում

1 9 5 4 թ.

Սորտերի անունները	Ցանքի ժամկետը	Բույսի բարձրությունը սմ-ով	Բույսի կշիռը գ-ով	Կողրի կշիռը գ-ով	Կողրի երկարությունը սմ-ով	Կանաչ մասի քանակությունը գ/հ
Սպիտակահատ № 10	20/IV	125	277	111	18	110,8
»	14/V	150	408	160	20	163,2
Հյուսիս-կովկաս. ղեղնահատ № 1	20/IV	190	619	92	18	247,6
»	14/V	210	764	93	18	305,6
Գրուշեակի	20/IV	170	515	107	16	206,0
»	14/V	180	696	169	19	278,4
Հյուսիս-զաղուսյան	20/IV	130	325	153	17	130,0
»	14/V	150	439	166	17	175,6

Նշանակում է, հեղիտացորենի ցանքի ժամանակ պետք է անպայման հաշվի առնել ավելի շրջանի պայմանները, քանի որ, միևնույն է, վա ցանքի ղեկավարում սերմերը երկար ժամանակ մնալով խոնավ հողի մեջ, ո են ծլում և բույսերն էլ ունենում են ոչ բարձր կենսականություն:

Պետք է հաշվի առնել նաև այն, թե մեկ համար խնչն է ավելի կա բերք՝ կանաչ մասսան սիրտի համար, թե հատիկները, սրովհետև կան սոր

տեր, որոնց կողմերի կշիռը բարձր է, և կան սորտեր էլ, որոնց վեգետատիվ մասսայի կշիռն է բարձր. օրինակ՝ Հյուսիս-կովկասյան № 1 սորտի ամբողջ բույսը կշռում է 764 գ, որից 93 գ. կողմի կշիռն է, Գրուշևսկի սորտի բույսը կշռում է 696 գ, որից 169 գ. կողմի կշիռն է, իսկ Հյուսիս-կասպյան սորտի բույսերն իրենք ունեն ցածր կշիռ՝ 439 գ, որից 166 գ կազմում է միայն կողմի կշիռը (ազ. 2):

Եթե ստացված տվյալները վեր ածենք մեկ հեկտարից ստացվող կանաչ մասսայի, ապա կտեսնենք, որ ուսումնասիրվող սորտերի մոտ (14/V 54 թ. ցանքսի ղեկքում) այն կազմում է 163,2—305,6 ց/հ. Իհարկե, այս քանակություներն խոսում են մեծ չէ, բայց ցույց է տալիս, որ նախացանքային և հետցանքային ագրոտեխնիկական կանոնները ճիշտ կիրառելու, բույսերը լավ խնամելու և հողը պարարտացնելու ղեկքում հնարավոր կլինի եզրկատարներին կանաչ մասսայի բերքը հասցնել մինչև 400 ց/հ:

Աղյուսակ 3

Եզրկատարների կանաչ մասսայի բերքը խոզանացանի ղեկքում

1 9 5 4 թ.

Սորտերի անունները	Բույսերի բարձրություն սմ-ով	Բույսերի կշիռը գ-ով	Կանաչ մաս- սայի բերքը ց/հ
Սպիտակահատ № 10	54	196	78,4
Հյուսիս-կովկասյան ղեկքահատ № 1	66	185	74,0
Գրուշևսկի	64	185	74,0
Հյուսիս-կասպյան	64	137	54,8

Մեզ հետաքրքրում էր նաև այն հարցը, թե ամռան ցանքի ղեկքում եզրկատարների բույսերը ինչպես կաճեն Ստեփանավանի պայմաններում: Դրա համար 28/VII—54 թ. անջրդի պայմաններում ցանեցինք նույն 4 սորտերի հատիկները: Ցանքից հետո տեղացին ոչ տևական անձրևներ (Ստեփանավանի պայմաններում օգոստոս ամսին անձրևները սակավադեպ են լինում), որոնք օգոստոս ամսի բարձր ջերմաստիճանի հետ միասին նպաստեցին հատիկների արագ ծրմանը և բույսերի ինտենսիվ աճմանը: Սակայն սեպտեմբեր ամսին բույսերի աճը մասամբ դանդաղեց, որովհետև ցերեկվա, և գիշերվա ջերմաստիճանների միջև տարբերությունները զգալիորեն մեծացան:

Այստեղ հետաքրքիր է նշել, որ երբ ցանքը կատարվել է 28/VII 54 թ., ապա բույսերն ամբողջ արագ են աճել, քան այն ղեկքում, երբ ցանքը կատարվել էր 20/IV:

Բացի այդ, թեև բույսերը ցածր էին, բայց նրանց մի մասն սկսել էր հուրանակալել, իսկ որոշ բույսեր էլ արդեն սաղմնային վիճակում ունեին փոքր կողերը:

Բերքահավաքից (28/IX—54 թ.) հետո մենք ունեինք 54—66 սմ բարձրությամբ բույսեր, որոնց կշիռը տարբեր սորտերի մոտ կազմում էր 137—196 գ, որը եթե վեր ածենք 1 հեկտարի կատարվող 54,8—78,4 ց/հ կանաչ մասսա, (ազ. 3): Նախնական հետազոտությունները ցույց են տա-

լիս, որ լավ մշակման դեպքում եգիպտացորենի խողանացանից ստացվող կանաչ մասսայի քանակը Ստեփանավանի պայմաններում կարելի է հասցնել մինչև 100—120 ց/հ:

Իհարկե, այս քանակն առանձնապես մեծ չէ, բայց եթե բույսերը թողնվեն մինչև այն ժամանակ, երբ սկսվում են ցրտահարությունները անկասկած, վեգետատիվ մասսան կավելանա և մեկ հեկտարից ստացվող կանաչ մասսայի կշիռը կմեծանա:

Պետք է նշել նաև, որ եգիպտացորենի ամառային ցանքը կարելի է կիրառել Ստեփանավանի շրջանում միայն այն դեպքում, եթե ցանվի կարտոֆիլի որևէ վաղահաս սորտ, ինչպես, օրինակ, Էպրոս սորտն է, որի պալարները հասունանում են հուլիս ամսվա ընթացքում:

Ենեկով վերը բերված տվյալներից, կարելի է անել հետևյալ եզրակացությունը.

Եգիպտացորենը ճիշտ ժամկետին ցանելու և մշակություն ժամանակ ագրոտեխնիկայի կանոնները ճիշտ ու ժամանակին կիրառելու դեպքում Ստեփանավանի պայմաններում կարելի է ստանալ ինչպես կոդերի, այնպես էլ կանաչ մասսայի լավ բերք: Եգիպտացորենի ամռան ցանքի դեպքում ստացվող կանաչ մասսայի քանակը մեծ չէ: Լավ սորտերի, ինչպես նաև հիբրիդային սերնդի ընտրություն դեպքում է՛լ ավելի կարելի է բարձրացնել սովորական և խողանացան եգիպտացորենի բերքը Ստեփանավանում:

Վ. Մ. Մոլոտովի անվան
Երևանի Պետական համալսարանի
Կենսաբանական ֆակուլտետ,
Գենետիկայի և զարգինիզմի ամբիոն:

Ստացվել է 20 11 1955 թ.

Г. Г. Батиян, Д. П. Чолахян

Изучение культуры кукурузы в Степанаване

Резюме

Опыты проводились в 1954 г. в условиях Степанавана над сортами кукурузы: Белозерная № 10, Северо-Кавказская желтозерная № 1, Грушевая, Северо-даготская. Посев производился в три срока: 20.IV, 14.V и 28.VII—54 г.

Исследования показывают, что по сравнению с посевом 20.IV—при посеве 14.V был получен высокий урожай кукурузы. При обыкновенной обработке посева урожай зеленой массы составляет 163,2—305,6 ц/га.

28.VII был произведен также пожнивной посев. урожай убранный 28.IX, и составил 54,8—78,4 ц/га зеленой массы. Опыты показали, что после уборки раннеспелых сортов картофеля (например сорта Эпрон) в Степанаване можно рекомендовать пожнивной посев кукурузы для получения второго урожая.

Наши предварительные исследования показывают, что при хоро-

шей агротехнике и ухода за растениями можно получить от весеннего посева в Степанаванском районе до 400 ц/га зеленой массы кукурузы, а при пожнивном посеве вес зеленой массы можно довести от 100 до 120 ц/га.

Получить высокий урожай зерна и зеленой массы кукурузы в Степанаване с целью увеличения кормовых ресурсов животноводства можно путем подбора соответствующих сортов кукурузы, а также семенами гибридного происхождения.