

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

С. Б. ПАПАНЯН

ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ СИРИЙСКОЙ ЧЕСНОЧНИЦЫ
(*Pelobates syriacus* Boettger) В ВОСТОЧНОМ ЗАКАВКАЗЬЕ

Распространение сирийской чесночницы (*Pelobates syriacus* Boettger) в пределах восточного Закавказья до настоящего времени еще недостаточно изучено. После того как этот вид был описан в 1889 г. Бётгером [3] из Сирии, Мертенс [5] отметил его для Ленкорани, а Дельвиг [4] для окр. Тбилиси. Вторично в окр. Ленкорани сирийскую чесночницу обнаружил в 1942 г. Алекперов [1]. Указанными данными исчерпывались все сведения о распространении этого вида в пределах СССР.

В 1950 году сирийская чесночница была впервые обнаружена нами [2] на территории Армянской ССР в окр. селения Джрвеж близ Еревана и в окр. Еревана. В 1953 г. она была добыта в окр. селения Мартирос, Азизбековского района, Армянской ССР.

В этих местах чесночница обитает в зоне каменистой полупустыни, вблизи непересыхающих мелких водоемов.

Весной 1955 г. экспедицией Зоологического института АН Армянской ССР сирийская чесночница в большом количестве была обнаружена в окр. г. Нахичевана. По словам И. С. Даревского, который их обнаружил, чесночницы были пойманы в глубоких ямах с грунтовой водой, расположенных в зоне полупустыни неподалеку от небольших постоянных водоемов. Множество высохших чесночниц было также найдено в заброшенных окопах на берегу р. Аракс. Экземпляры чесночниц, добытых в Армении и Нахичеванской АССР, хранятся в Зоологическом институте АН Армянской ССР.

Находки последних лет показывают, что ареал сирийской чесночницы в пределах восточного Закавказья охватывает, повидимому, всю долину реки Аракс и долины ее притоков, по которым она проникает в каменистую полупустыню предгорий до высоты 1900 м над ур. моря.

Поскольку существование сирийской чесночницы связано с наличием постоянных водоемов, необходимых для ее размножения, распространение этого вида в долине Аракса носит спорадический характер (см. карту).



Рис. 1. Карта распространения сирийской чесночницы в восточном Закавказье

Ս. Բ. ՊԵՊԵՆՅԱՆ

ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍՈՒՄ ՍԻՐԻԱԿԱՆ ՍԽՏՈՐԱԳՈՐԾԻ
(*Pelobates syriacus* Boettger) ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ու մ

Արևելյան Անդրկովկասում սիրիական սխտորագործի տարածումը մինչև վերջերս թերի է ուսումնասիրված:

Սիրիական սխտորագործին առաջին անգամ նկարագրել է Բյոտգերը 1889 թվականին՝ Սիրիայից, Դելվիդը՝ Թրիփսիից, Մերտենսը՝ Լենքորանից, իսկ Երկրորդ անգամ Լենքորանից նշել է Ալեքսանդրովը 1942 թվականին: Սիրիական սխտորագործը Հայկական ՍՍՌ-ում առաջին անգամ նկարագրվել է մեր կողմից՝ Երևանի և Ջրվեժ գյուղի շրջակայքից: 1953 թվականին հայտնաբերվել է Ադիգրեկովի շրջանի Մարտիրոս գյուղի շրջակայքում:

1955 թվականին Հայկական ՍՍՌ Դիտությունների ակադեմիայի Կենդանաբանական ինստիտուտի կողմից կազմակերպված էքսպեդիցիայի մասնակից՝ ասպիրանտ Դարևսկին Նախիջևանի շրջակայքից հավաքել է զգալի քանակությամբ սիրիական սխտորագործեր:

Այսպիսով, վերը նշված տվյալները ցույց են տալիս, որ սիրիական սխտորագործի տարածման արեալն արևելյան Անդրկովկասում, հիմնականում, ընդգրկում է ամբողջ Արաքս գետի և նրա վտակների հովիտը, հասնելով 1900 մ բարձրության:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Алекперов А. М. Материалы по изучению фауны земноводных (Amphibia) Азербайджана, Известия АН АзССР, 11, 1949.
2. Татаринов Л. П. и Папанян С. Б. О нахождении в Армянской ССР сирийской чесночницы (*Pelobates syriacus* Boettger), Доклады АН АрмССР, том XIV, 5, 1951.
3. Boettger O. Ein neuer *Pelobates* aus Syrien. Zool. Anzeig. Bd. XII, 1889.
4. Delwig W: Eine neue Art der Gattung *Pelobates* Wagl. aus dem zentralen Transkaukasus. Zool. Anz. Bd. 75. 1928.
5. Mertens R. Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Pelobates* Wagl. Senckenbergiana Bd. V. 1923.