

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Я. И. МУЛКИДЖАНЫ

НОВЫЙ ВИД СМОРОДИНЫ ИЗ ФЛОРЫ АРМЕНИИ  
И КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ К КРЫЖОВНИКУ  
ОТКЛОНЕННОМУ

Во время обработки материалов по семейству крыжовниковых, в связи с составлением флоры Армении нами описан новый вид смородины (*Ribes achurjani* Mulk.) из бассейна р. Ахурян в сев. Армении и приводятся критические замечания к крыжовнику отклоненному (*Grossularia reclinata* (L.) Mill.). Ниже приводится описание нового вида.

1. *R. achurjani* Mulk. sp. nov., смородина ахурянская.

Невысокий до 0,3—0,7 м кустарник. Кора ветвей серая, отслаивающаяся вертикальными тонкими, пленчатыми до 1—3 мм шир. пластиночками. На молодых побегах кора светлобурая. Побеги в узлах, усажены двумя, достигающими 1—2 мм длины, тонкими у основания расширенными шипиками, которые на старых побегах и ветвях отсутствуют. Почки продолговато-яйцевидные, небольшие, до 2 мм дл., покрыты 3 светлобурыми, яйцевидными, наверху коротко-острыми чешуйками, 2 наружные едва достигают  $\frac{1}{2}$  длины почки. Листья кожистые, обратнойцевидные, трехлопастные с клиновидным основанием, небольшие 1,5—2,0 см дл., 1,5 см шир. Средняя из трех лопастей едва превышает боковые; в верхней части лопасти с несколькими (до 3) зубцами или цельнокрайние. Листья сверху серовато-зеленые, снизу светлозеленые, голые, по краям листьев и черешкам с единичными коротко-стебельчатыми железистыми волосками. Прицветнички линейно-ланцетные до 3—4 мм дл. Цветки мелкие в кистях по 3—5, до 2,5 мм в диаметре, верхние сближенные, колесовидные. Цветоножки, кисти, прицветнички голые, без железистых волосков. Плоды мелкие на ножках 2—2,5 мм дл., по 2—3 в коротких, до 2 см дл. кистях. Ягода шаровидная, 2—3 мм, красная, голая, мало съедобная.

Армянская ССР. Агинский район, каменистая горная степь в 1,5 км вост. с. Баграван. 1950 г., собр. Ш. Асланян. Тип хранится в гербарии им. В. Л. Комарова Ботанического института АН АрмССР, Ереван.

Ареал: Кавказ, южн. Закавказье, сев.-зап. подошва г. Арагац в басс. р. Ахурян (Арпачай).


Просмотренные гербарные образцы: Армянская ССР, Агинский район, 1,5 км восточнее с. Баграван, 1950 г. Ш. Асланян; окр. г. Леникан, ущ. р. Ахурян, скалы, 1954 г., Г. Токмаджян (3 листа).

У экземпляров, перенесенных в условия культуры, листья несколько увеличиваются в размерах, достигая 3 см дл. и шир., принимают округло ромбическую форму.

Со слов Г. Токмаджяна растения, пересаженные им в г. Ленинакане на приусадебный участок, хорошо развиваются, достигли высоты 1 м. Прекрасно переносят стрижку.

Смородина может быть рекомендована для устройства невысоких бордюров в районах горно-степной зоны.

Frutex ad 0,3—0,7 m altus. Folia coriacea, obovata, triloba, basi cuneata, parva, 1,5—2,0 cm longa, 1,5 cm lata, lobo medio lateralibus uix longiore, omnibus parte superiore dentatis (dentibus ad 3) vel integerrimis, supra grosseolo viridia, subtus pallide viridia, glabra, margine et ad petiolos pilis glandulosis breviter cauliculatis solitariis praedita; bracteolae lineari-lance-



olatae, ad 3—4 mm longae; Racemus parviflorus, flosculis 3—5, ad 2,5 mm in diametro, superioribus approximatis, rotalis, unacum pedunculo et bracteolis glaber, pilis glandulosis nullis. Fructus parvi pedunculis 2—2,5 mm longis, bini-terni in racemis brevibus ad 2 cm longis congesti; bacca ad 2—3 mm rubra glabra. Fructus, fere inedules.

Locus classicus: Armenia, districtus Agin; in steppis montanis lapidosis 1,5 km ad orientem a pago Bagravar 1950 Sh. Aslanjan legit.

Typus in herbarie nomine V. L. Comarovii Instituti Botanici in Erevan conservatur.

Area geographica: Caucasus; Transcaucasia australis ad pedem boreali — occidentalem montis Aragaz, in systemate fluminis Achurjan (Arpaczaj).

Specimina in herbario examinata. Armenia distr. Agin, 1,5 km ad orientem a pago Bagravar 1950 Sch. Aslanjan; in vicinitate opp. Leninakan, in luace fluminis Achurjan, in Saxis 1954 г. G. Tocmadzhan (3 folia) legit.

Planta, in opp. Leninakan ante decem annos transportata, in hortulo G. Tocmadzhanii optime evolvitur, supra 1 m alta est, in cultura folia majora, ad 3 cm longa et lata orbiculari-rhombea habet. Ad opus topiarium in regione montano-srepposa idonea est.

2. Наряду с широкораспространенной типичной формой крыжовника отклоненного (*Grossularia reclinata* (L.) Mill) в лесах Армении изредка встречаются экземпляры, все ветви которых в нижней части покрыты многочисленными, тонкими, длинными, до 5 см, слабо вниз направленными шипиками; на однолетних побегах шипики густо расположены по всей длине и значительно крупнее, до 7 мм, также слабо вниз направленные, светлокоричневые с красноватым оттенком. Листья небольшие, до 5 см шир. и 3,6 см дл. с зубцами, оканчивающимися железкой. Черешки листьев, особенно в нижней части, обычно покрыты очень длинностебельчатыми железистыми волосками.

От *G. reclinata* v. *horridum* Grossh., приводимого для Ардагана, описываемое растение отличается ареалом, нетолстыми и длинными колючками; меньшими размерами, некожистыми и неблестящими листьями.

От *G. acicularis* (Smith) Berger, распространенного в Ср. Азии, на Алтае, зап. и вост. Сибири и Монголии, оно отличается более крупными шипиками, шипами; более крупными, неблестящими снизу и просто-зубчатыми листьями; значительно, в 2 раза, меньшими размерами плодов и др.

Отличие нашего растения от вышеупомянутых произведено нами в соответствии с их описаниями, приведенными в литературе, и потому не может быть исчерпывающим. Достоверных экземпляров ни *G. reclinata* v. *horridum* Grossh, *G. acicularis* (Smith) Berger мы не видели.

Однако мы считаем, что наличие многочисленных шипиков на побегах и стеблях не может служить основанием для выделения его из *G. reclinata* в качестве самостоятельного вида или разновидности, тем более, что растение не имеет своего самостоятельного ареала. Встречается с типичной формой *G. reclinata* в лесах Закавказья: южная Армения (Джермук, Цахкадзор), центр. Закавказья (Военно-Грузинская дорога, Юго-Осетия).

## Հ. Ի. ՄՈՒԼՔԻՋԱՆԵՑԻԱՆ

ՀԱՂԱՐՃԵՆՈՒ ՆՈՐ ՏԵՍԱԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՅԼՈՐԱՅԻՑ  
ԵՎ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿՈԿՌՈՇԻ ՄԱՍԻՆ

## Ա մ փ ո փ ու մ

Հոգիածուս բերվում է՝ 1. Հաղարճենու մի նոր տեսակը՝ Ախուրյանի հաղարճենու — *Ribes achuriani* Mulk. նկարագրությունը: Հաղարճենու այդ նոր տեսակը, որը հավաքված է Աղինի շրջանի Ախուրյան գետի ջրավազանից, ունի հետևյալ առանձնահատկությունները. ա) 0,3—0,7 մ բարձրությամբ թուփ է, որի երիտասարդ ճյուղերի հանդույցներում տեղավորված են 2 մմ հասնող դույզ փշիկներ. բ) տերևները՝ եռարկալանի, հակառակ ձվաձև—սեպաձև հիմքով, միջին րկակը հավասար է կամ հաղիվ գերազանցում է կողքի րկակներին. գ) պտուղները թթու են, մանր, կարմրավուն, ունեն մինչև 3 մմ տրամագիծ:

2. Դիտողություններ կոկոռշի մասին: Այս տեսակի հազվագեղ հանդիպող նմուշների մոտ՝ Հայաստանից (Ջերմուկ, Ծաղկաձոր), Վրաստանից (Ռազմա-վիրական ճանապարհ), Հարավային Օսեթիայից ցողունները և ճյուղերը ծածկված են խիտ մուգ դարչնագույն փշիկներով, որոնք հասնում են մինչև 7 մմ երկարության, որպիսիք բացակայում են սովորական ձևերի մոտ:

Բերվում է նույնպես Արևելքում տարածված *Grossularia acicularis* և արևելյան Թյուրքիայի համար բնորոշ *G. reclinata* v. *horridum* տարրերությունները, որոնք նույնպես կրում են բազմաթիվ փշիկներ: