

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

И. С. ДАРЕВСКИЙ

НОВЫЙ ДЛЯ ФАУНЫ АРМЕНИИ ВИД ЯДОВИТОЙ ЗМЕИ
VIPERA KAZNAKOWI NIK.

Из 5 видов гадюк рода *Vipera*, распространенных в пределах Кавказа, для фауны Армянской ССР до настоящего времени были достоверно указаны только три: гюрза — *Vipera lebetina obtusa* Dwig., гадюка Радде — *Vipera raddei* Bttgr. и степная гадюка — *Vipera ursini renardi* Christ. [1, 6]*.

В 1954—1955 гг. экспедициями Зоологического института АН Армянской ССР в северо-западной Армении (Гукасянский район) на Кечутском хребте (Мокрые горы) было добыто три экземпляра нового для фауны Армении вида кавказской гадюки — *Vipera kaznakowi* Nik.

Змеи были пойманы автором совместно с энтомологом С. М. Хндзоряном на южных отрогах г. Легли, на высоте 2700—2800 м над уровнем моря, в сильно каменистой горно-ксерофитной степи.

Согласно П. В. Терентьеву и С. А. Чернову [2], ареал кавказской гадюки обнимает западный Кавказ и западное Закавказье на юг до Аджарии включительно. Наиболее близкие к границам Армении пункты находок этого вида расположены в Грузии в окр. Куганси [3], на Сурамском хребте и в окр. Душети [4]. Местонахождение кавказской гадюки в Армении оторвано, таким образом, от границ ее основного ареала в среднем на 150—170 км. В действительности же разрыв этот, по-видимому, гораздо меньше, так как герпетофауна обширной горной системы Аджаро-Ахалцихского хребта в южной Грузии изучена еще крайне недостаточно.

Новые находки кавказских гадюк интересны не только потому, что значительно расширяют ареал этого вида, перенося его границу в восточное Закавказье, но и представляют интерес с точки зрения герпетологической систематики.

Изучение морфологических признаков добытых в Гукасянском районе особей показывает, что они должны быть отнесены к форме *Vipera beghus dinnicki* Nik., описанной в качестве кавказского подвида обыкновенной гадюки в 1913 г. А. М. Никольским [7].

Поскольку неоднократно дискуссировавшийся в литературе вопрос о существовании обыкновенной гадюки в пределах Кавказа в настоящее

* Существующие указания на нахождение в пределах Армении рогатой гадюки *Vipera ammodytes* (L.) [1, 5, 6] основаны, вероятно, на ошибочной этикетировке экземпляров, происходящих якобы из Еревана.

время решен отрицательно [2], происходящие из разных мест Кавказского перешейка экземпляры, относимые ранее к виду *Vipera berus*, в настоящее время сведены в синонимы кавказской и, частично, степной гадюки. Что же касается подвида *V. berus dinnicki*, то он был без достаточных оснований отождествлен с номинальным подвидом [2].

Накопившийся за последнее время новый материал, и в частности находки, сделанные в Армении, подтверждают подвидовую самостоятельность рассматриваемой формы, за которой, однако, должно быть закреплено название *Vipera kaznakowi dinnicki* Nik. 1913. Армянские экземпляры этого подвида (2 ♀♀, 1 ♂) отличаются в частности следующими характерными признаками:

Кончик морды тупо закруглен, ее верхнебоковые края сглажены. Межчелюстной щиток касается двух апикальных щитков, расположенных на верхней поверхности морды (рис. 1¹). Ноздря прорезана в середине носового щитка, имеющего более или менее правильную квадратную форму (рис. 1²). Верхний край носомежчелюстного щитка несколько изогнут под прямым углом (рис. 1³).




Рис. 1. *Vipera kaznakowi dinnicki* Nik. Расположение щитков: 1—верхней поверхности головы, 2—носовой области, 3—роstralной области.

Щитки: А—межчелюстной, В—носомежчелюстной, В—носовой.

Тело сверху бурого или грязно-серого цвета с четкой зигзагообразной полосой, разбитой местами на отдельные сильно вытянутые поперек пятна.

На верхней стороне головы расположен более или менее четко выраженный иксообразный рисунок, теряющийся иногда на общем, почти черном фоне. Брюхо грязно-серое с черными пятнами, тесно расположенными на каждом брюшном щитке.

По ряду других признаков, в том числе по числу рядов туловищных чешуй и количеству брюшных и подхвостовых щитков, описываемые экземпляры не уклоняются от номинальной формы.

По совокупности своих морфологических признаков *Vipera kaznakowi*

dinnicki занимает таким образом промежуточное положение между кавказской и степной гадюками. Интересно, что в отличие от типичного подвида, живущего на облесенных горных склонах и на субальпийских лугах, гадюка Динника обитает в высокогорных степях, хотя поднимается, по-видимому, и в субальпийскую зону.



Рис 2. Распространение кавказской гадюки в Армении

● — пункты находок.

На основании имеющихся в настоящее время материалов судить о распространении *Vipera kaznakowi dinnicki* в пределах Кавказа трудно. Можно лишь отметить, что все известные пункты ее находок расположены по периферии ареала типичного подвида.

Экземпляры кавказских гадюк, добытых в Армении, хранятся в Зоологическом институте АН СССР и в Зоологическом институте АН Армянской ССР.

Зоологический институт
Академии наук Армянской ССР

Поступило 11 IX 1956 г.

Ի. Ս. ԴԱՐԵՎՍԿԻ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԱՈՒՆԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՕՁԻ ՄԻ ՆՈՐ ՏԵՍԱԿ

Ա. մ. փ. ո. փ. ո. լ. մ.

Հայկական ՍՍՏ Գիտությունների ակադեմիայի Կենդանաբանության ինստիտուտի կողմից 1954—1955 թթ. կադավերալիստ էքսպեդիցիան Հուկասյանի շրջանի Կեչուտի լեռներում, ծովի մակերևույթից մոտ 2800 մ բարձրության վրա հայտնաբերեց 3 անհատ Հայաստանի ֆաունայի համար թունավոր օձի մի նոր տեսակ՝ *Vipera kaznakowi* Nik. Այս 3 անհատի մորֆոլոգիական հատկանիշների ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ արանց պետք է համարել *Vipera berus dinnicki* Nik. ենթատեսակ, որը 1913 թվականին նկարագրված է եղել Ա. Մ. Նիկոլսկու կողմից: Քանի որ ներկայումս հաստատված է, որ *Vipera berus* հայտնաբերված չէ Կովկասում, ուստի այս ենթատեսակը պետք է անվանել *Vipera kaznakowi dinnicki* Nik. 1913:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Даль С. К. Животный мир Армянской ССР, т. 1, 1954.
2. Терентьев П. В. и Чернов С. А. Определитель пресмыкающихся и земноводных, 1949.
3. Ростомбеков В. Н. К герпетофауне Абхазии: материалы к фауне Абхазии. 117—121, 1939.
4. Джанашвили А. Г. Тр. Тбил. гос. у-та, т. 44, 141—160, 1951.
5. Никольский А. М. Пресмыкающиеся, т. II, Змеи, Фауна России, 1916.
6. Чернов С. А. Зоол. сборн. Арм. фил. АН СССР, в. 1, 77—194, 1939.
7. Никольский А. М. Пресмыкающиеся и земноводные Кавказа, 1913.