

II. Գ. ՍԵՄԵՐՋԱՆ

ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՍՈՐՏԵՐԻ ԵՎ ՀԻՐՐԻԴՆԵՐԻ
ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԱՇՏԱՎԱՅՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Տեխնիկական կուլտուրաների Հայկական դիտահետազոտական ինստիտուտում 1955 թվականին աշխատանք է տարվել եգիպտացորենի մի քանի սորտերի և հիրրիդների փորձարկման ուղղությամբ՝ Արարատյան դաշտավայրի սլայմանների հարմարված և բերքատու ձևերի հայտնաբերման նպատակով:

Փորձը դրվել է էջմիածնի և Հոկտեմբերյանի շրջաններում: Փորձարկման համար վերցվել են եգիպտացորենի հետևյալ սորտերը, հիրրիդները և հիրրիդային պոպուլյացիաները՝ Հոկտեմբերյանի տեղական պոպուլյացիա, էջմիածնի կարծր սպիտակ, հիրրիդային պոպուլյացիա Կրասնոդարսկայա 5/51, հիրրիդ Վիր—42, հիրրիդային պոպուլյացիա Կրասնոդարսկայա 4/50, հիրրիդային պոպուլյացիա Կրասնոդարսկայա 10/53, հիրրիդային պոպուլյացիա Կրասնոդարսկայա 1/49, հիրրիդ Կրասնոդարսկայա 4, Ստերլինգ, հիրրիդ Վիր 50, հիրրիդ Կրասնոդարսկայա 5, Լիմինգ:

Ցանքը կատարվել է ապրիլի երկրորդ կեսին էջմիածնում՝ Տեխնիկական կուլտուրաների Հայկական դիտահետազոտական ինստիտուտի կենտրոնական բազայում և Հոկտեմբերյանում՝ ինստիտուտի բամբակագործական դոնալ կայանում: Փորձը դրվել է 4 կրկնողությամբ: Յուրաքանչյուր կրկնողությունում ցանվել է՝ էջմիածնում՝ 10, Հոկտեմբերյանում՝ 12 սորտ և հիրրիդ, որոնցից ամեն մեկն զբաղեցրել է էջմիածնում՝ 43 քառ. մետր, Հոկտեմբերյանում՝ 61 քառ. մետր տարածություն: Ցանքը կատարվել է քառակուսի-քնային եղանակով, 70 սմ միջշարային և միջքնային տարածություններով: Բների մեջ բույսերի թիվը սահմանվել է, ելնելով փորձարկվող սորտերի և հիրրիդների վեգետացիայի տևողությունից: Ընդ որում վաղահաս ձևերի դեպքում բներում թողնվել են ավելի շատ բույսեր, քան ուշահասների դեպքում: Բույսերի խտությունը մեկ հեկտարի վրա տատանվել է 30000—50000, կախված սորտերից և հիրրիդներից:

Վաղահաս սորտերը, որոնք առաջացնում են համեմատաբար քիչ կանաչ մասսա, խիտ ցանքի դեպքում կարողանում են դրսևորել իրենց զարգացման պոտենցիալ հնարավորությունները և բարձր բերք տալ իսկ ուշահաս սորտերը, որոնք առաջացնում են կանաչ մասսայի հսկայական կուտակում, լավ են զարգանում համեմատաբար փոքր խտության դեպքում:

Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ի տվյալներից, էջմիածնի և Հոկտեմբերյանի շրջաններում ամենաբարձր բերքատվություն ունեցել է Վիր—42 միջզնային հիրրիդը: Չնայած այս հիրրիդի յուրաքանչյուր բույսը համեմատաբար ցածր բերք է տալիս (էջմիածնում՝ 148 գ, իսկ Հոկտեմբերյանում՝ 189,6 գ), բայց խիտ ցանքին հարմարված լինելու շնորհիվ, երկու շրջաններում էլ իր բերքատվությամբ զգալիորեն գերազանցում է փորձարկվող սորտերին, հիրրիդներին և հիրրիդային պոպուլյացիաներին:

Վիր—42-ը էջմիածնի շրջանում բերքատվությամբ ստանդարտին գերազանցում է 51,6⁰/₀-ով, իսկ Հոկտեմբերյանի շրջանում՝ 32,7⁰/₀-ով: Էջմիածնի շրջանում Վիր—42 հիբրիդից հետո առավել աչքի են ընկնում Կրասնոդարսկայա 4/50, Կրասնոդարսկայա 1/49 հիբրիդային սլոպուլյացիաները և Ստերլինգ սորտը, որոնք յուրաքանչյուր հեկտարից ստացված կողրերի բերքով գերազանցում են ստանդարտին (էջմիածնի կարծր սպիտակ) 8—14 ցենտներով:

Աղյուսակ I

Էջմիածնի և Հոկտեմբերյանի շրջաններում փորձարկվող սորտերի ու հիբրիդների բերքատվությունը

Սորտերը և հիբրիդները	Էջմիածին			Հոկտեմբերյան		
	Էջմիածնի շրջանում փորձարկվող հիբրիդները	հավելումը		Հոկտեմբերյանի շրջանում փորձարկվող հիբրիդները	հավելումը	
		կարգաթիվ	տոկոսներ		կարգաթիվ	տոկոսներ
Հոկտեմբերյանի տեղական սլոպուլյացիա . . .	—	—	—	71,4	—	—
Էջմիածնի կարծր սպիտակ	44,4	—	—	—	—	—
Հիբրիդային սլոպուլյացիա Կրասնոդարսկ. 5/51	—	—	—	76,4	5	7,0
Հիբրիդ Վիր—42	67,3	22,9	51,6	94,8	23,4	32,7
Հիբրիդային սլոպուլյացիա Կրասնոդարսկ. 4/50	53,8	9,4	22,2	57,9	13,5	19,0
Հիբրիդային սլոպուլյացիա Կրասնոդարսկ. 10/53	48,5	4,1	5,2	78,6	7,2	10,1
Հիբրիդային սլոպուլյացիա Կրասնոդարսկ. 1/49	52,3	7,9	17,8	68,2	3,2	4,5
Հիբրիդ Կրասնոդարսկայա 4	41,5	3,9	7,0	82,4	11	15,4
Ստերլինգ	55,1	10,7	24,1	57,9	13,5	18,9
Հիբրիդ Վիր—50	43,9	0,5	1,1	75,7	4,3	6,0
Հիբրիդ Կրասնոդարսկայա 5	26,2	8,2	18,5	87,7	16,3	22,8
Հիմինգ	31,1	13,3	30,0	83,8	12,4	17,4

Հոկտեմբերյանի, շրջանում բարձր բերքատու ձևեր են հանդիսացել Կրասնոդարսկայա 5, Կրասնոդարսկայա 4 հիբրիդները, Հիմինգ սորտը, Կրասնոդարսկայա 10/53 հիբրիդային սլոպուլյացիան, որոնք Հոկտեմբերյանի տեղական սլոպուլյացիայից բերքատու են 7—23 ցենտներով:

Չնայած Հոկտեմբերյանի տեղական սլոպուլյացիայի բարձր բերքատվությանը (71,4), մեկ հեկտարից ստացվող կողրերի բերքով նա նշված սորտերից ետ է մնում 7—16 ցենտներով, իսկ Վիր—42 հիբրիդից՝ 23 ցենտներով:

Եզրիպտացորենի սորտերի և հիբրիդների գնահատման համար կարևոր նշանակություն ունի բույսերի փարթամությունը: Որքան հզոր ու փարթամ է բույսը, այնքան շատ է նրանից ստացվող կանուչ մասնայի քանակը: Նկատի ունենալով այս, փորձի ընթացքում դիտողություններ են կատարվել բույսերի բարձրության, տերևների չափի և մի քանի այլ հատկանիշների ուղղությամբ: Դիտողությունների արդյունքները ամփոփված են աղյուսակ 2-ում:

Աղյուսակի տվյալները ցույց են տալիս, որ ինչպես էջմիածնի, այնպես էլ Հոկտեմբերյանի շրջանների պայմաններում փորձարկվող սորտե-

Եղիաշահորենի փորձարկվող սորտերի և հիբրիդների հզորությունը 1955 թ.

Փորձարկման վայրը	Է ջ Տ Ի ա ծ Ի ն						Հ ո կ տ ե մ բ ե ը յ ա ն									
	բույսերի բուծյունը		բարձ- ւած-ով		տերեխ		տերեխների թիվը	ցողունի տրամա- դիծը սմ-ով	բույսերի բուծյունը		բարձ- ւած-ով		տերեխ		տերեխների թիվը	ցողունի տրամադիծը սմ-ով
	հուլիսին	առանց հունիսի	երկարությունը սմ-ով	լայնությունը սմ-ով	հուլիսին	առանց հունիսի			հուլիսին	առանց հունիսի	երկարությունը սմ-ով	լայնությունը սմ-ով				
Հոկտեմբերյանի տեղական պոպուլյացիա Էջմիածնի կարծր սպիտակ	—	—	—	—	—	—	—	—	179,2	136,1	58,96	6,63	11,5	1,39		
Հիբրիդային պոպուլյացիա Կրասնոդարսկա- յա ծ/Ճ1	183	146	57,99	7,25	11,1	1,46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Հիբրիդ Վեր-42	185,1	145,8	55,5	7,74	12,5	1,41	143,6	110,6	165,1	128	51,28	6,53	10,7	1,37		
Հիբրիդային պոպուլյացիա Կրասնոդարսկա- յա 4/Յ0	175,4	142,5	55,7	8,13	10	1,46	140,8	106,6	143,6	110,6	49,84	6,5	11,6	1,22		
Հիբրիդային պոպուլյացիա Կրասնոդարսկա- յա 10/Յ3	175,9	141,6	54,4	7,9	12,6	1,53	171,9	132,1	140,8	106,6	48,45	6,47	11	1,26		
Հիբրիդային պոպուլյացիա Կրասնոդարսկա- յա 1/49	210,4	167,5	58	8	13,3	1,56	177	133,2	171,9	132,1	52,78	6,85	11,3	1,35		
Հիբրիդ Կրասնոդարսկայա 4	221,9	173,9	61,6	7,92	13,3	1,66	191,1	142,1	210,4	167,5	57,21	7,36	11,3	1,47		
Ստերիլի	208,1	165,9	58,49	7,98	12,4	1,66	185,3	142	221,9	173,9	63,53	7,64	11,5	1,54		
Հիբրիդ Վեր-Յ0	199,9	153	58,97	7,45	13,5	1,61	182,8	139,4	208,1	165,9	57,12	6,65	11,1	1,41		
Հիբրիդ Կրասնոդարսկայա ծ	203,2	163	61,7	7,65	13,6	1,57	195,6	146	199,9	153	59,67	7,1	11,7	1,45		
Լիճիկ	235	185,5	63,41	8	14,2	1,81	227,2	179,2	203,2	163	62,25	7,39	11,9	1,5		
															1,56	

րից և հիբրիդներից ամենահզոր և կենսունակ բույսեր ունի Հիմինգը, որի ցողունի բարձրությունը, առանց հուրանի, էջմիածնի շրջանում 179,2 սմ է, մինչդեռ նրանից հետո ամենափարթամ ձևի՝ Կրասնոդարսկայա 4 հիբրիդի ցողունի բարձրությունը էջմիածնի շրջանում 173,9 սմ է, իսկ Հոկտեմբերյանի շրջանում՝ 142,1 սմ: Հիմինգը գերազանցում է մնացած սորտերին և հիբրիդներին նաև տերևների թվով, չափերով և ցողունի տրամագծով:

Էջմիածնի շրջանում կանաչ մասսայի մեծ կուտակում է տալիս նաև Կրասնոդարսկայա 1/49 հիբրիդային պոպուլյացիան, որը շրջանում հեռանկարային է դառնում միաժամանակ կողրերի բարձր բերք (հեկտարից 52 ցենտներ) ունենալու շնորհիվ: Իր հզորությամբ նա հետ է մնում միայն Հիմինգ սորտից և Կրասնոդարսկայա 4 հիբրիդից, սակայն մեկ հեկտարից ստացվող կողրերի բերքով համապատասխանորեն գերազանցում է նրանց 21 և 11 ցենտներով (աղյուսակ 1):

Պետք է նշել, որ Վիր-42 հիբրիդի բույսերի հզորությունը ցածր է վերը նշված սորտերի և հիբրիդների հզորությունից: Այս հանգամանքը, սակայն, չի կարող նվազեցնել նրա արժանիքները, եթե նկատի ունենանք, որ հեկտարին ընկնող բույսերի ընդհանուր թվով գերազանցում է Հիմինգ սորտին և Կրասնոդարսկայա 1/49 հիբրիդային պոպուլյացիային մոտավորապես $40\frac{1}{10}$ -ով:

Հոկտեմբերյանի շրջանում կանաչ մասսայի կուտակման տեսակետից արժեքավոր են Կրասնոդարսկայա 4 և Կրասնոդարսկայա 5 հիբրիդները: Սրանց հետագա փորձարկումը Հոկտեմբերյանի շրջանում նպատակահարմար է նաև նրանով, որ միաժամանակ ունեն կողրերի բարձր բերք:

Այսպիսով, 1955 թվականին ստացված նախնական տվյալներով, փորձարկման ենթարկված սորտերից ու հիբրիդներից բերքատվությամբ և բույսերի հզորությամբ առավել արժեքավոր են՝

1. Էջմիածնի շրջանում՝ Վիր-42 հիբրիդը՝ Ստերլինգ սորտը և Կրասնոդարսկայա 1/49, Կրասնոդարսկայա 4/50 հիբրիդային պոպուլյացիաները:
2. Հոկտեմբերյանի շրջանում՝ Վիր-42, Կրասնոդարսկայա 4, Կրասնոդարի 5 հիբրիդները. Հիմինգ սորտը, Կրասնոդարսկայա 10/53 հիբրիդային պոպուլյացիան:

Տեխնիկական կուլտուրաների Հայկական
գիտահետազոտական ինստիտուտ
ք. Էջմիածին:

С. П. СЕМЕРДЖЯН

ОБ ИТОГАХ ИСПЫТАНИЯ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ И ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ В АРАРАТСКОЙ РАВНИНЕ

Резюме

В статье кратко дана характеристика некоторых сортов и гибридов кукурузы, выращенных в условиях Араратской равнины. Опыты проводились в условиях Эчмиадзина, на центральной базе Института

технических культур Армянской ССР и в Октемберяне, на зональной станции института. Всего испытывалось 12 сортов, гибридов, гибридных популяций и местных популяций.

Результаты предварительного испытания показывают, что из испытываемых сортов и гибридов более ценными являются:

1) в Эчмиадзинском районе: ВИР-42, гибридные популяции Краснодарская 1/49, Краснодарская 4/50 и сорт Стерлинг.

2) в Октемберянском районе: гибриды ВИР-42, Краснодарский-4, Краснодарский-5, сорт Лиминг, гибридная популяция Краснодарская 10/53.