

Պտղաբուծություն

Հ. Ն. ՇԱՀԻՆՅԱՆ

ԳԵՏՆԱԵԼԱԿԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՍՈՐՏԵՐԸ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՄԵՐԶ
ՑԱԾՐԱԴԻՐ ԳՈՏՈՒ ՀԱՄԱՐ

Սովետական Միության Կոմունիստական պարտիան և Սովետական կառավարությունն իրենց մի շարք որոշումներում բաղժիցս նշել են խոշոր և արդյունաբերական քաղաքների շուրջը պտղա-հատապտղային կուլտուրաների զարգացման կարևորությունը մասին: Բայց անհրաժեշտ է նշել, որ մեր երկրի հարավային շրջաններում հատապտուղների զարգացումն սկսվել է միայն վերջին տարիներում:

Բնակչության պահանջմունքները մթերքներով բավարարելու գործում մեծ նշանակություն ունեն նաև հատապտուղները, որոնց մեջ առաջին տեղերից մեկը դրավում է այդու խոշորապտուղ գետնակալը (*Fragaria grandiflora* Ehrh.).

Գետնակալի պտուղներն աչքի են ընկնում իրենց բարձր համային հատկություններով, շաքարների, թթուների, վիտամին C-ի ու հանքային աղերի զգալի պարունակությամբ: Պտղա-հատապտղային կուլտուրաների մեջ գետնակալը համարվում է ամենաշուտ պտղաբերման մեջ մտնող և ամենավաղ հասունացող կուլտուրան: Գետնակալի հիմնադրված նոր տրեկարկները տնկման երկրորդ տարում արդեն մտնում են նորմալ պտղաբերման մեջ:

Հայկական ՍՍՏ ցածրագիր գոտու պայմաններում գետնակալի յուրաքանչյուր հեկտարից ստացվում է 4—6 տոննա միջին բերք: Պտուղների հասունացումն սկսվում է մայիսի երկրորդ կեսից — հունիսի սկզբից և շարունակվում է մինչև հունիսի վերջերը, այսինքն այն ժամանակ, երբ Երևանի քաղաքամերձ գոտում ոչ մի պտղատու կուլտուրայի պտուղներ գեոևս հասունացած չեն լինում:

Անհրաժեշտ է նշել, որ, բացի առանձին տարածություններում մշակելուց, գետնակալը հնարավոր է մշակել նաև պտղատու այգիների միջշաքային տարածություններում: Այդ հանգամանքի ապացույց են հանդիսանում Երևանի քաղաքամերձ գոտում դառնվող նորքի, Կոնդի և Ավանի ձորի տնամերձ այգիները: Այդ այգիներում գետնակալը մշակվում է բացառապես պտղատու ծառերի միջշաքային տարածություններում:

Երևանի քաղաքամերձ ցածրագիր գոտում, որը համարվում է Երևանի բնակչությանը թարմ պտուղներ և բանջարեղեն մատակարարելու հիմնական բաղան, գետնակալը, որպես արդյունաբերական կուլտուրա, մինչև վերջին տարիները համարյա թե չէր մշակվում: Դրա հիմնական պատճառը համարվում էր այն, որ ուսումնասիրված չէին գետնակալի սորոտերը և ագրոտեխնիկան մեր պայմաններում:

Հայկական Գյուղատնտեսական ինստիտուտի Պտղաբուծության ամբիոնը 1952 թվականի գարնանը հավաքելով Միության մեջ շատ տարածված գետնաեղակի սորտերի կուլեկցիա, սկսեց ստացիոնար ուսումնասիրություններ կատարել Երևանի քաղաքամերձ ցածրադիր գոտու պայմաններում:

1952—55 թթ. ընթացքում փորձնական աշխատանքները տարվել են Գյուղատնտեսական ինստիտուտի փորձակայանում, որը գտնվում է Երևանից 4 կմ հեռավորության վրա և համարվում է այդ գոտու տիպիկ հողամասերից մեկը:

Ուսումնասիրության ենթակա սորտերը եղել են հետևյալները՝

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Արրիկոս | 8. Լենինականի — 1 |
| 2. Դավիդովսկայա | 9. Լենինականի — 2 |
| 3. Վիկտորիա | 10. Իոսիֆ-Մազմեստ |
| 4. Ռոշչինսկայա | 11. Լյուցիդա-պերֆեկտա |
| 5. Միսովկա | 12. Պրոլիֆիկ |
| 6. Մադամ-Մուտո | 13. Պոդունյա-լեոպոլդսգայա |
| 7. Բելայա-անանասնայա | |

Վերը նշված սորտերի բիոլոգիական առանձնահատկությունների և տնտեսական հատկանիշների ուղղությամբ կատարված սորտուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ Երևանի քաղաքամերձ ցածրադիր գոտում միանգամայն հնարավոր է գետնաեղակի կուլտուրայի արտադրական մշակությունը: Սորտուսումնասիրությունների ժամանակ մեր կողմից առանձնացվել են գետնաեղակի 7 լավագույն սորտեր, որոնք աչքի են ընկել իրենց լավ աճեցողությամբ, Երևանի քաղաքամերձ ցածրադիր գոտու ուրույն հողա-կլիմայական պայմաններին լավ հարմարվողականությամբ, պտուղների բարձր որակով և ընդքառվածությամբ: Մտորե բերվում է այդ սորտերի համառոտ ընտելագիրը:

1. Ռոշչինսկայա. — Խուփը բարձր է, մինչև 36-40 սմ, լավ տերևապատված: Տերևները խոշոր, բաց կանաչ գույնի, տակից քիչ մազմզուկապատված և թույլ փայլով: Միջին տերևիկը ձվաձև կամ ձվա-ոսկրաձև: Ատամնավորությունը խոշոր է և սուր, տերևակոթը երկար, բարակ և ծածկված կանգուն մազմզուկներով: Ծաղկակիրները թփից մի քիչ բարձր են կամ նրան հավասար:

Ծաղկափթթությունը տարածուն է, ծաղկակոթերը կարմրավուն, բարակ և երկար: Ծաղիկները երկսեռ են, խոշոր, պսակաթևերի իկները սպիտակ: Երևանում ծաղկակիրների միջին թիվը 5—7 է:

Պտուղները խոշոր են, միջին քաշը 6 գրամ, իսկ առաջին պտուղների քաշը՝ 19—20 գրամ և ավելի: Պտուղների ձևը կոնաձև կամ բութ-կոնաձև, լայն կողավորությամբ, իսկ բերքահավաքի վերջերին ավելի ուղիղ երկարավուն-կոնաձև, երբեմն պողավղիկով: Պտուղների գույնը բաց կարմիր է և փայլուն, սերմերը պեղին են և թույլ ընկղմված պտղամսի երեսին: Պտղամիսը սպիտակ է, իսկ եզրերում վարդագույն, նուրբ, հյութալի, արոմատով: Պտուղների քիմիական կազմությունը Երևանում լինում է հետևյալը. չոր նյութեր՝ մինչև 9,14⁰/₀, ընդհանուր շաքարներ՝ 4,7—5,7⁰/₀, թթուներ՝ 1,0—1,23⁰/₀, վիտամին C-ն՝ 59,5—66,88 մգր⁰/₀: Դեպուստացիայի ժամանակ իր բոլոր հատկանիշներով ստացել է 4 զնահատական:

Մեր պայմաններում հանդես է բերում ուժեղացանցություն և հաճախ երկրորդ անգամ ծաղկում և պտղաբերում է: Բերքատվությունը բարձր է, մեկ թփից, միջին հաշվով, 222—251 գրամ: Վաղահաս է, հասունանում է սկսած մայիսի կեսերից: Պտուղները կարելի է օգտագործել ինչպես թարմ, այնպես էլ մերամշակված վիճակում: Չմոռոխմացիկուն է և առանց ձյան ծածկոցի ճրկանում չի ցրտահարվում:




Նկ. 1. Ռոշչինսկայա սորտը:

2. Վիկտորիա.— ճրկանի քաղաքամերձ գոտու տնամերձ այգիներում ամենատարածված սորտն է: Թուփն ունի միջին մեծություն, 30—35 սմ բարձրությամբ և լավ տերևապատվածությամբ, տերևները միջին մեծության են, փայլուն կանաչ գույնի, կնճռոտ և թավոտ: Տերևները ձվաձև են, ատամները խոշոր և սուր: Ծաղկակիրները միջին մեծության են, հաստ, կանաչ գույնի և ծածկված թփի մեջ, թփից ցածր: Ծաղկակիրների միջին թիվը 5—6 է: Ծաղկափթիկները կոմպակտ է, ծաղկակոթերը կարճ, կարմրավուն երանգով, մազմզուկներով պատված: Ծաղիկները երկսեռ են և ուղիղ ձևի, պսակաթերթիկներն սպիտակ են և 5-ից ավելի, բաժակաթերթիկները բաց կանաչ գույնի:

Նրկանի պայմաններում այս սորտի թուփն ունի 29—30 սմ բարձրություն, կոմպակտ և ուժեղ տերևապատվածությամբ: Ցերեները միջին մեծությամբ են, թույլ կողավորությամբ, լայն ձվաձև, բաց-կանաչ գույնի, թույլ արծաթափայլ երանգով և թավոտ:

Ծաղկակիրները տերևների մակերեսին հավասար բարձրությամբ են, ծաղկափթթությունը ոչ շատ տարածուն, ծաղկակոթերն ունեն միջին երկարություն: Ծաղկակիրների թիվը մեկ թփի վրա 7—9 հատ է: Ծաղիկները



Նկ. 3. Միսովկա սորտը

երկուստե ևն և խոշոր: Գտուղները 5,5—5,8 գրամ միջին քաշով՝ պտղաբերման ամբողջ շրջանում: Ամենախոշոր գտուղների քաշը 10—12 գրամ է: Գտուղների ձևը՝ կլոր-ձվաձև, պտղամզկիկը լավ արտահայտված, գույնը կարմիր, փայլուն, իսկ շատ հասունացած ժամանակ բալի նման մուգ կարմիր: Սերմերը թույլ բնկված են պտղամսի մեջ: Գտղամիսը կարմիր է, նուրբ արոմատով և քաղցր: Չոր նյութերի պարունակությունը 9,94%, շաքարները՝ 8,10%, թթվությունը՝ 1,17%, վիտամին C-ն մինչև 61,95 մգ/100:

Մեկ թփի միջին բերքատվությունը 185—211 գրամ է: Ճրտադիմացկունությունը և չորադիմացկունությունը բարձր են, սպիտակ բծավորությամբ վարակվում է թույլ: Գտուղները հասունանում են շուտ, մայիսի

15-ից սկսվում է առաջին բերքատվաքը: Դեղուստացիայի ժամանակ պտուղները ստացել են 4 գնահատական:

4. Լեհիճականի — 2. — Այս սորտը ստացվել է Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի Պտղարուծության ինստիտուտի լեռնային սեկտորում, Ս. Հ. Ագուլյանի կողմից, Խոսիֆ-Մադոմետ և Արրիկոս սորտերի խաչաձևումից:

Թուփը բարձր է (30—35 սմ), կիսափուփող, միջին տերևապատվածությամբ (23—26 հատ):

Տերևները խոշոր են, վառ-կանաչ գույնի, թույլ կնճռոտությամբ և խիտ թափոտությամբ:

Ծաղկակիրները թփից ցածր են: Պտղաբերման առաջին տարում ծաղկակիրների թիվը լինում է 2—4 հատ, իսկ երկրորդ տարում՝ 2—5 հատ: Ծաղկափթթությունը տարածուն է, որը բաժանվում է 4 ճյուղավորությունների, ամեն մի ճյուղավորությունում 4—6 ծաղկով:

Ծաղիկները միջին մեծությամբ են, երկսեռ, պսակաթերթիկները սպիտակ, կլորավուն: Պտուղները միջին մեծությամբ՝ 5,6—7,0 գրամ քաշով, իսկ խոշոր պտուղները՝ մինչև 12 գրամ, կլոր-կոնաձև, վզիկով, երբեմն անկանոն ձևի և թույլ կողավորությամբ:

Պտղի գույնը կարմիր է, փայլուն մակերեսով: Սերմերը վառ գույնավորությամբ և խորն ընկզմված պտղամսի երեսին: Պտղամիսը սպիտակ և նուրբ: Պտղի համը գուրեկան է, թթվաքաղցր, չոր նյութերը կազմում են 9,47⁰/₁₀₀, ընդհանուր շաքարները՝ 5,6—6,9⁰/₁₀₀, ավելի բարձր քան Լենինականի պայմաններում, թթվությունը՝ 1,19⁰/₁₀₀, վիտամին C-ն մինչև 51,57 մգր⁰/₁₀₀: Դեղուստացիայի ժամանակ իր բոլոր հատկանիշներով ստացել է 4 գնահատական:

Մեկ թփի միջին բերքատվությունը 126,0 գրամ պտղաբերման առաջին տարում և 142 գրամ՝ երկրորդ տարում: Հասունացումը սկսվում է մայիսի վերջերից և շարունակվում է մինչև հունիսի 15-ը:

Յրտագիմացիուն և չորադիմացիուն է, հուլիս-օգոստոս ամիսների բարձր ջերմաստիճանից երևանի պայմաններում չի տուժում, որով ավելի է բարձրանում այս սորտի արժեքը:


5. Արրիկոս. — ՍՍՌ-ում շատ տարածված սորտերից է, հանդիպել ենք նաև Երևանի մոտակայքի տնամերձ այգիներում:

Թուփն ունի 30—40 սմ բարձրությամբ, խիտ տերևապատված է, կոմպակտ ու կանգուն: Տերևները խոշոր են, մուգ կանաչ գույնի, կնճռոտ, փայլուն, թափոտ, ձվաձև, ուժեղ կողավորությամբ:

Ծաղկակիրները մինչև 35 սմ երկարությամբ են, թփին հավասար բարձրությամբ և թափոտ: Ծաղկակիրների միջին թիվը լինում է 5—6: Ծաղկափթթությունը տարածուն է, ծաղիկները երկսեռ են, միջին մեծությամբ, պսակաթերթիկները սպիտակ: Պտուղները խոշոր են, 6—9 գրամ միջին քաշով, իսկ խոշոր պտուղները՝ 16—20 գրամ և ավելի:

Պտուղը վառ կարմիր է, ուղիղ, տափակ կլորավուն: Սերմերը զեղնակարմիր են և թույլ ընկզմված պտղամսի երեսին: Պտուղները շատ համեղ են, ուժեղ արոմատով, դեղուստացիայի ժամանակ ստացել է 4 գնահատական:

Պտուղների քիմիական կազմությունը Երևանի պայմաններում հետևյալն է՝ չոր նյութեր՝ 9,27⁰/₁₀₀, ընդհանուր շաքարներ՝ 6,2⁰/₁₀₀, թթվություն՝ 0,99⁰/₁₀₀, վիտամին C-ն մինչև 54,91 մգր ⁰/₁₀₀։ Մեկ թփի միջին բերքատվությունը 202—211 գրամ է։ Ըստ պտղի հասունացման ժամկետի գրավում է միջին տեղը։ Հասունանում է Միսովկա սորտից մեկ շաբաթ հետո, համար-



Նկ. 4. Արրիկոս սորտը

վում է լավագույն դեսերտային սորտերից մեկը։ Երևանում այս սորտը ցրտադիմացկուն և չորադիմացկուն է, շատ լավ աճում է այգիների միջշարքային տարածություններում։

6. Պոզդնայա-լեուպոլյուզայա. — Շատ տարածված սորտերից է։ Թուփն ուժեղ աճեցողություն, հզոր է և քիչ տարածված։ Տերևապատվածությունը լավ է, մեկ թփի վրա՝ 29—41 տերև։ Տերևները խոշոր են, կանաչ գույնի, փայլուն, պինդ, մազմզուկներից զուրկ և թեթև կնճոռտությունով։

Ծաղկակիրներն ունեն թփին հավասար բարձրություն, միջին թիվը մեկ թփի վրա 5—6 է։ Ծաղիկները միասեռ են (իդական), միջին մեծությամբ, պսակաթերթիկները՝ սպիտակ, 5-ից ավելի (6—7 հատ)։ Պտուղները խոշոր են՝ 6,8—8,4 գրամ միջին քաշով, իսկ խոշոր պտուղները՝ 17—19 գրամ։ Պտուղները բուր-կոնաձև են և թույլ կողավորությունով, գույնը՝

մուգ-կարմիր և փայլուն, սերմերը նույնպես կարմիր են և թույլ ընկրդաված պտղամսի երեսին: Պտղամիսը բաց-կարմիր գույնի է, պինդ, դուրեկան թթվությամբ:

Չոր նյութերի պարունակությունը պտուղներում կազմում է մինչև $9,47\%$, ընդհանուր շաքարները՝ $5,6\%$, թթվությունը՝ $1,54\%$, վիտամին:



Նկ. 5. Պոզդնայա-լեռպոլդսդալյա սորտը

Շ-ն մինչև 54, 91 մգր $\%$, Բերքատվությունը բարձր է, մեկ թփից, միջին հաշվով, ստացվում է 235—261 գրամ:

Աչքի է ընկնում իր ուշահասությունը, երևանում հասունանում է հունիսի 1-ից և շարունակում է պտղաբերել մինչև հունիսի 20-ը: Ցրտադիմացկուն և չորադիմացկուն է: Այս սորտի լավագույն փոշոտիչները համարվում են Խոշինսկայա, Արրիկոս և Մադամ-Մուտո սորտերը:

7. Պրուիֆիկ.— Այս սորտը մեր Միության մեջ շատ տարածված է Հյուսիսային Կովկասում և շատ քիչ է հանդիպում մնացած շրջաններում: Թուփը մեր կողմից փորձարկված բոլոր սորտերից համեմատաբար խոշոր է, ուժեղ աճեցողությամբ, մինչև 40 սմ բարձրությամբ, խիտ տերևապատվածությամբ:

Տերեւները խոշոր են, կլորավուն, եզրերը կտրտված, սուր առամնա-
վորուկյամբ և կնճռոտ: Ծաղկակիրները հաստ, ուղիղ կանգուն, տերեւներին
հաճախար կամ նրանցից բարձր: Ծաղկակիրներին միջին թիվը նրանում
6—7 է մեկ թվի վրա: Ծաղիկները խոշոր են, սպիտակ, միասեռ:

Պտուղները խոշոր են կամ միջին մեծությամբ: Առաջին պտուղներից
յուրաքանչյուրի քաշը 13—20 գրամ է, մնացած պտուղներից յուրաքան-
չյուրի քաշը ամբողջ պտղաբերման շրջանում 6,5—9,0 գրամ է:



Նկ. 6. Գրուիֆիկ սորտը

Պտուղները լինում են տարբեր ձևերի՝ լայն-կոնաձև, լայն-կողավոր,
գուլնը մուգ կարմիր և փայլուն:

Պտղամիսը պինդ է, թթվաքաղցր համով, արոմատը լավ արտահայտ-
ված. սերմերը կարմիր գույնի են և թույլ ընկղմված պտղամսի երեսին:
Պտղամիսը սպիտակ է, թույլ կարմրուկյամբ:

Պտուղների մեջ չոր նյութերի պարունակությունը մինչև 9,67%,
ընդհանուր շաքարները՝ 7,2%, թթվությունը 0,64—1,11%, վիտամին C-ն
մինչև 62,83 մգր%: Ինգուստացիայի ժամանակ իր բոլոր հատկանիշներով
ստացել է 4 դնահատական:

Շատ բերքատու սորտ է, միջին բերքատվությունը մեկ թփից եղել
է 224—250 գրամ:

Ուշահաս է և առաջնակարգ տեղ պետք է դրվի Երևանի քաղաքա-
մերձ ցածրադիր գոտու ստանդարտ առարարմենություն:

Հողի նկատմամբ պահանջկոտ չէ և լավ կարող է աճել նույնիսկ ծանր
կալալին, կարրոնատներով հարուստ հողերում: Ցրտադիմացկուն ու չորա-
դիմացկուն է և քլորոֆոլ չի վարակվում:

Հավագույն փոշոտիչներն են՝ Վիկտորիա, Ռոզինսկայա, Պողոնայա-
լեոպոլդսգալյա սորտերը:

Հայկական Գյուղատնտեսական ինստիտուտի

Պողարուծությունից մեծ խմբի:

Ստադիա է 19 XII 1955 թ.:

О. Н. ШАГИНЯН

ЛУЧШИЕ СОРТА ЗЕМЛЯНИКИ ДЛЯ ПРИГОРОДНОЙ НИЗМЕННОЙ ЗОНЫ ЕРЕВАНА

Р е з ю м е

Проведенные работы по сортоизучению земляники в условиях пригородной низменной зоны Еревана показали, что вполне возможно широкое распространение этой культуры.

В процессе сортоизучения нами выделен ряд сортов земляники, как наиболее урожайный и приспособленный к специфическим почвенно-климатическим условиям этой зоны; для широкой промышленной культуры рекомендуются следующие сорта:

1. Рощинская	}	раннего созревания
2. Виктория		
3. Мысовка		
4. Ленинанская-2		
5. Абрикос		среднего созревания
6. Пролифик	}	позднего созревания
7. Поздняя - леопольдсгалья		

Отмеченные сорта осенью 1954 г. внедрены в производство (совхоз им. К. Е. Ворошилова Армконсервтреста).