

Պատգամաբուծություն

Է. Ս. ՄՈՐԻԿՅԱՆ

ՍԱԼՈՐԵՆՈՒ ԿՈՒՆՏՈՒՐԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԱՇՏԱՐԱԿԻ
ՇՐՋԱՆՈՒՄ

Սալորենին մեսապուրիկայի մի շարք շրջաններում, այդ թվում և Աշտարակի շրջանում, հանդես է գալիս սորտերի ու ձևերի մեծ բազմազանությունը: Այդ բազմազանությունը բացատրվում է նրանով, որ տվյալ կուլտուրան մինչև վերջին ժամանակներս բազմաքանակ է միմիայն կորիզների միջոցով, որի հետևանքով էլ ստեղծվել են մի շարք հատկանիշներով իրարից տարբերվող և տնտեսական առանձին արժեք ներկայացնող սորտեր ու ձևեր:

Այստեղ, բացի Վիկտորիա, Վենդերկա իտալական, Վադիրի, դեղնաշուր, ճանճուր և այլ հայտնի սորտերից, մենք հայտնաբերել և ուսումնասիրել ենք սև դամբուլ, քաղցրակորիզ սալոր, դամբուլաշուր, կանաչկենի, սալոր № 1 և սալոր № 2 սորտերն ու ձևերը, որոնք կարող են հետաքրքրություն ներկայացնել թե արտադրության մեջ արմատավորելու և թե սելեկցիոն աշխատանքներում օգտագործելու տեսակետից:

Ստորև բերում ենք դրանցից ամենահետաքրքիր սորտերի՝ սև դամբուլի և քաղցրակորիզ սալորի նկարագրությունը:

ՍԵՎ ԴԱՄԲՐՈՒԼ

Սև դամբուլը լայնորեն տարածված է շրջանի Աշտարակ, Օշական և Փարպի գյուղերի թե կուլտնտեսությունների և թե կուլտնտեսականների տնամերձ այգիներում:

Մառերը միջին մեծության են, 20 տարեկան հասակում ունեն 3,8 մետր բարձրություն, 4,6 մետր սաղարթի և 16 սմ բնի տրամագիծ, ճյուղավորումն ուժեղ է, միամյա շիվը գունավորված, 35—80 սմ երկարությամբ:

Տերևները խոշոր են, հակառակ ձվաձև, 96 մմ երկարությամբ և 52 մմ լայնությամբ: Տերևաթիթեղի մակերեսը հարթ է, թավապատ, մուգ կանաչ գույնի, դադաթը կլորավուն, եղբերը խոշոր, կլոր-ատամնավոր: Տերևակաթը բաց կանաչ գույնի է, 32 մմ երկարությամբ:

Պտուղները խոշոր են կամ միջին մեծության, օվալաձև, $42,8 \times 38,3 \times 38,9$ մմ չափսերով և յուրաքանչյուրը կշռում է միջին հաշվով 34 գրամ: Զագարը միջին մեծության է, պտղակարը պտուղը բաժանում է երկու անհավասար մասերի:

Պտղի մաշկը սև-կապտավուն գույնի է, խիտ մոմաշերտով պատած,

ունի միջին հաստություն, մանր, ենթամաշկային գեղին կետերով, պտղամօխց չի անջատվում:

Պտղամիսը միջին ամրությամբ է, կանաչավուն-բաց դեղնավուն գույնի, չատ քաղցր է, հյութալի, կորիզից անջատվում է: Հյութը բաց կանաչ գույնի է:

Կորիզները խոշոր են, հակառակ ձվաձև, $23,6 \times 13,3 \times 8,5$ մմ չափերով և կշռում են միջին հաշվով $1,42$ գրամ, որը կազմում է պտղի ընդհանուր կշռի $4,4^{0}/_{10}$ -ը:

Հասունացման ժամկետը.—Պտուղները հասունանում են օգոստոսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը ընկած ժամանակաշրջանում:

Սորտի հատկանիշները.—Սև դամբուլը բերքառատ սորտ է, ցրտահարություններից, հիվանդություններից ու վնասատուներից շատ քիչ է տուժում: Պտուղներն աչքի են ընկնում իրենց բարձր շաքարայնությամբ: Պարունակում են $17,2^{0}/_{10}$ ընդհանուր շաքարների: Օգտագործվում են թարմ վիճակում:

Նկատի ունենալով այս սորտի լավագյուն հատկանիշները, կարելի է խորհուրդ տալ արտադրության մեջ այն ներդնելու համար:

Քաղցրակտրիկ սալոր

Սալորենու քաղցրակտրիկ սորտը 1953 թվականի էքսպերիցիայի ժամանակ մեր կողմից հայտնաբերվել է շրջանի Օշական գյուղի կոլտնտեսականների տնամերձ այգիներում, որտեղ այդ սորտից կա ընդամենը մեկ ծառ:

Սալոր միջին մեծությունից փոքր է, 20 տարեկան հասակում ունի 2,6 մետր բարձրություն, 5,0 մետր սաղարթի և 18 սմ ընի տրամագիծ: Զյուղավորումը միջակ է, միամյա չիվը բաց կանաչավուն, արևահայաց կողմում դունավորված, 20—40 սմ երկարությամբ:

Տերևները միջին մեծությամբ են, ձվաձև, 63 մմ երկարությամբ և 40 մմ լայնությամբ: Տերևաթիթեղը բաց կանաչ գույնի է, քիչ թավապատ, մակերեսը հարթ, ծայրը սուր, եղբերը մեկական սուրամտամնավոր: Տերևակոթը բաց կանաչ գույնի է, 28 մմ երկարությամբ:

Պտուղները համեմատաբար մանր են, օվալաձև, $34,4 \times 30,3 \times 28,5$ մմ չափերով և կշռում են միջին հաշվով 20-ական գրամ: Չաղարը փոքր է, պտղակարը պտուղը բաժանում է երկու հավասար մասերի:

Պտղի մաշկը հիմնականում գեղին գույնի է, արևահայաց կողմում $1/2$ մասով դեղեցիկ մորենագույն, ունի միջին հաստություն, պտղամօխց չի բաժանվում:

Պտղամիսը դեղին գույնի է, հյութալի, քաղցր, դուրեկան թթվաշ համով, կորիզից անջատվում է:

Կորիզները ձվաձև են, միջին մեծությամբ, $20,5 \times 12,9 \times 7,8$ մմ չափերով, կշռում են, միջին հաշվով, 0,92-ական գրամ, որը կազմում է պտղի ընդհանուր կշռի $4,6^{0}/_{10}$ -ը:

Միջուկը քաղցր է, 0,30 գրամ կշռով:

Հասունացման ժամկետը.—Պտուղները հասունանում են վաղ ժամկետում՝ հուլիսի 15—30-ը ընկած ժամանակաշրջանում:

Սորսի հատկանիշները.—Ծառը միջին չափի բերքատու է, ցրտահարությանն ենթարկվում, հիվանդություններից ու վնասատուներից տուժելու տեսակետից ևս միջին տեղ է գրավում:

Սալորենու քաղցրակորիզ սորտը հետաքրքրություն է ներկայացնում սելեկցիոն աշխատանքներում սալորի վաղահաս և քաղցրակորիզ սորտեր ստանալու տեսակետից:

Э. С. МОРИКЯН

КУЛЬТУРА СЛИВЫ В АШТАРАКСКОМ РАЙОНЕ АРМЯНСКОЙ ССР

Р е з ю м е

В садах многих районов Армянской республики, в том числе и в Аштаракском районе, встречается в большом количестве сорта и формы слив. Это разнообразие объясняется тем, что слива в последнее время размножилась лишь при помощи косточек. Здесь кроме известных сортов Виктория, Венгерка итальянская, Вазир, дегнашлор, чанчур нами были исследованы и выявлены сорта и формы сев дамбул, сладкоядерная слива, дамбулашлор, каначкени, слива № 1 и слива № 2, которые могут быть рекомендованы как для внедрения в производство, так и для использования в селекционной работе.

В статье описываются из них наиболее перспективные сорта сев дамбул и сладкоядерная слива.