

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Г. Д. АВАКЯН


НЕИЗВЕСТНЫЙ НАУКЕ САМЕЦ КОНЬКА МИЩЕНКО
 CHORTHIPPUS MISTSHENKOI AV. (ORTHOPTERA, ACRIDIDAE)
 ИЗ ЮЖНОЙ АРМЕНИИ

В августе 1957 г. на юго-западном склоне горы Капутджух на высоте 2500—3500 м и в окрестностях Гейгола в альпийской зоне на высоте 3100 м нами была собрана большая серия самцов и самок *Chorthippus mistshenкои* Av., описанного н. т. только по 4 самкам. Поэтому ниже мы даем описание неизвестного до сих пор самцов этого высокогорного вида, обитающего только в субальпийской (где он живет среди горно-ксерофитной растительности) и в альпийской зонах.

7—12 августа 1957 г. происходило массовое спаривание этого конька, но в то же время мы встретили и несколько личинок II и IV возраста.

Chorthippus mistshenкои Av. (рис.). Авакян, 1956, Доклады АН АрмССР, т. XXIII, 2:96, рис. В. С (♀, южная Армения: гора Капутджух).

♂. Тело мелких размеров. Лоб наклонный. Лобное ребро книзу ясно расширено. Темя ясно вдавлено; длина темя равна ширине. Усики 20—24-члениковые, нитевидные, почти в 1,5 раза длиннее головы с переднеспинкой вместе; срединные членики удлинненные; длина отдельного срединного членика в 2



*Chorthippus mistshen
 кои* Av. ♂. Правое над-
 крылье.

раза больше его ширины. Переднеспинка гладкая, слабо вдавленная; боковые кили и срединный киль хорошо развиты, грязно-желтые. Надкрылья довольно хорошо развитые, буроватые, в вершинной части прозрачные, едва достигают середины анальной пластинки или заходят за нее; прекостальное поле узкое; костальное поле ясно расширено, с почти прямыми поперечными жилками; субкостальная жилка утолщенная; радиальное поле с прямыми поперечными жилками; срединное поле около вершины сильно расширено, с неправильными клеточками; анальное поле расширено по всей длине; вершина надкрылья широко закругленная. Крылья крайне сильно укороченные, достигают середины III брюшного тергита. Все бедра и голени в редких волосках, задние голени по наружному краю с 9—13, а по внутреннему краю с 10—12 шипами; вершина шипов черная. Церки конические, Известия XII, № 10—6

в довольно густых волосках. Анальная и генитальная пластинки в сравнительно густых волосках.

Длина тела 11,5—13,0, переднеспинки 2,3—2,5, надкрылья 6,0—7,5, заднего бедра 6,0—8,0 мм.

Определение вида проверено в Зоологическом институте АН СССР Г. Я. Бей-Биенко и Л. Л. Мищенко.

Зоологический институт
Академии наук Армянской ССР

Поступило 4.IV 1959 г.

Գ. Գ. ԱՊՊՅՅՈՒՆ

**ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ CHORTHIPPUS MISTSHENKOI AV.
(ORTHOPTERA, ACRIDIDAE) ՏԵՍԱԿԻ ԱՆՀԱՅՏ ԱՐՈՒՆ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ
ՀԱՅՍՍԱՆԻՑ**

Ա մ փ ո փ ու լ մ

1957 թվականի օգոստոսին Դաիուշիդ լեռան հարավ-արևմտյան թեքու-
թյուններում, ծովի մակարդակից 2500—3500 մ բարձրության վրա և Գեյ-
գյոլ լճակի շրջակայքում, 3100 մ բարձրության վրա, ալպյան գոտում մենք
հավաքել ենք *Chorthippus mistshenkoi* Av. տեսակի բազմաթիվ էգեր և արու-
ներ, որոնք մենք նկարագրել ենք միայն 4 էգի հիման վրա: Այդ պատճառով
մենք առիտ ենք միայն ենթալպյան (լեռնաքարոֆիտային բուսական մի-
ջավայրում) և ալպյան գոտիներում ապրող, մինչ այժմ անհայտ բարձրա-
լեռնային տեսակի արուի նկարագրությունը: