

Э. Ц. ГАБРИЭЛЯН

О НОВЫХ ФЛОРИСТИЧЕСКИХ НАХОДКАХ ЗЛАКОВ ИЗ АРМЕНИИ

В процессе обработки материалов по флоре Армении в течение 1955—1958 гг. нами был обнаружен ряд интересных во флористическом отношении видов. Даже предварительная обработка большого гербарного материала уже выявила некоторые данные о новых или редко встречающихся во флоре Армении родах и видах. В данной заметке приводим часть этих новинок только по семейству Gramineae.


1. *Eriochloa succincta* (Trin.) Kntb. Новый род и вид для флоры Армении. Географический тип — туранский. Единственный экземпляр этого растения впервые был собран нами в Арташатском районе, близ с. Бурастан, у места слияния рек Аракс и Раздан, на прибрежных песках, 26.VII.1956 г. Вторично, совместно с А. М. Барсегяном, там же, но уже не на самом берегу, а ближе к с. Бурастан, и в большом количестве, 25.VII.1958 г. Определила Э. Ц. Габриэлян.

Это растение на Кавказе впервые было найдено Гроссгеймом в 1925 г. в Ширванской степи, недалеко от берега Куры. Сборы последующих лет, произведенные по течению реки Куры, показали, что *E. succincta* чрезвычайно быстро распространяется вверх по Куре. А. А. Гроссгейм рекомендовал обратить внимание на поиски этого растения. Однако *E. succincta* распространяется не только вверх по Куре, но и по ее притокам и, спустя 30 лет после появления в Азербайджане, проникает (по всей вероятности по Араксу) до окрестностей Еревана (карта). Таким образом, темпы распространения этого растения достаточно быстрые. Родиной этого адвентивика Гроссгейм считает равнинную часть центральной Азии. Будучи занесено на Кавказ, растение местами так прочно внедрилось в естественные фитоценозы, что даже вытесняет дикую индигенную растительность (например, заросли *Echinochloa crus-galli*).

2. *Trachypiza distachya* (L.) Link. Новый род и вид для флоры Армении. Географический тип — средиземноморско-ирано-туранский. На Кавказе встречается в Предкавказье, в Западном, Центральном, Восточном Закавказье и в Талыше. В Армении впервые собран в Иджеванском районе, с. Узунтала, сухая степь, 20.VII.1955 г. Э. Шабоян. Определила Э. Ц. Габриэлян.

3. *Brachiaria eruciformis* (Sibth.) Griseb. Новый род и вид для флоры Армении. Географический тип — средиземноморско-ирано-синдский с иррадиациями. В Советском Союзе данный род представлен только этим одним видом и произрастает в Закавказье, а также на юге Средней Азии. В пределах Армении указанное растение най-

Известия XII, № 4—2



дено впервые в окрестностях Еревана, Харберт, на орошаемых местах, 4.VIII.1954 г. Я. И. Мулкиджанян. Определила Э. Ц. Габриэлян.

4. *Diplachne serotina* (L.) Link. Новый род и вид для флоры Армении. Географический тип — средиземноморский. Указание во флоре СССР о произрастании этого вида в „Южном Закавказье (Армения)“ относится к Карабаху. Этот вид на Кавказе встречается редко на сухих склонах, в нижнем и среднем горных поясах. В Армении впервые собрано А. В. Ивановой в Алавердском районе, окр. Ахтала, в фисташиково-можжевелевом редколесье, 22.VII.1940 г. и вторично ею же, в Ноябрьянском районе, в окрестностях, с. Кохб, 15.VIII.1949 г. Определено нами.

5. *Eragrostis starosselskyi* Grossh. Новый вид для Армении. Географический тип — ирано-туранский. Данное растение на Кавказе произрастает в Центр. и Вост. Закавказье, в Куро-Араксинской низменности. В пределах Армении впервые нами собрано на территории Ереванского ботанического сада, 14.IX.1956 г. Вторично, в Котайкском районе, Гарни, у места слияния рек Милли и Азат, на сухом обрывистом склоне, 10.VIII.1958 г. Э. Габриэлян и А. Еленевский.

6. *Apera intermedia* Hack. Новый вид для флоры Армении. В СССР встречается только в Нахичеванской АССР. Географический тип — малоазиатский. Произрастает в Эчмиадзинском районе, в окрестностях развалин храма Звартноц, по дороге в Эчмиадзин, в высохшей канаве, 4.VIII.1958 г. Собрала и определила Э. Ц. Габриэлян.

7. *Melica schischkinii* Iljinskaja. Новый вид для флоры Армении. Географический тип — атропатанский. Произрастает в Нахичеванской

АССР. На территории Армении впервые собрано нами в Даралагезе, между сс. Шатин и Гетал, на восточном сухом каменистом склоне, 18.VI.1957 г. Определено нами.

8. *Melica hohenackeri* Boiss. Редкое для флоры Кавказа растение. Географический тип — атропатанский. В Армении этот вид до сих пор был известен только из Мегри. Собран и определен нами. Даралагез, Алазское ущелье, р. Элегис, на южном щебнистом склоне, 18.VI.1957 г.

Кроме Армении, на Кавказе встречается только в Нахичеванской АССР и Талыше.

9. *Calamagrostis olympica* Boiss. Новое местонахождение для этого редко встречающегося, по облику очень сходного с видами *Agrostis*, вейника. Географический тип — переднеазиатский горный с иррадиациями.

Собрано и определено нами. Зангезур, г. Капуджух, у подножья южного отрога, на постоянно увлажняемых местах, 14. VIII.1955 г. Второе местонахождение: г. Арагац, Амбердское ущелье, верховье реки, на заболоченных и переменнно увлажняемых местах, 30.VII.1958 г.

В армянском гербарии имеется один экземпляр из Севана (Саганак), собранный и определенный Гроссгеймом (с вопросительным знаком), который, действительно, оказался *C. olympica*. Далее, нами обнаружен еще один экземпляр этого вида с Гегамского хребта, (сбор А. Шелковникова, определение А. Гроссгейма), лежавший в пачке рода *Agrostis*, под эпитетом *A. lazica*.

10. *Aristida adscensionis* L. Новое для флоры Еревана растение. Географический тип — средиземноморско-синдский. Произрастает на прибрежных песках, у места слияния рек Аракс и Раздан, близ с. Бурастан в Арташатском районе. Собрано нами совместно с Т. В. Егоровой и А. М. Барсегяном, 26.VII. 1956 г. Определено Э. Ц. Габриэлян. Вторично, там же, только несколько выше по течению р. Раздан, 25.VII.1958 г. совместно с А. М. Барсегяном.

11. *Aristella bromoides* Bert. Новинка для северной Армении. Собрано в Алавердском районе, окр. Ахтала, в фисташниково-можжевелевом редколесье, 22.VII.1949 г. А. И. Ивановой, определено Э. Ц. Габриэлян. Географический тип — средиземноморский с иррадиациями. В пределах Армении встречается в Зангезуре (Кафан) и Мегри.

12. *Polypogon semiverticillatus* (Forsk.) Nylander. Редкое для окрестностей Еревана растение. Найдено и определено нами в Эчмиадзинском районе, близ развалин храма Звартноц, по дороге в Эчмиадзин, по берегу канавы, 4.VII.1958 г. Географический тип — средиземноморско-ирано-туранский.

13. *Hordeum eugraecum* (L.) All. Новинка для северной Армении. Географический тип — европейский лесной.

Этот вид по А. А. Гроссгейму и С. А. Невскому в Армении не встречается. А. Г. Долуханов приводит для Зангезура, где собрано и нами: Кафанский район, в лесах Мтнадзора, 9.VIII.1955 г. Второе но-

вое местонахождение этого вида — Шамшадинский район, на территории Шамшадинского лесхоза, 23.VI.1958 г. Собрал Данько, определила Э. Ц. Габриэлян.

14. *Heptardia persica* (Boiss.) Hubb. Новый вид для северной Армении. Географический тип — широко иранский. Был известен только с юга Армении. Найден нами в Агинском районе, между станциями Ани и Алагез в полупустыне, 9.VI.1956 г. На Кавказе встречается, кроме Армении, еще в Нахичеванской АССР и Зуванде.

15. *Apera interrupta* (L.) P. В. Довольно редкое для флоры Кавказа и Армении растение. Географический тип — средиземноморско-ирано-туранский. В пределах Армении до сих пор было известно из окрестностей Еревана и Мегри. Новое местонахождение связывает оба вышеуказанных пункта. Собрано в Даралагезе, окрестности с. Чимкенд, 21.VII.1956 г. Г. Акопян, определено Э. Ц. Габриэлян.

Ботанический институт
Академии наук АрмССР

Поступило 31 X 1958 г.

Է. Շ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

ՅԼՈՐԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՅԱԶԳԻՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո ռ մ

Հայաստանի ֆլորայի ուսումնասիրության ընթացքում հաճաքված հարուստ հերբարիումի մշակման հետևանքով հայտնաբերված են սեպտուրիկայի համար մի շարք նոր և հազվագյուտ բուսական ցեղեր ու տեսակներ: Հոգվածում բերվում են ավելաներ 4 նոր ցեղերի ու տեսակների, 3 նոր տեսակների և 8 տեսակների մասին, որոնք հազվագյուտ ու նոր են բերված շրջանների համար: