

Պ. Պ. ՂԱՐԱՐՅԱՆ

# ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՌԻՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ԲԾԱՎՈՐ ԵՂՋԵՐՎԻ ԱԿՎԻՄԱՏԻԶԱՅԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

Դեռևս 1940 թվականին Ս. Կ. Դալը, որը այն ժամանակ ՍՍՌԻ Գիտությունների ակադեմիայի Հայկական ֆիլիալի Կենսաբանական ինստիտուտի կենդանաբանությունից սեկտորի աշխատակից էր, կազմել էր զեկոցագիր՝ «Ճվալներ Հայկական ՍՍՌ-ի որս-արդյունաբերական ֆաունայի վերափոխման հնարավորությունների վերաբերյալ», որտեղ Հայտատանում ակլիմատիզացիայի համար առաջարկված կենդանիների տեսակների մեջ նշված էր նաև ուստրիական բծավոր եղջերուն: Վերջինս Ս. Կ. Դալը նպատակահարմար էր համարում բաց թողնել Ալավերդու, Շամշադինի, Իջևանի և Կիրովականի շրջանների անտառներում: Սակայն եղջերուների ներքերման հարցը ընդհուպ դրվեց միայն 1953 թվականին, Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի Կենդանաբանական ինստիտուտի ղեկավար, հանդուցյալ Ա. Ա. Սարկիսովի կողմից, ընդ որում պլանավորված էր եղջերուներին բաց թողնել ոչ թե հյուսիսային Հայաստանի անտառներում, ինչպես այդ առաջարկում էր Ս. Կ. Դալը, այլ այսպես կոչված խոտերի անտառում (Վեդու շրջան), որն ընկած է Երևանից դեպի հարավ-արևելք:

խոտերի անտառը հարավային սիպի նոսր անտառ է, որտեղ զերա-կըշտում են կաղնու և բոխու տնկարկները: Վերջիններս մերթ ընդ մերթ ընդմիջվում են զինու անտառակներով: Անտառում կան շատ թփուտներ, ծառատեսակներից հանդիպում են հացենին, կեչին, արոսնին, տանձնին, խնձորնին, ալոննին: Գետերի ու գետակների ափերին քիչ չեն տեսնվե-րը, նախկին գյուղերի փլատակների մոտ հանդիպում են ընկուղենին և ծի-րանին: Ռելիեֆը շատ կտրված է մանր գետերի ու գետակների ձորերով: Անտառները տեղավորված են փոքր զանգվածներով, որոնք իրարից բաժան-ված են բացատներով ու մարգագետիններով: Ամբողջ անտառային զանգ-վածը գտնվում է ծովի մակարդակից 1200—1600 մ բարձրությունից վրա:

Քսան գլուխ (16 էգ և 4 արու) ուսուրիական բծավոր եղջերուներ Երևան են բերվել 1953 թ. նոյեմբերի վերջին: Ուսուրիական երկրամասից մինչև մեզ մոտ ճանապարհը նրանք անցել են լավ, միայն մի էգը ճանապարհին կուրա-ցել է և տեղ հասնելու հաջորդ օրը ընկել: Քանի որ արգեն ուշ էր եղջերու-ներին տանել խոտերի անտառ, որտեղ նրանց ընդունելության համար ոչինչ էր նախապատրաստված, ուստի եղջերուներին թողնելին ձմեռելու Երևանի Կենդանաբանական այգում, և միայն 1954 թ. մայիսի 25-ին 15 էգ և 4 արու բաց թողնվեցին խոտերի անտառում:

Եղջերուները անտառ էին տեղավորվել բեռնատար ավտոմեքենաներով և ճանապարհին մի էգը խիստ վնասվել էր: Վերջինս համաճարար ընկել էր նույն կամ հաջորդ օրը, քանի որ նրա գլխը անտառում գտնվել էր 5 օրից

հետո: Բոլոր եղջերուները հասուն էին (4—6 տարեկան), իսկ բոլոր էգերը՝ հղի: Բաց թողնելու գործը կազմակերպված էր ոչ ալյանքան համարեն, որի հետևանքով եղջերուները սկզբում խիստ վախեցած էին. նրանք բաժանվել էին մի քանի խմբերի և ցրվել տարբեր ուղղություներով: Արուները, ըստ երևույթին, բաժանվել էին էգերից և իրենց համար համապատասխան ապրելավայր փնտրելով՝ մեծ տարածություններ էին անցել: Հավանաբար զբաղված պետք է բացատրել, որ բաց թողնելուց կարճ ժամանակ հետո 2 արու բռնվեցին Սեանա լճի ափին, բաց թողնելու կետից 60—70 կիլոմետր հեռավորության վրա (նկ. 1): Այդ արուներից մեկը հետագայում նորից տարվեց Պոսրով, իսկ մյուսը, դանդի տուփի փնտման պատճառով, թողնվեց Երևանի կենդանաբանական այգում: Էգերը, հավանական է հղիության պատճառով, հենց սկզբից իրենց համար համապատասխան ապրելավայրեր էին որոնում: Ընտրելով տաննախիտ ու անմատչելի անտառամասը (Ղուշ—Փալասի), նրանք հենց այստեղ էլ կենտրոնացել էին: Իրենց մշտական ապրելավայրից ոչ հեռու, լեռան հիմքում, որտեղ նկատվել էին աղի հեռքեր, նրանք սկսել էին քանդել հողը: Հետագայում այդտեղ ստեղծվեց աղի արհեստական կույտ, որի համար տեղափոխվեց կես տոննա քարաղ:

Արդեն հունիսի սկզբին երեացին այդ տարվա ծնված մատղաշները, իսկ հուլիսի վերջին—օգոստոսի սկզբներին եղջերուները փոքր խմբերով (3—5 զույգ) սկսեցին կատարել ոչ մեծ անցումներ: Դեպի արևելք նրանք հասնում էին մինչև Ալիմարգան տեղավայրը, իսկ դեպի արևմուտք՝ մինչև Մանգրուկ: Սակայն ձմռան մոտերքին նրանք նորից կենտրոնացան Ղուշ-Փալասում:

Եղջերուների լրացուցիչ կերի համար, խիստ ձյունոտ ձմռան դեպքում, նախապատրաստված էր խոտի 9 զկգ: Սակայն 1954—55 թթ. ձմեռը շատ մեղմ էր, ձյունը քիչ, այնպես որ հարավային լանջերը ամբողջ ձմռան ընթացքում չծածկվեցին ձյունով, իսկ հյուսիսային լանջերում ձյան ծածկոցը ոչ մի տեղ չունեցավ 10 սմ-ից ավելի խորություն:

Ըստ երևույթին ձմռան մեղմության հետևանքով եղջերուները այդ ամբողջ ձմեռը անց են կացրել Ղուշ-Փալասում: Այդ ձմռան ընթացքում Պոսրովի անտառում չի նկատվել ոչ մի զալ: Լուսանի հեռքեր նկատվել են մի քանի անգամ, բայց նրա կղկղանքում չեն հայտնաբերվել եղջերուների բրդի հեռքեր: 1955 թվականի գարնանը, մոտավոր հաշվումներով, եղջերուների թիվը Պոսրովի անտառում կղկ է 25—26:

1955 թվականի ամռանը եղջերուները Պոսրովի անտառից հեռու չեն անցել: Ամենահեռու անցումները հասնում էին մինչև Ղալա-Դիրի և Չարդախլու տեղամասերը: Այս կետերը եղջերուներն այցելել են բավական կանոնավոր: Արդեն հունիսի սկզբներին նկատվել էր երկրորդ բերը:

1955—1956 թթ. ձմեռը շատ խիստ էր, ձյան շերտը, հունիսի հարավային լանջերում, 50—60 սմ-ից ավելի էր, իսկ հյուսիսային լանջերում՝ հասնում էր մինչև 110 սմ-ի: Եղջերուները հեռացել էին Ղուշ-Փալասից և Պոսրով գետի ընթացքով իջել էին Ղարաբաղլար գյուղի շրջակայքը, որտեղ ձյունը զգալիորեն պակաս էր: Ղարաբաղլար գյուղի շրջակայքը գերծ է անտառներից և այստեղ միշտ հանդիպում են դալեր: Այդ պատճառով 1956 թվականի գարնանը եղջերուները վերադարձան Պոսրովի անտառը: Սակայն 1956 թվականի գարնանը և ամռանը եղջերուների համար առանձնապես անբարենպաստ էին: Այդ գարնանը առանձնապես շատ էին վալրի կանաչեղեն հա-

վաքողները, որոնցից շատերն տնեին հրացաններ: Սարերում խորը ձյունը մնում է բավական երկար, և ամառային արոտավայրերը տարվող անասունները երկար ժամանակ մնում էին Սոսրովի անտառից վեր գտնվող բաց տարածություններում: Յերեկը անտառի որոշ մասեր վեր էին ածվում արոտավայրերի, որովհետև անասուններն իջնում էին արածելու մինչև գետակներն ընկած ամբողջ տարածություն վրա: Հովիվներն ու քոչվորները կարտում էին անտառը, հավաքում էին ցախը և միշտ կրակում էին, քանի որ ամեն մի քոչավայրում կար մի քանի հրացան: Հնարավոր է, որ հենց այս մշտական սղոմակի հետևանքով եղջերուները հեռացան Ղուշ-Փայասիից և այլևս չվերադարձան աշնանից մինչև 1956 թ. հունիսի վերջը: Այս պատճառով 1956 թ. հուլիսին Կենդանաբանական ինստիտուտը հատուկ էքսպեդիցիա կազմակերպեց եղջերուների որոնման համար (նկ. 1): Սակայն, չնայած մանրակրկիտ որոնումներին, Փառնիի անտառապետության մեջ չհաջողվեց նշել ոչ մի եղջերու: Եղջերուների կողմանքը նկատվել էր մի քանի կետերում (Ղալա-գիրի, Ղուշ-Փայասի, Չարգախլու և այլն), բայց այս բոլոր հետքերը ունեին մոտ մեկ ամսվա հետիվուն: Օգոստոսի սկզբներին 2 էգ բժավոր եղջերու նկատվել են անտառապահների կողմից Արզական պուլվի շրջակայքում, Սոսրովի անտառից 70—80 կմ հեռավորության վրա: Կենդանաբանական ինստիտուտի պրակտիկանտ-տասնող Կ. Հ. Ալբումյանը նոյեմբերի 2-ից մինչև 6-ը շրջել է ամբողջ Սոսրովի անտառը, հատուկ ուշադրություն դարձնելով մերձափնյա տեղամասերի վրա, որտեղ եղջերուների հետքերը կարող էին որոշակի նկատվել ձյան ծածկոցի վրա: Սակայն եղջերուները ոչ մի տեղ չեն հայտնաբերվել: Գեկտեմբերին (8—12) Կենդանաբանական ինստիտուտի կողմից նորից վերսկսվեցին եղջերուների որոնման աշխատանքները, որոնք այս անգամ ավարտվեցին հաջողությամբ. եղջերուները վերադարձել էին Սոսրովի անտառը: Թարմ ձյունը նստելուց հետո կատարված հաշվառմամբ հայտնաբերվեց եղջերուների մի խումբ (տեսողական դիտողությամբ)՝ բաղկացած 23 զվից, իսկ հետքերով նշվեց մի ուրիշ խումբ, որն ընդգրկում էր ոչ պակաս, քան 6 զույլ:

Այս հաշվառումը ցույց էր տալիս, որ, չնայած 1956 թվականի անբարենպաստ պայմաններին, 30 զվիցի ոչ պակաս եղջերուներ էին պահպանվել, իսկ եղջերուների հոտի համար լավ ցուցանիշ էր:

1957 թվականի դարձանը գրանցված էր եղջերուների չորրորդ բերը: Ամռանը նրանք հիմնականում մնում էին Ղուշ-Փայասիում, որտեղ մնացին և 1957—58 թթ. ձմռանը: Այդ ձմեռը դարձյալ շատ մեղմ էր: Եղջերուները արածում էին ինչպես Ղուշ-Փայասիում, աշնան էլ Սոսրով գետի աջ ափին, Սոսրովի անտառից ավելի բարձր (նրանց թիվը թաքստոցները նկատված են ինչպես ձյան, աշնան էլ խոտերի վրա): Բացի այդ, եղջերուները միշտ նկատվել են նաև Ղալա-գիրիում և Չարգախլուում:

1958 թվականի գարնանը նորածինները առանձնապես հաճախակի գրանցվել են Սոսրովի անտառում: Ինչպես մայիսին, աշնան էլ հունիսի սկզբներին մատղաշները մի քանի անգամ ցատկել են ուղղակի մարդկանց վրա: Այսպես, Կենդանաբանական ինստիտուտի աշխատակից Մ. Ս. Աղամյանը հունիսի 4-ին բռնել էր մի նորածին եղջերու (որը պատկանում էր Սոսրովի անտառի եղջերուների հինգերորդ բերին):

Չնայած որ եղջերուներին բաց թողնելու հենց առաջին տարվանից նրանց լրացուցիչ կերակրման համար խոտի գեղեր էին պատրաստվել, բայց

ալի խոտով սնվելու զեպքերը նշվել են միայն 1956—1957 թթ. ձմռանը, իսկ, հիմնականում, ձմռանը եղջերուները սնվել են թփերի, հատկապես մասուրի տարբեր տեսակների, խնձորենու, ուռենու, հացենու, կաղնու և այլ տեսակների ճյուղերով: Նշվել է, որ եղջերուները ձյունը փորել են (մինչև 40 սմ խորություն) և սնվել նրա տակ գտնվող խոտով: Աշնանը եղջերուները հաճախ փորում էին ծառերի տակ գտնվող փափուկ փոփածքը և սնվում շուշանազգիների հյութալի ցողուններով:

1958 թ. հունիսին լրացուցիչ կերպով բաց թողնվեցին Ուսուրիական երկրամասից բերված 19 եղջերուներ (5 արու և 14 էգ): Այդ խմբի բոլոր եղջերուները մի տարեկան էին:

Այս անգամ եղջերուները բաց էին թողնվել ավելի հանդիստ իրավիճակում պայմաններում: Եղջերուները, առանց խմբերի բաժանվելու, զանդուղորեն անցան գետը և զնացին զեպի Ղուշ-Գոյասի:

1958 թ. հոկտեմբերի 21 — 25-ը Կենդանաբանական ինստիտուտի կողմից կազմակերպվեց Սոսրովի անտառի հետազոտումը, որի ժամանակ Ղուշ-Գոյասի շրջակայքից հավաքվեց գալլի կղկղանք: Կղկղանքի մի թարմ կույտում եղջերվի մեծ քանակությամբ մազեր հալոնաբերվեցին, մշուսում՝ նորոտին եղջերվի սմբակներ և ֆալանդներ: Կղկղանքի մշուս լոթ կույտերում հալոնաբերվեցին վալրի ալժի, վարաղի, ընտանի ալժերի մազեր և ոչխարների բուրդ: Բացի դրանից, Հանդգ լուղի շրջակայքում գտնվեց ընծառլուծի կղկղանքի երկու թարմ կույտ, որոնց մեջ նույնպես հալոնաբերվեցին եղջերուների մազեր: Պարզվեց, որ գալլերի խմբից երկուսին սպանել էր Չարգախլուի անտառապահության աշխատակիցը հոկտեմբերի 14-ին: Այսպիսով, տկնհալտ է, որ գալլերի ընտանիքը բնակություն էր հաստատել Սոսրովի անտառի մոտերքում և որ անտառ էր մտնում նաև ընծառլուծը: Այս գիշատիչների առկայությունը լուրջ վտանգ էր ներկայացնում Սոսրովի անտառի եղջերուների գլխաքանակի համար:

Սոսրովի անտառում բծավոր եղջերուների հնգամյա բնակության փորձը ասում է այն մասին, որ նրանց ակլիմատիզացիան անցել է հաջող: Սակայն այս արժեքավոր կենդանիների հոտի հետագա զարգացման համար անհրաժեշտ է մոտ ժամանակներում կիրառել Հայկական ՍՍԽ Գերագույն Սովետի որոշումը արգելանոցների կազմակերպման վերաբերյալ: Այդ արգելանոցների սահմաններում պետք է վերացվի ընտանի կենդանիների արածումը և վալրի կանաչեղենի հավաքումը: Անհրաժեշտ է նաև անհապաղ կազմակերպել միջոցառումներ՝ Սոսրովի անտառում ընծառլուծի, գալլերի և լուսանների քանակը սահմանափակելու նպատակով:

Սոսրովի անտառի եղջերուների հոտի վիճակը պարզելու համար չափազանց անհրաժեշտ է սմեն տարի կատարել նրանց քանակի հաշվառում: Ներկայումս սմբակավորների (որմաղեղների, սալգակների, եղջերուների և այլն) հաշվառման գործում սկսվում է ավելի շատ կիրառվել ավիացիան: Հավանական է, որ խիստ կտրուկաժ ակլիֆ ունեցող անտառում ճշգրիտ հաշվառումներ կատարելու համար կարելի է օգտագործել ուղղաթիւ: Հաշվառումները պետք է կատարել ձմռանը, երբ ծառերը մերկ են և ձյան վրա եղջերուները՝ առանձնապես նկատելի:

Ս. Կ. Դալը, առաջարկելով բծավոր եղջերուների ակլիմատիզացիան Հայկական ՍՍԽ-ում, կատարել էր Հայաստանի և Ուսուրիական երկրամասի




Рис. 1. Схематическая карта места акклиматизации и перебежек пятнистого оленя. 1—место выпуска 1958 г., 2—место выпуска 1954 г., 3—места поймки самцов оленей, 4—область краткосрочных переходов оленей 1954—1958 гг.

Նկ. 1. Բժափոր եղջերվի ակլիմատիզացիայի վայրի և անցումների սխեմատիկ քարտեզը: 1—1958 թ. բաց թողնելու վայրը, 2—1954 թ. բաց թողնելու վայրը, 3—արու եղջերվի բռնելու վայրը, 4—1954—1958 թթ. եղջերվի կարճատև անցումների շրջանը:

անտառների բուսականության, կլիմայի մանրամասն համեմատությունը: Այս անալիզի հիման վրա Ս. Կ. Գալը առաջարկում էր եղջերուներին բաց թողնել Հայաստանի հյուսիսային անտառներում՝ Ալավերդում, Շամշադինի, Կիրովականի և Իջևանի շրջաններում: Բծավոր եղջերուների ակլիմատիզացիայի հաջողությունը Գառնիի անտառապետության քսերոֆիտ անտառներում (որի մեջ է մտնում Սոսրովի անտառը), որոնք իրենց կլիմայով և բուսականությամբ քիչ են նման բծավոր եղջերուների հայրենիքին, թույլ է տալիս միանգամայն նպատակահարմար գտնել վերջիններիս լրացուցիչ բացթողմանը Հայաստանի հյուսիսային անտառներում: Սակայն հնարավոր է, որ այդտեղ ալվելի հարմար կլիմեր կատարել կովկասյան ալպինացի եղջերվի սեականատիպացիան: Բծավոր եղջերուների բացթողմամբ Հայաստանի հյուսիսային անտառներում նպատակահարմար է նաև այն պատճառով, որ Գառնիի անտառապետության անտառների տարածությունը շատ փոքր է (12.000 հեկտարից պակաս), և այդ անտառներում եղջերուների հոտի աճը խիստ սահմանափակ կլինի: Հյուսիսային Հայաստանի անտառների տարածությունը զգալիորեն մեծ է (մոտ 250.000 հեկտար), որը կնպաստի գլխաքանակի ավելացմանը:

Այսպիսով, բծավոր եղջերուների ակլիմատիզացիայի հետագա աշխատանքները պետք է տարվեն երեք ուղղություններ՝ ա) եղջերուների պահպանման գործի կարգավորում և նրանց վերաբերյալ դիտողությունների կազմակերպում, բ) ակլիմատիզացիայի վայրերում գիշատիչների քանակի սահմանափակում, գ) ակլիմատիզացիայի նպատակով եղջերուների բացթողման շրջանների ընդարձակում՝ առաջին հերթին ի հաշիվ հյուսիսային Հայաստանի անտառների:

Հայկական ՍՍՌ-ի Գիտությունների  
ակադեմիայի Կենդանաբանական  
ինստիտուտ

Ստացվել է 8. IV — 1959 թ.

П. П. ГАМБАРИАН

## ИТОГИ АККЛИМАТИЗАЦИИ УССУРИЙСКОГО ПЯТНИСТОГО ОЛЕНЯ В ХОСРОВСКОМ ЛЕСУ

### Резюме

Еще в 1940 г. С. К. Дале, тогда сотрудником бывшего Сектора зоологии Биологического института Армянского филиала АН СССР, была составлена докладная записка: „Данные о возможности реконструкции охотничье-промысловой фауны Армянской ССР“. Среди предполагаемых С. К. Дале для акклиматизации видов значился и пятнистый олень. Однако завоз оленей был организован лишь в 1953 г. директором Зоологического института АН АрмССР покойным А. А. Саркисовым. Олени были выпущены в Хосровском лесу.

Хосровский лес представляет мелкорослое редколесье южного типа с преобладанием дубово-грабовых насаждений, перемежающихся с рощами можжевельника. Лесные участки располагаются небольшими массивами, разделенными между собой полянами и лугами.

Пятнистые олени в количестве 20 голов (16 самок, 4 самца) прибыли в Ереван в конце ноября 1953 г. Одна из самок в дороге пала. На зиму олени были оставлены в Ереванском зоопарке и только 25 мая 1954 г. вывезены и выпущены в количестве 15 самок и 4 самцов в Хосровском лесу. Перевозка была совершена на грузовых машинах и в дороге одна самка была сильно побита. Ее труп был обнаружен в лесу через пять дней. Все самки были беременны (возраст от 4 до 6 лет). Выпуск был произведен несколько неумело, поэтому и олени с самого начала были сильно напуганы, разбились на несколько групп и бежали в разные стороны. Самцы, по-видимому, отделились от самок и в поисках подходящих местообитаний делали особенно большие перебежки, чем, вероятно, можно объяснить вылов через самое короткое время двух самцов в 70 км от точки выпуска на берегу озера Севан (рис. 1). Один из этих самцов вскоре вновь был выпущен в Хосровский лес. Самки, по-видимому, в связи с тем, что были беременны, с самого начала искали для себя подходящее место. Выбрав наиболее густой и влажный участок леса (Гуш-гаяси), они там и сконцентрировались. Недалеко от постоянного своего местопребывания они начали грызть землю под скалой с протекающими солями. В этом месте в дальнейшем был создан искусственный солонец. Уже в начале июня появились прибылые, а в конце июля—начале августа олени небольшими группами по три, пять голов начали совершать небольшие переходы. На восток они доходили до местечка Алимардан, а на запад до Мангюка. Однако к зиме олени опять все сконцентрировались в Гуш-гаяси. Зима 1954—55 гг. была очень мягкая; южные склоны почти всю зиму были совсем без снега, а на северных снег почти нигде не превышал 10 см глубины. По-видимому, в связи с мягкостью зимы, олени всю зиму провели в урочище Гуш-гаяси. В эту зиму в Хосровском лесу не было зарегистрировано ни одного волка. Следы рыси отмечались не раз, но в кале рыси не отмечалось волос оленя.

Летом 1955 г. олени не уходили далеко из Хосровского леса. Наиболее дальние заходы приходились на местечко Кала-диби и урочище Чардахлу. В начале июня был зарегистрирован второй приплод.

Зима 1955—56 г. была очень суровой, даже на южных склонах снег лежал слоем свыше 50—60 см, а на северных достигал даже 110 см. Олени спустились по речке Хосров до сел. Карабахлар, где нет леса и постоянно встречаются волки. Весной 1956 г. они снова вернулись в Хосровский лес. Однако весна и лето 1956 г. для оленей были особенно неблагоприятны. Весной был особенный наплыв сорщиков съедобных трав, многие из которых были вооружены ружьями. В горах лежал глубокий снег и скот, перегоняемый на летние пастбища, на продолжительное время задержался на открытых плато выше лесных участков Хосрова. Скотина паслась вплоть до речек. Пастухи рубили лес, постоянно стреляли. Видимо, все это послужило причиной того, что олени покинули Гуш-гаяси и долго не регистри-

ровались в Хосровском лесу. Поэтому в июле 1956 г. Зоологический институт организовал специальную экспедицию для поисков оленей. Однако на всем протяжении Гарнинского лесничества был зарегистрирован лишь старый кал оленей (более месячной давности). Не были найдены олени и со 2 по 6 ноября, когда были объезжены все речки. С 8 по 12 декабря был проведен учет по свежей пороше. В этот раз было зарегистрировано (визуально) 23 оленя и одновременно по следам следующая группа, в которой насчитано не меньше 6 оленей. Этот учет свидетельствует о том, что, несмотря на неблагоприятные условия 1956 г., оленей сохранилось не менее 30 голов.

Весной 1957 г. был зарегистрирован у оленей четвертый приплод. Летом они в основном держались в Гуш-гаяси, где и остались на зиму 1957—58 г., которая была очень мягкая. Весной 1958 г. прибывшие пятого приплода постоянно регистрировались. Кроме того, олени постоянно отмечались как в Чардахлю, так и в Кала-диби. Хотя с первого же года для оленей ежегодно заготавливалось сено, однако только зимой 1956—57 г. были отмечены случаи использования оленями этого сена. В основном же зимой олени поедали ветви кустарников, особенно разные виды шиповника, ивы, боярышника и др. Отмечено раскапывание снега до 40 см глубиной и поедание травы из-под снега. Осенью нередко олени разгребали лесную подстилку и поедали сочные стебли лилейных.

В июне 1958 г. произведен дополнительный выпуск 19 оленей (рис. 1), привезенных из Уссурийского края (5 самцов и 14 самок). Все олени этой партии были годовалого возраста. На этот раз выпуск производился в спокойной обстановке. Не разбившись на группы, олени не торопясь перешли речку и попали в урочище Гуш-гаяси.

С 21 по 25 октября 1958 г. было организовано обследование Хосровского леса, во время которого был собран около Гуш-гаяси кал волка со значительным количеством волос оленя. Кроме того, в окрестностях с. Анд был найден кал леопарда с волосами оленей.

Опыт пятилетнего пребывания пятнистых оленей в Хосровском лесу говорит о том, что акклиматизация последних прошла успешно. Однако для дальнейшего развития стада этих ценных зверей необходимо в организованном заповеднике ликвидировать пастбу домашнего скота и сбор съедобных трав и организовать меры по ограничению численности волка, рыси и леопарда. Для учетов численности оленей необходимо проводить ежегодный учет их численности, для чего желательно использовать вертолет. С. К. Даль рекомендовал провести выпуск пятнистых оленей в северных лесах Армении—Алавердского, Шамшадинского, Кироваканского и Иджеванского районов. Успех акклиматизации пятнистого оленя в ксерофитных лесах Гарнинского лесничества, мало сходных по климату и растительности с родиной пятнистых оленей, позволяет считать вполне целесообразным дополнительный выпуск пятнистых оленей в северных лесах Армении. Однако вероятно, что еще целесообразнее в северных лесах Армении провести реакклиматизацию кавказского благородного оленя.