

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В. А. РИХТЕР

МАТЕРИАЛЫ К ФАУНЕ КТЫРЕЙ (DIPTERA, ASILIDAE)
ЗАКАВКАЗЬЯ

При обработке материалов по фауне ктырей Закавказья были обнаружены некоторые редкие и мало известные виды ктырей, список которых приведен в настоящей работе. Данные по видам включают после латинского названия вида цитаты фаунистической литературы (Лит.), касающейся Закавказья, перечисление коллекционных материалов (Мат.) и общие данные по географическому распространению. Большая часть обработанных материалов собрана автором; в этих случаях фамилия собирателя не указывается. Условные обозначения районов сборов расшифровываются следующим образом: М. К.—Малый Кавказ, В. Зак.—Восточное Закавказье, Арм. н.—Армянское нагорье, Т.—Талыш.

Список видов

1. *Polysarca violacea* Schin.

Лит. Штакельберг [4]: 301.

Мат. Арм. н.: окр. оз. Севан, 19. VI, 5. VII 1902 (2 ♀♀; Елачиц-Клемант); Асси Ведибек-района, 2. VII 1959 (1 ♂); Нахичевань, Кулибекдиза, 26. VI 1926 (2 ♂♂); 18 км от Гориса по дороге на Кафан, ущелье реки Воротан, 26. VI 1959 (1 ♀)

Кавказ, Алжир.

2. *Philodicus ponticus* Big.

Лит. Штакельберг [4]: 301 (Дагестан, Азербайджан).

Мат. Арм. н.: Эчмиадзин, 21. VIII 1956 (4 ♂♂, 5 ♀♀); Ереван, 20. VIII 1956 (2 ♀♀); Гарни, 19. VIII 1958 (1 ♂).

Кавказ.

3. *Polyphonius laevigatus* Loew

Мат. В. Зак.: Тбилиси, 12, 14. VI 1958 (2 ♀♀; В. Зайцев). Арм. н.: Хосровский лес, 13, 15. VII 1957 (2 ♂♂, 3 ♀♀); Кавушуг Ехегнадзорск. района, 12, 13. VII 1959 (5 ♂♂, 5 ♀♀); 10 км вост. Лякетага Джульфинск. района, 29. VI 1959 (1 ♂); Сисиан, окр. водопада Ша-

ки, 20.VI 1957 (1 ♂), 18 км от Гориса по дороге на Кафан, ущелье реки Воротан, 23.VI 1959 (1 ♀); Мегри, 1.VI 1957 (1 ♂). Т.: Говеры, Зувант, 25, 31.V 1959 (3 ♂♂); Космольян, Зувант, 29.V 1959 (1 ♂); Мистан, Зувант, 30.V 1959 (2 ♂♂); Кялахан, Зувант, 23, 24, 25, 26, 28.V 1959 (4 ♂♂, 4 ♀♀).

Вид был известен из Греции и Малой Азии. По-видимому, широко распространен в восточном Закавказье.

4. *Ommatinus stackelbergi* V. Richt.

Лит. В. Рихтер [1]: 200.

Мат. Арм. н.: Шатин Ехегадзорского района, 11.VII 1959 (1 ♂); 18 км от Гориса по дороге на Кафан, ущелье реки Воротан, 24.VI 1959 (1 ♀).

Армения.

5. *Laphria caspica* Herm.

Лит. Engel [5]: 215.

Мат. Т.: Зейколазы Ярдымливск. района, 16.V 1959 (1 ♀).

Талыш.

6. *Laphria dizonias* Loew

Мат. Арм. н.: Ереван, ущелье реки Бердадзор, 28.VI 1956, 27.VI 1957, 11.VI 1959 (1 ♂, 3 ♀♀); Шатин Ехегадзорского района, 11.VII 1959 (1 ♂); Мегри, 13.V 1957 (1 ♀).

Вид был известен из Греции и Малой Азии.

7. *Laphria fimbriata* Meig.

Мат. В. Зак.: Белоканы, 6.VIII 1928 (1 ♂; Бочарников). Т.: Ленкорань, 10.VII 1937 (1 ♂; Варшалович); Алексеевка, 30.VI 1932 (1 ♂; Знойко).

Вся Европа.

8. *Laphria flava* L.

Мат. М. К.: Кировакан, 4.VIII 1959 (1 ♂).

Вся Европа.

9. *Laphria fuliginosa* Panz.

Мат. Арм. н.: 18 км от Гориса по дороге на Кафан, ущелье реки Воротан, 20, 21.VI 1959 (2 ♀♀); 25 км от Гориса по дороге на Кафан, 25.VI 1959 (1 ♀).

Вид был известен из Европы, кроме ее крайнего севера.

10. *Laphria fulva* Meig.

Мат. М. К.: Боржом, 1867 (1 ♀; Брандт).

Центральная и южная Европа.

11. *Laphria gibbosa* L.

Мат. М. К.: Бакуриани, 2.VII 1949 (1 ♀; Кириченко).
Вид был известен из северной и средней Европы.

12. *Laphria ignea* Meig.

Мат. М. К.: Боржоми, 1867 (1 ♀; Брандт).
Средняя и южная Европа.

13. *Laphria marginata* L.

Мат. Арм. и.: 25 км от Гориса по дороге на Кафан, 25.VI 1959
(1 ♂).

Вид был известен из большей части Европы.

14. *Andrenosoma atrum* L.

Лит. Г. Радде [2]: 452.

Мат. М. К.: Кировокави, 27.VII 1959 (1 ♂).
Средняя и южная Европа (на север до Ленинградской области).

15. *Pogonosoma maroccanum* Fabr.

Мат. В. Зак.: Халдан (Геок-тап), (3 ♀♀; Шелковников).
Южная Европа, Северная Африка.

16. *Pogonosoma unicolor* Loew

Лит. Engel [5]: 243—244.

Мат. Г.: Севакеран, среди течение реки Ленкорань-чай, 16. VII 1931
(1 ♀; Варшалович).
Талыш.

17. *Anarolius fronto* Loew

Мат. Т.: Кылахан, Зувант, 22, 23.V 1959 (2 ♂♂, 1 ♀).
Вид был известен из Средней Азии.

18. *Crobilocerus megilliformis* Loew

Лит. Engel [5]: 271—272 (Ахалцих).

Мат. Арм. и.: Личкваз Мегринск. р-на, 16.V 1958 (1 ♂; В.
Зайцев).
Греция, Малая Азия, Закавказье.

19. *Neolaparus mesasiaticus* Lehr

Мат. Арм. и.: Веди, 10.VIII 1959 (1 ♀).

Вид был известен из Казахстана, Средней Азии и Китая.

Վ. Լ. ՌԻՆՏՆԵՐ

ՆՅՈՒԹԵՐ ԱՆԳՐԿՈՎԱԿԱՍԻ ԴԻՇԱՏԱՆՃՆԵՐԻ (DIPTERA,
ASILIDAE) ՖԱՈՒՆԱՅԻՑ

Ա մ փ ո փ ո ս մ

Անդրկովկասում հայտնի անցած նյութերի որոշման ընթացքում հայտնաբերված են դիշանձնների մի քանի հազվագյուտ և քիչ հայտնի տեսակներ, որոնք բերված են ներկա հոդվածում:

Մուրաքանչյուր տեսակի համար բերված են համապատասխան դրական տվյալներ, կրկնցիոն նյութերի ցուցակը և աշխարհագրական սարածուժը: Մըշակված նյութերի մեծ մասը հայաբեյ և Նեղինակի Այլ դեպքում հայաքոչի անունը չի նշվում: Բերված տեսակներից *Laphria dizonias* Loew տեսակը առաջ հայտնի էր Հունաստանից և Փոքր Ասիայից, իսկ *Anarolius fronto* Loew և *Neolaparus mesasiaticus* Lehr տեսակները ՍՍՍՏ տերիտորիայում գտնվել են միայն Սիջին Ասիայում: Մնացած տեսակների մեծամասնությունը հանդիպում է ՍՍՍՏ եվրոպական մասում, բայց մինչև այժմ չեն գտնվել Անդրկովկասում:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Ринтер В. А. Ктыри рода *Ommatinus* Beck (Dipt. Asilidae) в фауне СССР. Энр. Обзор, XXIX, 1, 1960.
2. Раде Г. Коллекции Кавказского Музея, 1899.
3. Штакельберг А. А. Материалы по фауне двукрылых Ленинградской области II. Diptera Brachycera, Труды Зоологического института АН СССР XV, 1954.
4. Штакельберг А. А. Двукрылые. Животный мир СССР, т. V (Горные области Европейской части СССР), 1958.
5. Engel E. Asilidae, in: E. Lindner. Die Fliegen der palaarktischen Region, Stuttgart, 1930.