

Р. А. АБРАМЯН, И. Ф. ГЕРИЧ

РОЗА ДАМАССКАЯ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ОЗЕРА СЕВАН

По литературным данным роза дамасская в природе не известна. Она произошла от скрещивания *R. gallica* и *R. canina* [1] и является одной из древнейших культурных роз. Так, например, С. А. Ижевский [2] считает установленным, что исходными видами для формирования на Ближнем Востоке садового ассортимента роз послужили местные листопадные виды, включаемые по современной классификации в секцию роз французских—галлики (*Gallicae*).

Между тем главным представителем этой секции считается роза дамасская. По тому же автору (1958) в некоторых местах Южной и Восточной Европы к периоду VIII—IX вв. ассортимент культурных роз был представлен в основном формами и сортами роз дамасской и центифольной. Впоследствии роза дамасская получила широкое распространение на Балканском полуострове.

Дамасская роза является эфиромасличным растением, из лепестков которой изготавливается драгоценное эфирное масло, которое используется в кулинарии и парфюмерии (частичным испарением эфирного масла из лепестков обуславливается столь приятный аромат цветков этой розы).

Поэтому в Казанлыкской долине (Болгария) цветки дамасской розы еще в далеком прошлом стали промышленным объектом для выгонки розового масла, которое имело большой спрос и экспортировалось во множество стран. В настоящее время в Болгарии культура дамасской розы распространилась еще больше.

Из лепестков дамасской розы изготавливается также высоковитаминное варенье.

Розовое масло в основном получается из казанлыкской розы, т. е. из *Rosa damascena* Mill. v. *trigintipetala* (Dieck) R. Keller, в которой оно, по данным С. А. Ижевского, содержится от 0,09 до 0,12%. Известно также, что в СССР казанлыкская роза в промышленных целях разводится в Крыму, на Сев. Кавказе, в восточном Закавказье. Эта форма отличается лучшим развитием кустов, обильным цветением, крупными цветками с сильным ароматом.

Во «Флоре Армении» [3] роза дамасская указана для Ереванского района флоры. Нам она встретилась и на побережье озера Севан, где вполне успешно культивируется. В некоторых селах и районных центрах побережья оз. Севан культура дамасской розы *Rosa damascena* Mill. получила довольно широкое распространение. Она особенно распространена в северо-восточной части побережья в сс. Бабаджан, Памбак, Дара, Сатанахач (Гюней), Шинская, Гадагбулаг Ба-

саргечарского района. Кусты розы дамасской в достаточном количестве можно встретить в самом Басаргечаре и в с. Гомадзор Севанского района.

Культура *Rosa damascena* повсеместно по побережью чувствует себя отлично. Она представлена здоровыми, морозоустойчивыми и хорошо развитыми экземплярами.

Происхождение кустов, которые в дальнейшем послужили маточным растением для дальнейшего распространения дамасской розы по побережью, за давностью времени установить не удалось. Исключение составляют некоторые кусты в с. Дара, которые привезены из Дарачичага.

Порода эта дает обильную корневую поросль, благодаря чему высаженный экземпляр ее быстро разрастается в большой компактный куст. Колхозники успешно применяют отсадку корневых отпрысков для размножения розовых кустов.

На побережье оз. Севан дамасская роза не стрижется и растет высокими кустами, цветущими в продолжение всего июля и начала августа. Нередко можно встретить дамасскую розу вдоль изгороди плодовых садов и парков, образующую густые, сплошные стены живой, декоративной изгороди (Басаргечар—городской парк, частные сады сс. Дара, Памбак и др.).

Метеорологические данные района произрастания дамасской розы колеблются в следующих пределах: средняя годовая температура—от 4,9 до 5,4, средняя температура января—от 5,6 до 8,7, июля—от 11,7 до 15,8, а среднегодовое количество осадков—от 429 до 553 мм.

Rosa damascena на побережье представлена в основном кустами в возрасте от 5—6 до 18—20 лет при высоте от 1,2 м до 2,0 м и диаметре самых толстых стеблей—3,5—4,0 см, ширина крон кустов колеблется от 1,2×1,5 до 3×3 м.

Таблица

Прирост различных экземпляров дамасской розы Басаргечарского района по годам (в см)

Села	1945	1946	1947	1948	Примечание
Басаргечар райцентр)	70	1000	60	26	В 1948 г. прирост измерен к 3/VII
Гомадзор	—	—	120	23	9/VII
Дара	50	45	14	10	26/VII
Сатапахач	50	70	10	10	26/VII
Шинская	—	90	56	12	29/VII
Гейсу	60	80	70	15	31/VII
Кясаман	—	—	150	24	1/VII

Измерение прироста побегов 1948 г. произведено не в конце вегетации (в июле), следовательно, за оставшуюся после измерения побегов часть июля и в течение августа последний должен был несомненно увеличиться. Уход за кустами заключается в хорошем поливе и изредка в удобрении.

Распускание листьев розы дамасской наблюдается в середине мая, бутонизация цветков начинается в конце июня; кусты роз цветут ежегодно, очень обильно, душистыми розовыми цветками, которые на большом расстоянии распространяют приятный аромат. Местное население цветки роз употребляет для варенья, а высушенные лепестки для чая.

Почвы в местах роста кустов *Rosa damascena* представлены легкими суглинками с переходом местами к средним суглинкам или в супесь; структура большей частью мелкозернистая.

Многочисленные кусты, осмотренные нами по различным селам побережья, оказались вполне морозоустойчивыми. Это проверялось следующим образом: кусты осматривались в продолжение двух лет в конце и в начале вегетации. Оказалось, что в эти периоды побеги последних лет не имели отсохших кончиков, за исключением цветущих побегов, срезаемых при сборе цветков, и частично отсохших в местах срезов.

Отсутствии сухих кончиков осенью, после листопада, несмотря на далеко не обильный полив кустов, говорит и о значительной засухоустойчивости их.

Помимо этого, осмотренные кусты оказались здоровыми и устойчивыми от вредителей.

Если сопоставить общее развитие кустов дамасской розы на побережье оз. Севан с розами, растущими в описанных по другим областям СССР и в Болгарии, то можно сказать, что розы побережья превосходят их как по общему вегетативному росту куста, так и по размерам цветков и более сильному их аромату. В этом отношении дамасская роза побережья скорее схожа с ее разновидностью, т. е. с розой казанлыкской.

Вследствие того, что культура розы дамасской повсеместно по побережью оз. Севан отличается хорошим развитием, морозоустойчивостью, отсутствием заболеваемости, быстрым размножением корневыми отпрысками, а также ежегодным обильным урожаем ароматных цветков, по нашему мнению, порода эта является весьма перспективной и может широко разводиться в различных областях. И так, ее можно рекомендовать как эфиромасличное растение для выгонки "розового" масла, т. к. выход массы лепестков роз на побережье Севана, вследствие крупности цветков и обилия цветения, не мал.

Помимо этого, роза дамасская может служить также и как высокодекоративное растение для озеленения населенных мест побережья.

Роза дамасская может быть введена и в ассортимент кустарников, которые могут использоваться при облесении гор Севанского побережья.

Для массового размножения мы рекомендуем отобрать маточники из местных, акклиматизированных и вполне морозоустойчивых кустов. Большинство осмотренных нами кустов *Rosa damascena* ра-

стет на высоте от 1950 до 2000 м над у. м. и поэтому, помимо побережья оз. Севан, порода эта, по-видимому, может быть внедрена и в другие высокогорные районы Армянской ССР.

Лесная опытная станция

Поступило 30.XI 1959 г

Խ. Ա. ԱՐԲԱՆՄԱՆ, Ի. Ֆ. ԴԵՐԻՉ

ԴԱՄԱՍԻ ՎԱՐԴԻ ՍԻՎԱՆԻ ԱՎԱԶԱՆՈՒՄ

Ա մ փ ո փ ո ռ մ

Դամասի վարդի կուլտուրան մեծ տարածում է ստացել Սևանի ավազանի որոշ գլուղերում և շրջանային կենտրոններում:

Այն պատճառով, որ Դամասի վարդի կուլտուրան Սևանի ավազանում աչքի է ընկնում իր լավ զարգացմամբ, ցրտադիմացկունությամբ, ոչ պահանջկոտությամբ, հիվանդությունների նկատմամբ դիմացկունությամբ, արմատային մացառներով շատ արագ բազմացմամբ, ինչպես նաև տարեկան հոտավետ առատ ծաղիկների բերքով, մեր կարծիքով, այս տեսակը կարելի է Սևանի ավազանում մեծ քանակությամբ տարածել տարբեր նպատակների համար՝ որպես բարձրակարգ դեկորատիվ բույս, վարդի լուղ ստանալու համար, անտառապատման նպատակով և այլն:

Մասնաբաժանի բաղմացման համար խորհուրդ ենք տալիս մալրական բույսերն ընտրել տեղական թփերից:

Քանի որ այս կուլտուրան աճում է Սևանի ավազանում, հետևաբար այն կարելի է, մեր կարծիքով, տարածել նաև ընդհանրապես Հայաստանի բարձրադիր շրջաններում:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Деревья и кустарники СССР, т. III, Изд. АН СССР, 1954.
2. Иженский С. А. Розы. Изд-во сельскохозяйственной литературы, 1954.
3. Флора Армении, т. III, Ереван, 1958.