

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В. Е. АВЕТИСЯН

НОВЫЙ ВИД ВАЙДЫ (ISATIS L.) ИЗ АРМЕНИИ

Isatis takhtajanii V. Avet. sp. nova-sect. *Glastum* Boiss.

Perennis. Rhizoma valde ramosum. Collo radialis fibris nigricantibus obsesso. Multicaulis; caules 25—40 cm alt., glabri, in parte superiore valde ramosi. Folia herbacea, glaberrima; radicalia oblongo-elliptica, versus apice acuminata, in petiolum longum attenuata, cum petiolo 8—15 cm lg., 10—15 cm lat.; caulina sessilia obtuse auriculata, apice acuta, 3—6 cm lg., 1—2 cm lat.; summa angusto-lanceolata. Petala 2—3 cm lg., lutea. Siliculae angusto-ellipticae, ad basin et ad apicem rotundatae, in parte inferiore et ad loculum breviter pubescentes. 10—15 mm lg., 3—4 mm lat. Loculus convexus, ellipticus, laevis, nervis mediano et lateralibus tenuibus.

TIPUS: Armenia, mons Kaputdschuch, macrodeclive orientale, in schistoso-lapidosis, 3400 m, 12.VII.1950, A. Takhtajan. In Erevan conservatur.

Haec species valde affinis *I. kozlowskyi* Grossh., sed caulibus magis ramosis, siliculis ellipticis (nec spathulatis), tantum in parte inferiore et ad loculum (nec ad totam faciem) pubescentibus differt. E speciebus proximis aliis, a *I. caucasica* (Rupr.) N. Buch siliculis ellipticis (nec obovatis) et pubescentibus (nec glabris), petalis minoribus et ab *I. araratica* Rupr. foliis et caulibus glabris (nec sdense piloso-pubescentibus), caulibus altioribus (nec 10—15 cm alt.) differt.

Растение многолетнее. Корневище сильно разветвленное. Корневая шейка густо покрыта черными волосками. Многостебельное, стебли 25—40 см выс., голые, в верхней части сильно разветвленные. Листья травянистые, совершенно голые цельнокрайные; прикорневые удлиненно-эллиптические, к верхушке заостренные, оттянутые в длинный черешок, вместе с черешком 8—15 см дл., 10—15 мм шир.; стеблевые сидячие, с тупыми ушками, кверху заостренные, 3—6 см шир.; самые верхние узко-ланцетные. Лепестки 2—3 мм дл., желтые. Стручочки узко-эллиптические, в основании и у верхушки закругленные, в нижней части и по гнезду коротко опушенные, 10—15 мм дл., 3—4 мм шир. Гнездо выпуклое, эллиптическое, гладкое, с тонким срединным и латеральными нервами.

ТИП: Армянская ССР, гора Капутджух, восточный макросклон, южный склон, каменистые россыпи, 3400 м н. у. м., 12.1950. А. Тахтаджян.

Виденные экземпляры: южный отрог Чибухлинского (Чкнахского) хребта, верховья реки Дзорагет, гора Аглаган (Урасар), на осыпях альпийского пояса, 2300 м н. у. м., 1950, А. Ахвердов и Н. Мирзоева; гора Капутджух, восточный отрог г. Чатандаш, южный склон, 14.VIII.1955, Я. Мулкиджанян.

Относится к родству видов, приуроченных к альпийскому поясу горных систем Кавказа и Малой Азии. Наиболее близок к *I. kozlowskyi*



Рис. 1. *Isatis takhtajanii* V. Avet.

Grossh., от которого отличается совершенно голыми стеблями и листьями, эллиптическими (а не лопатчатыми) стручками, опушенными лишь до середины (а не по всей поверхности). От *I. caucasica* (Rupr.) N. Busch отличается эллиптическими (а не обратно-яйцевидными) опушенными (а не голыми) стручками и более мелкими лепестками; от *I. agaratica* Rupr. отличается голыми (а не густо-волосистыми) стеблями и листьями, а также более высоким ростом.

Ботанический институт
АН АрмССР

Поступило 22.X 1960 г.

Վ. Ե. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

ISATIS L. ՑԵՂԻ ՄԻ ՆՈՐ ՏԵՍԱԿՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Հոգիածում նկարագրվում է Isatis L. ցեղի մի նոր տեսակը՝ I. takh-tajanli V. Avet, որը պատկանում է այդ ցեղի այն տեսակների խմբին, որոնք աճում են Կովկասի և Փոքր Ասիայի լեռնային սիստեմների ալպիական գոտում: Նկարագրված տեսակը մոտ է I. kozlowskyi Grossh. տեսակին, որից տարբերվում է բոլորովին մերկ ցողուններով ու տերևներով և էլիպսաձև, մասամբ թափուս պատիճակներով: