

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Э. Ц. ГАБРИЭЛЯН

НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ И РЕДКИЕ ДЛЯ АРМЕНИИ РАСТЕНИЯ

При определении гербарного материала, собранного для изучения флоры Армении, выявились некоторые интересные во флористическом отношении виды. Ниже приводим часть этих новых или довольно редких для Армении растений.

Scilla atropatana Grossh. — Этот новый для Армении вид был описан Гроссгеймом из Джульфы по сборам Гейдеман и Прилипко. Кроме классического местонахождения, этот своеобразный вид был собран еще в четырех других пунктах Нахичеванской АССР. Впервые на территории Армении *S. atropatana* собрана нами в Мегринском районе, к западу от поселка Агаракстрой, на сухом каменистом склоне южной экспозиции, на высоте 600–800 м, 24.IV 1958. Кроме этой небольшой куртины, *S. atropatana* в окрестностях данного местонахождения более не была обнаружена. Хотя луковичные, в основном, только цвели, все собранные экземпляры этой пролески были уже в плодах и с полностью созревшими семенами.

Leptunis trichoides (J. Gay) Schischk. — Новый род и вид для Армении. Представители этого олиготипного (возможно, даже монотипного) рода, распространены в Нахичеване, Средней Азии и Иране. На территории Армении впервые собран нами в Арташатском районе, в окрестностях Двина, на сухих каменистых склонах 4.VI 1956. Кроме этого был найден еще в этом же районе, на гг. Еранос (1956), М. Иландаг (1959) в Вединском районе, на сухих каменистых склонах горного массива Боз-Бурун (1957), в окрестностях Араздаяна (1959) и в Даралагезе, в ущелье р. Терп (1957).

Gypsophila porrigens (L.) Fenzl. Этот новый для Армении вид на Кавказе был известен только из Нахичеванской АССР. На территории Армении обнаружен нами в Арташатском районе, в окр. с. Кахцрашен (Чоррорд-гюх), близ г. Кармир-сар, на вспаханном поле 7.VI.1959. Длинные нитевидные цветоножки, которые во время плодоношения отгибаются и почти повисают, крупные коробочки и семена, а также своеобразное опушение, присущее только верхней половине растения, придает очень характерный облик этому виду. Общее распространение *Gypsophila porrigens* ограничивается Малой Азией, Ираном и Туркменской ССР.

Geranium lucidum L. Новый вид для Армении. Собран в Алавердском р-не, среди скал над станцией Сананн, на восточном сухом

склоне, 25.VI 1960 Э. Ц. Габриэлян и В. Е. Аветисян, определила Э. Ц. Габриэлян.

Pycreus globosus (All.) Rchb. Новинка для флоры Армении. Собрана из окрестностей Мегри, на берегу реки. 2.X. 1955. М. Галстян и Т. Асланян. Определена Т. Егоровой.

Trigonella astroites Fisch. et Mey. Этот редко встречающийся вид, собранный на Кавказе только в Карабахе (р. Инча-чай, *locus classicus*) и Нахичеване, нами обнаружен в Арташатском районе, в окрестностях с. Кахцрашен, на г. М. Илан-даг, на сухом щебнистом склоне 6.VI 1959. Кроме Кавказа, *T. astroites* встречается еще в Малой Азии, Восточном Средиземье и Иране.

Trigonella brachycarpa (Fisch.) Moris. Впервые собран нами с Урцского хребта среди громадных подушек *Gypsophila aretioides*, 28.V 1960. В Армении был известен из Даралагеза (Алаязское ущелье, Габриэлян, 1957) и из Мегри (Гроссгейм).

Carpesium cernuum L. Собран в Иджеванском районе, на территории Иджеванского лесничества 28.IX.1959. Очень редкий вид для Армении. Кроме указания А. А. Гроссгейма (1934) о его произрастании в Лори (Северная Армения), более никаких новых данных не было найдено.

Evax anatolica Boiss. et Heldr. Редко встречающийся вид. В пределах СССР впервые был найден в южной Армении И. Ф. Ходятовским в 1897 г. Позднее был собран на г. Аран-лер и в Даралагезе. Новое местонахождение *E. anatolica* было выявлено на г. Арагац, близ урочища Коша-булах, в горной степи 29.VII 1958 Э. Ц. Габриэлян.

Cyclamen vernum Sw. Единственное местонахождение этого растения было известно из Ноемберянского района по сборам С. Нариняна в 1946 г. Новое местонахождение этого вида также оказалось из Северной Армении. Собрано С. Саркисяном в Иджеванском районе, в окрестностях с. Джохаз, близ опушки леса 6.VII 1959.

Biebersteinia multifida DC. Это многолетнее травянистое растение с утолщенными, клубневидно-вздутыми, лопастными корнями, распространено только в Южном Закавказье, Иране и Средней Азии.

Своеобразные представители этого рода, по своим морфологическим признакам значительно отличающиеся от остальных *Geraniaceae*, несомненно занимают изолированное положение. Еще Агардом род *Biebersteinia* был выделен из *Geraniaceae* в отдельное семейство *Biebersteiniaceae*. Исследования А. Л. Тахтаджяна (1959 г.) подтвердили точку зрения Агарда и в его новейшей системе род *Biebersteinia* также выделяется в семейство *Biebersteiniaceae*.

Следует отметить, что *Biebersteinia multifida*, приуроченная к нижнему горному поясу, встречается довольно редко и всегда произрастает единичными экземплярами. Обнаруженное нами новое местонахождение *B. multifida* в Вединском районе, на сухих, каменистых склонах южных экспозиций горного массива Боз-Бурун

26.IV 1956 г., отличается от предыдущих массовым произрастанием этого вида. Буквально весь склон был усыпан довольно крупными, однако, преимущественно объединенными кустами биберштейнии. При этом, большинство виденных растений было уже с плодами. Посетив те же места в конце мая, нами не было обнаружено ни одного экземпляра этого вида. Очевидно, факт отсутствия *B. multifida* объясняется ее столь резко ускоренным циклом вегетации. Период развития этого вида сокращен настолько, что даже на 15—20 дней, а то и больше, опережает развитие обычных эфемеров. Огромные размеры *B. multifida* (по сравнению с эфемерами) при такой быстротечности периода вегетации, видимо, обуславливаются наличием большого количества питательных веществ, запасенных в крупных, клубневидно-утолщенных корнях. Эти запасающие органы, являясь приспособительной особенностью растения к определенным условиям среды, обеспечивают процессы жизнедеятельности растений в так называемый „период покоя“, а также возобновление всей надземной массы их в более благоприятных условиях.

Небольшое число сборов *B. multifida*, вероятно, также обязано ее столь ранним и быстрым прохождением вегетации.

Ботанический институт
АН АрмССР

Поступило 28.VII 1960 г.

Է. Յ. ԳԱՐՐԵԱՆՆԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՄԻ ԳԱՆԻ ՆՈՐ ԵՎ ՀԱՋԳԱԳՅՈՒՑ ԲՈՒՅՈՒՆ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Հայաստանի ֆլորայի ուսումնասիրությանը ընթացքում հաճաքված հերթաբերումի մշակման հետևանքով, հեղինակը հաշմանարեղի է Հայաստանի համար մի շարք նոր և հազվագյուտ բույսեր՝ *Leptunis trichoides* (J. Gay) Schichk (ցեղ և տեսակ), *Scilla atropatana* Grossh., *Gypsophila porrigens* L. Fenzl., *Trigonella astroites* Fisch. et Mey. և ուրիշ տեսակներ: Աշխատության մեջ բերված են նաև տվյալներ այդ ցեղերի ու տեսակների տարածման, սիստեմատիկայի, բիոլոգիայի և էկոլոգիայի մասին: