

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. М. ОГАНДЖАНЫ

К ИЗУЧЕНИЮ ФАУНЫ ГАМАЗОВЫХ КЛЕЩЕЙ
АРМЯНСКОЙ ССР

При обработке сборов гамазовых клещей, проведенных за последние годы в различных районах республики, были обнаружены виды клещей, являющиеся новыми для фауны гамазид Армянской ССР. Большая часть этих видов свободноживущие хищные формы, фауна которых изучена довольно слабо. Некоторые же виды сравнительно редко отмечены на грызунах или в их гнездах.

Ниже приводится 9 видов клещей, которые впервые указываются для фауны гамазид Армянской ССР.

Определение клещей проверено в Зоологическом институте Академии наук СССР, при любезной консультации Н. Г. Брегетовой.

1. *Parasitus lunaris* (Berl.)

Систематика клещей сем. Parasitidae в настоящее время разработана слабо и видовое определение представителей затруднительно. Некоторые виды хорошо определяются по дейтонимфам, к таким относится и приведенный вид.

Нами клещи были обнаружены под опавшими листьями, в лесной подстилке, под стогами сена, под кучей гниющей травы и в одном случае на грызуне.

Артикский район, с. Гегадир, на обыкновенной полевке (*Microtus agvalis*, 23.IX.43, одна дейтонимфа (Тер-Григорян); Ереванский зоопарк, подстилка, 24.III.61, 10 дейтонимф; там же под стогом сена, 12.VI.61, две дейтонимфы (Марджанян); Разданский район, окр. с. Арзакан, под кучей гниющей травы, 19.VII.62, 19 дейтонимф.

2. *Veigala cervus* (Kram.)

Клещи обитают в лесной подстилке, во мху, трухлявых пнях, в дерновине на лугу, в гнездах грызунов и насекомоядных [2]. Нами 4 дейтонимфы этого вида обнаружены в лесной подстилке, в Разданском районе, окр. с. Арзакан, 19.VII.62.

3. *Veigaia exigua* (Berl.)

Обитают в лесной подстилке, во мху, поверхностном слое почвы, в гнездах грызунов [2]. Одна самка этого вида нами найдена в лесной подстилке, в Иджеванском районе, в окр. монастыря Киранц, 12.VI.62.

4. *Veigaia kochi* (Träg.)

Клещи обитают в тех же стациях, что предыдущие два вида. Нами 7 самок этого вида было найдено в дупле вяза, в лесу в окр. г. Кировакана, 12.VII.61.

5. *Geholaspis longispinosus* (Kram.)

Клещи обитают в лесной подстилке, во мху, трухлявых пнях, в гнездах грызунов [3].

Самки этого клеща обнаружены в лесной подстилке.

Иджеванский район, Дилижанский заповедник, 28.V.62, 2 самки; в том же районе, в окр. монастыря Киранц, 13.VI.62, 1 самка; Шамшадинский район, окр. с. Кирги, 9.VI.62, 2 самки.

6. *Olopachys golubevi* Reit.

Клещи этого вида были описаны сравнительно недавно [4] с полевой мыши и обыкновенной полевки, по материалам с Северного Кавказа (Ставропольский край).

Нами клещи обнаружены в лесной подстилке и гораздо реже на грызунах.

Окр. Кировакана, Кандак, *Microtus major*, *Apodemus sylvaticus* 13.VII.61, 2 самки, 1 самец; Алавердский район, окр. с. Лорут, лесная подстилка, 3.X.60, 1 самка; Разданский район, окр. с. Арзакан, лесная подстилка, 19.VII.62, 6 самок, 8 самцов; Вединский район, Хосровский лес, лесная подстилка, 3.VI.59, 1 самка; Севанский район, окр. с. Лчашен, *Apodemus sylvaticus*, 16.VI.61, 1 самка (Мартirosян); Иджеванский район, Дилижанский заповедник, в дупле граба, 26.V.62, 1 самка, там же, в лесной подстилке, 28.V.62, 2 самки, 8 самцов; Иджеванский район, окр. монастыря Киранц, лесная подстилка, 12.VI.62, 1 самка, 1 самец.

7. *Hypoaspis prasternalis* Willm.

Клещи описаны Вильманом из верхнего слоя почвы [5]. У нас они найдены в верхнем слое почвы, под опавшими листьями и в гнезде грызуна.

Ереванский ботанический сад, верхний слой почвы, 16.IX.59, 2 самки (Марджанян); Ереванский зоопарк, подстилка из-под акации, 22.IV.60, 1 самка; Абовянский район, окр. озера Акна-лич, высокогорные луга, подстилка из гнезда *Microtus arvalis*, 14.IX.60, 4 самки.

8. *Haemolaelaps ellobii* Breg.

Клеши встречаются на слепушенках и степной пеструшке [1]. Нами одна самка обнаружена в Вединском районе, в окр. с. Горован, на мало-азиатской песчанке (*Meriones persicus*), 9.IV.58.

9. *Haemogamasus nidiformes* Breg.

Клеши по самкам плохо отличаются от *H. nidi* Mich., но самцы хорошо различимы [1].

Аштаракский район, гора Арагац, окр. озера Карилич, в гнезде *Microtus arvalis*, 11.VIII.61, 1 самка, 4 самца.

Зоологический институт
АН АрмССР

Поступило 20.II 1963 г.

Ա. Մ. ՕՋԱՆՁԱՆՅԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ-Ի ԳԱՄԱՋԻԴ ՏՋԵՐԻ ՖԱՈՒՆԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Հոգիվածում տրվում են տղերի 9 տեսակներ, որոնք մինչև այժմ չեն նշվել Հայաստանի գամադիդ տղերի ֆաունայի համար: Նշված տեսակներից 6-ը՝ *Parasitus lunaris*, *Veigaia cervus*, *V. exigua*, *V. kochi*, *Geholaspis longispinosus* և *Hypoaspis prasternalis* ազատ ապրող գիշատիչ տեսակներ են, որոնք բնակվում են թափված տերևների տակ, հողի մակերեսային շերտերում և երբեմն հանդիպում են կրծողների բներում: 3-ը՝ *Olopachys golumbevi*, *Haemogamasus nidiformes* և *Haemolaelaps ellobii* հայտնաբերվել են կրծողների վրա կամ նրանց բներում:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Бреgetова Н. Г. Гамазовые клещи (*Gamasoidea*), 1956.
2. Бреgetова Н. Г. Паразитологический сборник, XX, 1961.
3. Бреgetова Н. Г. и Королева Е. В. Паразитологический сборник, XIX, 1960.
4. Рейтблат А. Г. Паразитологический сборник, XVIII, 1958.
6. Willmann C. Veröff. Mus. Nat. Bremen, A, 1, 1949.