

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В. А. РИХТЕР

МАТЕРИАЛЫ К ФАУНЕ КТЫРЕЙ
(DIPTERA, ASILIDAE) КАВКАЗА

Изучение распространения и биологии ктырей (Diptera, Asilidae), виды которых являются активными хищниками, имеет большое значение для выяснения роли ктырей в ограничении размножения вредных насекомых. Предпринятое автором изучение фауны ктырей Кавказа выявило значительное ее богатство.

В основу настоящей статьи положены результаты обработки коллекционных материалов Зоологического института АН СССР, Зоологического института АН Армянской ССР (Ереван) и Музея Грузии (Тбилиси), а также сборов автора. Ниже приводятся новые сведения по географическому распространению видов, до сих пор не известных для фауны Кавказа, из них 2 рода и 9 видов впервые указываются для фауны СССР. Данные по видам включают после латинского названия вида перечисление коллекционных материалов (Мат.) и общие данные по географическому распространению.

СПИСОК ВИДОВ

1. *Satanas gigas* Eversm.

Распространен в восточном Закавказье и долине Аракса.

Распространение: юг Европейской части СССР, Закавказье, Казахстан, Средняя Азия, Сев. Африка, Иран, Монголия, сев. Китай.

2. *Promachus leoninus* Loew.

Обычен в восточном Закавказье (включая южные склоны Главного Кавказского хребта) и Армянском нагорье.

Распространение: юг Европейской части СССР, Кавказ, Малая Азия.

3. *Ommatius tenellus* V. d. W.

Мат.: Азербайджан: Шах-Чинар, сев. Кировабада, 3—10.VII. 1912 (1 ♂; К. Сатунин).

Распространение: Закавказье. Иран (Oldroyd [3]:10), Аравийский полуостров, Египет (Eflatoun [2]:73). Для фауны СССР приводится впервые.

4. *Pamponerus germanicus* L.

Мат.: Грузия: Новый Афон, 17.V (1 ♀; Кириченко); Сухуми, 23.V 1891 (2 ♀ ♀; Яцентковский).

Распространение: Европейская часть СССР, Кавказ. Большая часть зап. Европы.

5. *Neomochtherus mundus* Loew

Мат.: Армения: Гарни, 19.VIII. 1958 (1 ♂; В. Рихтер); Вединский район, Хосровский лес, 14—15.VII. 1962 (2 ♂♂; В. Рихтер).

Распространение: Закавказье, Казахстан и Средняя Азия (П. А. Лер [1]:199—201). Греция, сев. Китай.

6. *Philonicus albiceps* Mg.

Широко распространен на Кавказе, где встречается от северных склонов Главного Кавказского хребта до Армении и Талыша.

Распространение: Европейская часть СССР, Кавказ, Казахстан. Средняя Азия, Сибирь. Большая часть зап. Европы.

7. *Protophanes punctatus* Mg.

Мат.: Армения: Сухой Фонтан, 2.VI. 1936 (1 ♂; Измайлов); окр. Еревана, Джрвеж, 12.IV. 1958 (1 ♂; В. Зайцев).

Распространение: юг Европейской части СССР, Закавказье. Средняя и южная полоса зап. Европы.

8. *Cerdistus geniculatus* Mg.

Мат.: Грузия: Бакуриани, 18.VII. 1923 (2 ♂♂).

Распространение: Закавказье. Большая часть зап. Европы. Для фауны СССР указывается впервые.

9. *Dysmachus dasyproctus* Loew

Обычен в Дагестане, восточной Грузии, Азербайджане и Армении.

Распространение: Кавказ. Греция. Для фауны СССР указывается впервые.

10. *Dysmachus stylifer* Loew

Мат.: Азербайджан: Кусары, 30.V. 1928 (1 ♂; Бочарников).

Распространение: юг и юго-восток Европейской части СССР, Закавказье. Италия, Греция, Малая Азия.

11. *Antipalus varipes* Mg.

Мат.: Армения: ущелье реки Воротан, 18 км от Гориса по дороге на Кафан, 26.VI. 1959 (2 ♀ ♀; В. Рихтер).

Пойманы на берегу реки, на стеблях ежевики; 1 ♀ с добычей (*Onthophagus fissicornis* Kryn.).

Распространение: Европейская часть СССР, Кавказ. Большая часть зап. Европы.

12. *Loewinella virescens* Loew

Мат.: Армения: с. Зейва у озера Айгер-лич, 7.VI 1925 (1 ♂; Шелковников).

Распространение: юг Европейской части СССР, Закавказье, Казахстан, Средняя Азия.

13. *Laphria aurea* Fabr.

Мат.: Краснодарский край: Геленджик, 1908 (1 ♀).

Распространение: Кавказ. Греция, Малая Азия. Для СССР указывается впервые.

14. *Laphria vulpina* Mg.

Мат.: Азербайджан: Мамуста Ленкоранского района, 11.V. 1959 (1 ♀; В. Рихтер).

Распространение: Талыш. Средняя и южная полоса зап. Европы. Для фауны СССР указывается впервые.

15. *Nusa ramicosa* Loew (= *Dasythrix ramicosa* Loew).

Мат.: Армения: Маркара, 22.VIII. 1962 (2 ♀ ♀; В. Рихтер). Азербайджан: Муганская степь, Джафархан, 18.VII. 1926 (1 ♀). Встречен в зарослях тростника; охотясь, ктыри садятся на стебли тростника вниз головой.

Распространение: юго-восток Европейской части СССР (Восточное Предкавказье), Закавказье, Казахстан, Средняя Азия. Иран.

16. *Psilocurus translatus* Oldr.

Мат.: Армения: Араздаян, 14.VI. 1911 (1 экз.; К. Сатунин). Для фауны СССР указывается впервые; этот единственный палеарктический вид рода *Psilocurus*, распространенного в Америке, был описан из Ирана (Oldroyd (2) : 2—4).

Распространение: Армения (долина Аракса), Туркмения. Иран.

17. *Hoplotriclis pallasii* Wied.

Мат.: Ставропольский край: Пятигорск, 5.VI. 1899 (1 ♀; Демкидов).

Распространение: сев. Кавказ. Малая Азия. Для фауны СССР указывается впервые.

18. *Perasis sareptana* Herm.

Мат.: Дагестан: Кумторкале, 5.VII. 1924 (1 ♂; Рябов). Азербайджан: Халдан (Геок-тапа), 2.VII. 1901 (1 ♀; Р. Шмидт).

Распространение: юго-восток Европейской части СССР, Кавказ.

19. *Stenopogon callosus* Pall.

Мат.: Дагестан: Ходжал-Махи, 25.VI, 1.VII. 1926 (1 ♂, 1 ♀; Рябов); Леваши, 11, 13, 21.VI. 1926 (1 ♂, 2 ♀ ♀; Рябов); Гуниб, 12.VII. 1926 (3 ♂♂; Рябов). Грузия: Горная Тушетия, Омало, 1900 м, 21.VII. 1959 (1 ♂; В. Зайцев); Тбилиси, 10.VI. 1959 (2 ♂♂; В. Зайцев). Армения: Севан (Еленовка), 17.VII. 1927 (1 ♂; Дьяконов). Азербайджан: Зувант, Мистан, 30.V. 1959 (1 ♂, 1 ♀; В. Рихтер).

Распространение: Европейская часть СССР, Кавказ, Казахстан, зап. Сибирь.

20. *Stenopogon junceus* Wied.

Обычен в степных и полупустынных районах восточного Закавказья и Армении.

Распространение: южн. Украина, Крым, Закавказье. Малая Азия.

21. *Stenopogon sabaudus* Fabr. (вкл. *ab. fulvulus* Pall.)

Мат.: Краснодарский край: Геленджик, 25.VII. 1908 (2 ♂♂; Н. Воробьев). Дагестан: Махачкала (Петровск), 1.VIII. 1924 (1 ♀; Рябов); Буйнакск, 22, 31.V. 1914 (1 ♂, 1 ♀; Боголюбов); Гуниб, 12.VII. 1926 (1 ♂; Рябов); Дербент, 2.VII. 1925 (1 ♀; Кириченко). Грузия: Боржом, Ликани, 800 м, 9.VII. 1951 (1 ♂, 1 ♀; Виноградова). Армения: Ахта — Севан, 24.VII. 1952 (3 ♂♂; Тер-Минасян); окр. Еревана, Джрвеж, 12, 13.VI. 1960 (1 ♂, 2 ♀ ♀; Длусский); Вединский район, Хосровский лес, 13—15.VII. 1957 (3 ♂♂, 6 ♀ ♀; В. Рихтер); Асни Вединского района, 4.VII. 1959 (1 ♀; В. Рихтер). Азербайджан: Таш-булаг, 23.VI. 1928 (1 ♂; Бочарников); Лякетаг Джульфинского района, 28—30. VI. 1959 (4 ♂♂, 3 ♀ ♀; В. Рихтер).

Распространение: Европейская часть СССР, Кавказ. Зап. Европа, Малая Азия.

22. *Dioctria harcyniae* Lw.

Мат.: Ставропольский край: Кисловодск, Лермонтовский источник, 15.VII. 1914 (2 ♂♂; Бартенев). Грузия: Сухуми, лес, 24.V. 1891 (1 ♀; Яцентковский); Чаквистави, 20—21.V. 1958 (1 ♂, 1 ♀; Ляо Дин-си); Батуми, сады, 25.V. 1953 (1 ♀; Тряпицын); Кахабери, 16.V. 26.VI. 1958 (1 ♂, 2 ♀ ♀; Ляо Дин-си).

Распространение: сев. Кавказ, зап. Закавказье. Средняя полоса зап. Европы. Для фауны СССР указывается впервые.

23. *Dioctria rufipes* Mg.

Мат.: Краснодарский край: Главный Кавказский хребет, у горы Чехашка, 25.VI.1903 (1 ♂; Филиппченко). Армения: Арзакянд, 19.VII.1962 (1 ♀; В. Рихтер).

Распространение: Европейская часть СССР, Кавказ. Большая часть зап. Европы.

24. *Holopogon priscus* Mg.

Мат.: Ставропольский край: ст. Белый уголь близ Ессентуки, 21.VII. 1960 (1 ♂; Сугоняев). Армения: окр. озера Арпа-гель, 18.VII. 1955 (1 ♂; Тертерян); Артик, 10.VII. 1955 (1 ♀; Тертерян).

Распространение: юго-восток Европейской части СССР, Кавказ, Казахстан. Средняя полоса зап. Европы.

25. *Habropogon doriae* Rond.

Мат.: Армения: Арарат, 24.VI. 1928 (1 ♂).

Распространение: Армения (долина Аракса). Северный Иран. Для фауны СССР указывается впервые.

Следует отметить, что слишком короткое описание Рондани ([4] : 297) не дает возможности определить вид с полной достоверностью; однако, судя по размерам определенного экземпляра, необычным для видов *Habropogon*, и его местонахождению, он относится именно к этому малоизвестному виду.

Зоологический институт
Академии наук СССР, Ленинград

Поступило 9.I 1963 г.

Վ. Ա. ՌԻԽՏԵՐ

ՆՅՈՒԹԵՐ ԿՈՎԿԱՍԻ ԴԻՇԱՃԱՆՃԵՐԻ ՖԱՈՒՆԱՅԻՑ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Կովկասում հավաքված նյութերի որոշման ընթացքում հայտնաբերված են գիշաճանճերի (*Diptera, Asilidae*) քիչ հայտնի տեսակներ, որոնք մինչև այժմ Կովկասում չէին գտնված: Նրանցից 2 սեռ և 9 տեսակ գտնվել են ՍՍՌՄ տերիտորիայում առաջին անգամ:

Ներկա հոդվածում բերված են այդ տեսակները: Յուրաքանչյուր տեսակի համար տրվում են կոլեկցիոն նյութերի ցուցակը և աշխարհագրական տարածումը:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Лер П. А. Тр. Инст. защ. раст. Казах. Акад. с.-х. наук, IV, 1958.
2. Efflatoun H. C. A Monograph of Egyptian Diptera, part IV. Family Asilidae (section I). Mem. Soc. R. Ent, Egypte, vol. 4, fasc. 2, 1934.

3. Oldroyd H. Some Asilidae from Iran. Stuttgart. Beiträge zur Naturkunde, 9, 1958.
4. Rondani C. Muscaria exotica Musei Civici Januensis observata et distincta. Fragmentum II. Ann. Mus. civ. Stor. Natur. Genova, vol. IV, 1873.