

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В. Е. АВЕТИСЯН

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ ПО КРЕСТОЦВЕТНЫМ АРМЕНИИ

Ниже приводится ряд новых и редких для Армении видов, выявленных при изучении большого гербарного материала в связи с обработкой сем. Cruciferae для „Флоры Армении“. Кроме того, в данный список включены также виды, которые следует исключить из состава флоры.

1. *Aethionema grandiflorum* Boiss. et Hohen. Географический тип северо-иранский. Новый вид для флоры Армении и СССР. Произрастает в Иране (г. Ельбург). Собирает Э. Ц. Габриелян по дороге из Гарни к храму „Аменапркич“, в ущелье на осыпях, 19.V.1957. Определила В. Е. Аветисян.

2. *Aethionema sagittatum* Boiss. Географический тип иранский. Исключен из состава флоры Армении. В результате ошибочного определения, ранее приводился [2] по экземпляру, относящемуся к *A. salmasium* Boiss: г. Ада-тапа, близ с. Шоржа, 30.V. 1897, собрал Хоцятовский.

3. *Alyssum bracteatum* Boiss. et Buhse. Географический тип иранский. Изучение гербарного материала и изотипа *A. bracteatum* показало, что данный вид на территории Армении не произрастает. Растения, ранее принимаемые за *A. bracteatum*, следует относить к близкому ему *A. tortuosum* W. K., от которого первый отличается округлыми, в основании не суженными листьями и тычинками как длинными, так и короткими, снабженными свободным придатком. Boissier [5] к данному виду относит экземпляр, собранный Buhse „m. Ilanlidagh prope Nachitschewan“. Это растение также является *A. tortuosum*.

4. *Alyssum macrostylum* Boiss. et Hohen. Географический тип малоазийский. Новый вид для флоры Армении и СССР. Впервые собран В. Е. Аветисян и Я. И. Мулкиджаняном из Гукасянского района, между сс. Гегчик и Кефли, 17.VII 1957. Определен В. Е. Аветисян. Своеобразный однолетник, резко отличающийся от остальных видов рода очень длинным столбиком.

5. *Arabis armena* N. Busch. Географический тип атропатенский. Довольно редкий вид во флоре Армении, известный из Мегринского района, г. Союх [1] и Кафанского района, г. Хуступ [4]. Новые местонахождения: Егегнадзорский район, Егегнадзорский перевал, 2.VIII.1955, собрала Э. Габриелян, определила В. Аветисян: там же,

сс. Хачик × Гнишик × Аяр, 5.VIII 1955, собрал Я. Мулкиджанян, определила В. Аветисян.

6. *Berteroa incana* (L.) DC. Географический тип западно-палеарктический. Впервые для Армении приводится А. А. Гроссгеймом [2], затем дважды значится в каталоге семян Ботанического сада АрмССР (1937 г., № 136, 1938 г., № 240). В дальнейшем Гроссгейм [3] этот вид для Армении почему-то не приводит, тогда как его неоднократно собирали из окрестностей г. Дилижана: Дилижан, в лесу, 23.VIII 1938, собрал и определил А. Федоров; Дилижан берег р. Агстеф 10.VII 1959 и сады напротив санатория, 30.IX 1959, собрала Е. Погосян, определила В. Аветисян.

8. *Brassica juncea* (L.) Czern. et Cosson. Географический тип среднеазиатский. В Армении впервые собрала В. Е. Аветисян, 28.VI. 1961, в Октемберянском районе, в окрестностях оз. Айгер-лич, на сорных местах, на территории нутриевого совхоза. А. А. Гроссгеймом [3] приводится для ботанико-географического Мегринского округа, на территории АзССР (с. Пирчеван).

8. *Camelina pilosa* (DC). N. Zing. Географический тип европейский. Гроссгейм [2, 3] приводят для Армении по экземпляру: № 5053, в окрестностях Еленовки, 15.VI.1928, собрали А. Шелковников и Э. Кара-Мурза, определил Е. Бордзиловский. Данное растение следует определять как *C. microcarpa* Andr. Так как других сборов *C. pilosa* из Армении не имеется, этот вид должен быть исключен из состава флоры.

9. *Crabbe armena* N. Busch. Географический тип атропатенский. Новый вид для флоры Армении, на Кавказе известный из НахАССР. Собран Э. Габриелян и Я. Мулкиджаняном 26.V 1950 г., в Вединском районе, с. Горован. Определила В. Аветисян.

10. *Cymatocarpus grossheimii* N. Busch. Географический тип атропатенский. Для Армении приводится [2, 3] в результате ошибочного определения экземпляра, относящегося к *Brassica elongata* Ehrh.. Беюк-Веди 29.V 1926, собрал А. Шелковников. Данный вид на Кавказе известен из НахАССР. Богатые многолетние сборы из пограничных районов не подтвердили возможность его произрастания на территории Армении.

11. *Draba polytricha* Ledeb. Географический тип малоазийский. Указание данного вида для Армении ошибочно. Оно основано на следующих экземплярах: Амаганский хр., г. Кизил-даг, 15.VII.1938, г. Аг-даг, 23.VII.1938, собрал А. Федоров; там же, 16.VIII.1929, собрали О. Зедельмейер и Т. Гейдеман; г. Арагац, южная вершина 31.VIII.1946, собрали С. Наринян и Г. Тонакян.

Перечисленные экземпляры относятся к очень близкому виду *D. agaratica* Rupr., который часто путают с *D. polytricha*.

Изучение типа *D. polytricha*, хранящегося в гербарии БИН СССР, показало, что эти виды довольно резко отличаются характером опушения листьев. На Кавказе *D. polytricha* произрастает только в Джавахетии (Грузия).

12. *Erysimum feodorovii* Kassum. Географический тип атропатенский. Известен из НахАССР. Для Армении приводится впервые. Произрастает: Котайкский район, сс. Эйлар X Арзни, 9.VII 1957. Собрала и определила В. Аветисян.

13. *Erysimum wagifii* Kassum. Географический тип атропатенский. Как и предыдущий известен из НахАССР. Новый вид для флоры Армении. Произрастает: Ю.—З. Зангезур, бассейн р. Меграгет, г. Союх, 9.VIII.1945, собрал Г. Тонакян, определила В. Аветисян; Мегринский район; г. Дагли-даш, 8.VII.1947, собрал А. Долуханов, определила В. Аветисян; там же окрестности с. Вагравар, 5.VI.1947, собрала Ш. Асланян, определила В. Аветисян; ущелье р. Вагравар-чай, 25.V.1947, собрал А. Долуханов, определила В. Аветисян.

14. *Roripa brachysagra* (C. Mey.) G. Woron. Географический тип сарматский. Ошибочно приводится для Армении [3] по следующим экземплярам: Русская Армения, 1837, собрал К. Кох; Араздаи, 1914, собрал А. Гроссгейм. Первый из них относится к *R. austriaca* (Crantz) Bess. второй — к *R. amphibia* (L.) Bess.

15. *Roripa silvestris* (L.) Bess. Географический тип европейский. Новый вид для флоры Армении. Произрастает: Красносельский район, с. Верин Чамбарак, 16.VIII.1954, собрал А. Багдасарян, определила В. Аветисян. В Закавказье известен из Абхазии, Аджарии и Бакуриани.

16. *Samolus glastifolia* (Fisch. et Mey.) Boiss. Географический тип атропатенский. Новый вид для флоры Армении. Произрастает: Мегринский район, пос. Агарастрой, 24.IV.1958, собрала Э. Габриелян, определила В. Аветисян. Ближайшее местонахождение НахАССР.

17. *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. Географический тип средиземноморско-европейский. Новый вид для флоры Армении. Произрастает: Басаргечарский район, устье р. Гилли, 26.VII.1946, собрала Р. Карапетян, определил Д. Сосновский; Кафанский район, Шикахохский заповедник, с. Н. Анд, 22.V.1960, собрал М. Григорян, определила В. Аветисян; окр. г. Степанавана, 6.IX.1959, собрала Т. Асланян, определила В. Аветисян.

18. *Thlaspi umbellatum* Stev. Географический тип гирканский. Новый вид для флоры Армении. Произрастает: Кафанский район, Шикахохский заповедник, 13.VI.1959, собрал М. Григорян, определила В. Аветисян; там же, 29.III.1960 и 18.IV.1960; он же. Данный вид приурочен к Вост. Закавказью, Талышу и Диабарскому округу. Произрастание его на территории Армении представляет определенный интерес с точки зрения происхождения и взаимосвязей флор.

Վ. Ե. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

ՖԼՈՐԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ՆՇՈՒՄՆԵՐ ԽԱՉԱԶԳԻՆԵՐԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Հողվածում բերվում են Հայաստանի մի շարք նոր և հազվագյուտ տեսակներ խաչազգիների ընտանիքից, ինչպես նաև մի քանի տեսակներ, որոնք Հայաստանի ֆլորայի կազմից հանված են հեղինակի կողմից:

Նոր տեսակներ՝ *Aethionema grandiflorum* Boiss et Hohen, *Alyssum macrostylum* Boiss. et Huet., *Brassica juncea* (L.) Czern, et Cosson., *Crambe armena* N. Busch., *Erysimum feodorovii* Kassum., *Erysimum Wagilii* Kassum., *Roripa silvestris* (L.) Bess., *Sameraria glastifolia* (Fisch. et Mey) Boiss., *Sisymbrium officinale* (L.) Scop., *Thlaspi umbellatum* Stev.

Հազվագեյ հանդիպող տեսակներ՝ *Arabis armena* N. Busch, *Berteroa incana* (L.) DC.

Հանված տեսակներ՝ *Aethionema sagittatum* Boiss. *Alyssum bracteatum* Boiss. et Buhse, *Camelina pilosa* (DC.) N. Zing., *Cymatocarpus grossheimii* N. Busch. *Draba polytricha* Ledeb., *Roripa brachycarpa* (C. Mey.) G. Woron.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Аветисян В. Е. Изв. АН АрмССР (биол. науки), т. XIII, 4, 1960.
2. Гроссгейм А. А. Флора Кавказа, Изд. I, т. II, 1930.
3. Гроссгейм А. А. Флора Кавказа, Изд. II, т. IV, 1960.
4. Еленевский А. Г. Изв. АН АрмССР, (биол. науки), т. XIII, 4, 1960.
5. Boissier F. Flora orientalis, t. I, 1867.