

С. А. СИМОНЯН

МАТЕРИАЛЫ К МИКОФЛОРЕ МЕГРИНСКОГО РАЙОНА  
 АРМЯНСКОЙ ССР

В основу настоящего сообщения положены материалы, собранные во время экспедиционных обследований Мегринского района Армянской ССР весной 1958, весной и осенью 1962—1963 гг., а также летом 1963 г. Обследования охватили низменные (Мегри, Ньюади, Агарак), предгорные (Шванидзор, Варданадзор, Анкаван) и горные части района (Личк, Джиндара).

Обработанный материал представлен 96 видами и 28 формами грибов, которые распределяются между классами следующим образом: *Phycomycetes*—4 вида; *Ascomycetes*—22 вида, 28 форм; *Basidiomycetes*—39 видов; *Fungi imperfecti*—31 вид. Среди сумчатых грибов наиболее обильно представлены мучнисто-росяные, среди базидиальных—ржавчинные, а среди несовершенных грибов большая часть приходится на долю гифомицетов.

Из собранных грибов 5 видов и 4 формы отмечаются впервые в Армянской ССР, а 35 видов и 6 форм впервые в Мегринском районе.

Ниже приводится список обнаруженных видов грибов.

Класс PHYCOMYCETES

Сем. *Peronosporaceae*

1. *Peronospora effusa* D. B.—Опред. низш. раст. (1954), 62.

На *Chenopodium album* L.—Мегри, повсеместно, 17. V. 1962 г.

2. *Plasmopara viticola* Berl. et de Toni—Опред. низш. раст. (1954), 61.

На *Vitis vinifera* L. (одичавший)—третий отрог Мегринского хребта восточнее с. Ньюади, 18. VII. 1963 г.

Сем. *Albuginaceae*

3. *Albugo bliti* Zev. Определ. низш. раст. (1954), 64.

На *Amaranthus retroflexus* L.—с. Ньюади, русло реки, 18. VII. 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

4. *Albugo candida* (Pers) Gray—Опред. низш. раст. (1954), 64.

На листьях *Barbarea plantaginea* L.—окр. Мегри, у канавки, 17. X. 1962.

## Класс ASCOMYCETES

Сем. *Exoascaceae*

5. *Exoascus deformans* Fckl.—Ячевский (1926), 29.  
На *Persica vulgaris* L.—Мегри, сады, 16—18. V. 1962 г.

Сем. *Erysiphaceae*

6. *Podosphaera leucotricha* Salm.—Симонян (1959), 107.  
Конидиальная стадия на *Malus domestica* Borkh.  
Мегри, во дворе грезавода, 28. IV. 1958 г.
7. *Sphaerotheca pannosa* (Wallr.) Zev.  
var. *persicae* Wagon.—Симонян (1959), 96.  
На листьях и плодах *Persica vulgaris* L. Мегри, сады, 16. V. и  
17. X. 1962 г.  
var. *rosae* Wagon.—Симонян (1959), 97.  
Сумчатая стадия на шипах *Rosa* sp. совместно с *Phoma* sp. и  
*Cytospora rosarium* Grev., ущелье р. Айри-Гег у пос. Джиндара, 2000—  
2200 м н. у. м., 26. IV. 1958 г.
8. *Sphaerotheca macularis* Magn.  
forma *humuli* Lev.—Симонян (1959), 101.  
Конидиальная стадия на листьях *Humulus lupulus* L. Мегри, 16. V.  
и 17. X. 1962 г.  
forma *sanguisorbae* Rabh.—Симонян (1959), 100.  
Конидиальная стадия на *Poterium polygamum* Walldst. et Kit.—окр.  
пос. Джиндара, сев.-вост. скл., 20. VII. 1963 г.  
В Мегринском районе отмечается впервые.  
forma *geranii* Pot.—Ячевский (1927), 67.  
Конидиальная (на листьях) и незрелая сумчатая (на стеблях) ста-  
дии на *Geranium robertianum* L.—окр. пос. Джиндара, сев.-вост. скл.  
у родника, 20. VII. 1963 г. В Армянской ССР отмечается впервые.  
forma *alchimillae* Stein.—Симонян (1959), 98.  
Конидиальная стадия и единичные незрелые клейстокарпии на  
*Alchimilla tredecimloba* Bus. и *A. grossheimii* Juz. окр. пос. Джиндара,  
сев.-вост. скл. у родника, 20. VIII. 1963 г. На *A. tredecimloba* гриб  
поражен *Cicinnobulus cesatii* D. B.  
В Мегринском районе отмечается впервые.
9. *Sphaerotheca fuliginea* Pall.  
forma *cucurbitae* Jacz.—Ячевский (1927), 99. Конидиальная и сум-  
чатая стадии на *Cucurbita pepo* L. Мегри, приусадебные участки.  
17. X. 1962 г.  
forma *plantaginis* Duby.—Симонян (1959), 101.  
Конидиальная и сумчатая стадии на *Plantago* sp. Мегри, русло р.  
Мегри, 17. X. 1962 г.
10. *Erysiphe graminis* D. C.  
forma *bromi* March.—Симонян (1959), 112.

Конидиальная и сумчатая стадии на *Bromus commutatus* Schrad, дорога Мегри—Легваз, зап. скалистый склон, 17. V. 1962 г.; на *Bromus* sp. конидиальная стадия—восточнее ущелья р. Спетри, арчевое редколесье к сев.-вост. от пос. Анкаван, юго-зап. скл., 1300—1500 м н. у. м., конидиальная и сумчатая стадии; на *Bromus* sp. с. Шванидзор, ущелье Герундара, северо-зап. скл., 1000—1300 м н. у. м., 28. IV. 1958 г.  
форма *lolii* Roum—Симомян (1959), 113.

Конидиальная стадия на *Lolium rigidum* Gaud. дорога Мегри—Легваз, скалистый зап. скл., 17. V. 1962 г.

форма *roae* March.—Симомян (1959), 114.

Конидиальная и сумчатая стадии на листьях *Poa bulbosa* L. окр. Мегри, скалистые склоны, 16. V. 1962 г.: склоны г. у пос. Агарак, 22—23. IV. 1958 г.; конидиальная стадия на *Poa pratensis* L. дорога Мегри—Легваз, зап. скалистые склоны, 17. V. 1962 г., дорога Варданадзор—Личк, юго.-зап. скл., 1350 м н. у. м., 24. IV. 1958.

### 11. *Erysiphe horridula* Lev.

форма *asperruginis* Dietr.—Симомян (1959), 115.

На листьях и стеблях *Asperugo procumbens* L. дорога Мегри—Легваз, 17. V. 1962 г.;

форма *lappulae* Jacz.—Ячевский (1927), 136.

Конидиальная и сумчатая стадии (с единичными клейстокарпиями) на *Lappula* sp. склоны гор у пос. Агарак, 23. IV. 1958 г., дорога Мегри—Легваз, сухое русло р. Мегри, 17. V. 1962 г.

В Армянской ССР отмечается впервые;

форма *poppeae* Jacz.—Симомян (1959), 117.

Конидиальная стадия на листьях *Poppea* sp. каменистые склоны гор. у пос. Агарак, 23. IV. 1958 г.

### 12. *Erysiphe labiatarum* Chev.

форма *stachydls* Dietr.—Симомян (1959), 121.

Конидиальная стадия на *Stachys* sp. окр. с. Личк, у родника, 19. VII. 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

### 13. *Erysiphe umbelliferarum*—D. В. Симомян (1959), 122.

Конидиальная и сумчатая стадии на *Malaballa dasiantha* (C. Koch) A. Grossh. Мегри, скалистые склоны, 16. V. 1962 г.

В Армянской ССР отмечается впервые (по-видимому, новая форма *E. umbelliferarum*).

### 14. *Erysiphe communis* Grev.;


форма *viciae* Jacz.—Симомян (1959), 120.

Конидиальная стадия на *Vicia truncatula* M. В.—окр. с. Личк, пос. Джиндара, сев вост. скл., 20. VII. 1963 г.;

форма *trifolii* Rabh.—Симомян (1959), 129.

Конидиальная стадия на *Trifolium arvense* L. окр. пос. Джиндара, левый берег р. Мегри, юго-зап. скл., 19. VII. 1963 г.;

форма *medicaginis* Dietr.—Симомян (1959), 128.



Конидиальная стадия на *Medicago rigidula* (L.) Dsr. окр. пос. Джиндара, левый берег р. Мегри, юго-зап. скл., 19. VII. 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

15. *Erysiphe cichoracearum* D. C.;

forma *vincae* Pot.—Ячевский (1927), 184.

Сумчатая стадия на *Vinca herbacea* W. К. дорога Личк-Айгедзор, ущелье по левому берегу р. Мегри, 21. VII. 1963 г.

В непосредственной близости от больных растений росла группа экземпляров *Vinca herbacea*, пораженных *Russinia vincae*, но без следов мучнистой росы.

В Армянской ССР отмечается впервые;

forma *verbasci* Jacz.—Симонян (1959), 140.

Конидиальная стадия на *Verbascum* sp. окр. с. Личк, у родника 19. VII. 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

forma *scirpinae* Jacz.—Симонян (1959), 144.

Сумчатая стадия на *Scirpina vulgaris* Cass.—третий отрог Мегринского хребта восточнее с. Ньюади, 18. VII. 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

16. *Leveillula compositarum* Golov.;

forma *lactucae* Sim. Симонян (1962), 134.

Сумчатая стадия на *Lactuca serriola* L. Мегри, русло р. Мегри 17. X. 1962 г.

17. *Leveillula taurica* (Lev) Arn.;

forma *regani* Jacz.—Симонян (1962), 140.

Конидиальная и сумчатая стадии на *Reganium Harmala* L. между с.с. Шванидзор и Ньюади, фриганоидный склон, 17. VII. 1963 г.

18. *Phyllactinia suffulta* Sacc.;

forma *moricola* Sacc.—Симонян (1962), 130.

Конидиальная, сумчатая стадии на листьях *Morus* sp. Мегри 17. X. 1962 г.

forma *paliuri* Sacc.—Симонян (1962), 128.

Сумчатая стадия на *Paliurus spina-christi* Mill.—Мегри, 17. X. 1962 г.

19. *Uncinula clandestina* Schroet.;

forma *celtidis* Nevodovskyi—Симонян (1962), 118.

Конидиальная и сумчатая стадии на *Celtis caucasica* W. Мегри, 17. X. 1962 г.

20. *Uncinula salicis* Wint.;

forma *salicis* Jacz.—Симонян (1962), 119.

Конидиальная и сумчатая стадии на *Salix viminalis* L. совместно с *Melampsora salicis-albae* Kleb.,—11. Мегри, сады, 17. X. 1962 г.

21. *Oidium dubium* Jacz.—Симонян (1962) 149.

На *Quercus macranthera* F. et M. окр. с. Личк, пос. Джиндара, сев.-вост. склон, 20. VII. 1963 г.; *Q. iberica* Stev. пос. Джиндара, левый берег р. Мегри, юго-зап. скл., 19. VII. 1963 г.

22. *Oidium erysiphoides* Fr.—Симонян (1962) 150.

На листьях *Mentha longifolia* (L.) Huds.—дорога Мегри—Легваз, зап. скалистый склон, у ручья, 17. V 1962 г.; на *Borraginaceae* (*Onosma*?) окр. Мегри, русло р. Мегри, 17. X. 1962 г.

23. *Oidium Tuckeri* Berk.—Ячевский (1927), 459.

На *Vitis vinifera* L. Мегри, 17. X. 1962 г.

#### Сем. *Roselliniaceae*

24. *Crotonocarpia moriformis* Fuck. Опр. низш. раст. 1954. т. III. 206. На сухих веточках *Spiraea hyperifolia* L. и *Rhamnus pallasii* F. et M. с. Шванидзор, ущелье Герун-дара., сев-зап. скл., 1000—1300 м н. у. м., 28. IV. 1958 г.

В Армянской ССР отмечается впервые.

#### Сем. *Amphisphaeriaceae*

25. *Strickeria Chevalieri* Karst. Опр. низш. раст. (1954) т. III, 227.

На сухих веточках *Rhamnus pallasii* F. et M. с. Шванидзор, ущелье Герун-дара, северо-зап. склон, 1000—1300 м н. у. м. 28. IV. 1958 г.

В Армянской ССР отмечается впервые.

#### Сем. *Mycosphaerellaceae*

26. *Mycosphaerella iridis* Auersw. Опр. низш. раст. (1954), т. III, 254. На перезимовавших листьях и стеблях *Iris sulfurea* C. Koch, пос. Джиндара, сев. склон, 2000—2200 м н. у. м., 26. IV. 1958 г.

#### Класс BASIDIOMYCETES

##### Сем. *Exobasidiaceae*

27. *Microstroma juglandis* Sacc. Опр. низш. раст. (1955), т. IV. 99.

На листьях *Juglans regia* L. окр. пос. Джиндара, левый берег р. Мегри, в русле, 19. VI. 1953 г.

##### Сем. *Ustilaginaceae*

28. *Ustilago cynodontis* P. Henn.—Ульянищев (1952) 52.

На *Cynodon dactylon* (L) Pers. окр. Мегри, дорога на станцию, сухой скалистый юго-зап. склон, 18. V. 1962 г.

29. *Ustilago Heufleri* Fuck.—Ульянищев (1952), 90.

На *Tulipa sosnovskyi* Akhw. et Mirz. дорога Варданадзор—Личк, юго-зап. скл., 1350 м н. у. м., 24. IV. 1958 г.

30. *Ustilago penniseti* Rabh.—Ульянищев (1952), 45.

На *Pennisetum orientale* Rich.—дорога Мегри—Легваз, склоны гор, очагами. 17. X. 1962 г.

В Армянской ССР отмечается впервые. Редкий вид. По Ульянищеву (1952) данный гриб собран в Нахичеванской АССР Вороновым 20. V. 1914 г.

31. *Sphacelotheca andropogonis* (Opiz.) Bub.—Ульянищев, (1952) 99. На *Botriochloa caucasica* (Trino) Keng. и *B. ischaemum* (L.) Keng. окр. Мегри, сады, 16. V. 1962 г.

Сем. *Tilletiaceae*

32. *Tilletia lolii* Auersw.—Ульянищев (1952), 124.

На *Lolium* sp. третий отрог Мегринского хребта восточнее с. Ньювади совместно с *Puccinia coronifera* Kleb., II, III, 18. VII. 1963 г.  
В Армянской ССР отмечается впервые.

Сем. *Melampsoraceae*

33. *Melampsora alii-populina* Kleb.—Тетеревникова-Бабаян (1952) 30.

На *Populus transcaspicus* Jarm., II, дорога Личк—Айгедзор, ущелье по левому берегу р. Мегри, 21. VII. 1963 г.  
В Мегринском районе отмечается впервые.

34. *Melampsora salicis-albae* Kleb.—Тетеревникова-Бабаян (1952), 31.

На *Salix viminalis* L., II, II, Мегри, сады, совместно с *Uncinula salicis* Wint f. *salicis* Jacz., 17. X. 1962 г.

Сем. *Pucciniaceae*

35. *Uromyces glycyrrhizae* (Rabh.) Magn.—Тетеревникова-Бабаян (1952) 56.

На *Glycyrrhiza glabra* L., II, Мегри, сухое русло реки Мегри-чай, 18. V. 1962 г.

36. *Uromyces festucae* Syd.—Тетеревникова--Бабаян, (1952), 42.

На *Festuca sulcata* L., II, окр. с. Личк, пос. Джиндара 20. VII. 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

37. *Uromyces minor* Schr.—Тетеревникова-Бабаян (1952) 52.

На *Trifolium ambiguum* M. B. III, окр. с. Личк, пос. Джиндара, 20. VII 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

38. *Uromyces rumicis* (Schum). Wint.—Тетеревникова-Бабаян (1952) 43.

На *Rumex* sp., II и III, окр. с. Ньювади, берег речки, совместно с *Ramularia decipiens* Ell. 18. VII. 1963 г.

39. *Trachyspora alchimillae* (Pers.) Fuck. et Ev.—Тетеревникова-Бабаян (1952) 39.

На *Alchimilla grossheimii* Juz., II и III, окр. с. Личк, пос. Джиндара, 20. VII. 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

40. *Puccinia absinthii* D. C.—Ульянищев (1962), т. III, часть 2, 115.

На *Artemisia absinthium* L., II, окр. с. Личк, пос. Джиндара, сев.-вост. скл., 20. VII. 1963 г., на перезимовавших стеблях того же растения, III, окр. Джиндара, сев. склон, 2000—2200 м н. у. м., 26. IV. 1958 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

41. *Puccinia achilleae* Cooke.—Ульянищев. (1962), т. III, ч. 2, 109.  
На *Achillea tenuifolia* Lam., III, окр. Мегри, скалистые склоны,  
16. V. 1962 г.

42. *Puccinia bromina* Erikss.—Тетеревникова-Бабаян (1952), 78.  
На *Bromus tectorum* L., II и III, окр. с. Личк., пос. Джиндара,  
сев.-восточный склон, 20. VII. 1963 г.

43. *Puccinia cesatii* Schr.—Тетеревникова-Бабаян (1952), 69.  
На *Botriochloa ischaemum* (L.) Keng., II, дорога Мегри—Легваз,  
запад. скалистый склон, 17. V. и 17. X. 1962 г. третий отрог Мегрин-  
ского хребта восточнее с. Ньюади, 18, VII. 1963.

В Мегринском районе отмечается впервые.

44. *Puccinia cirsii* Lasch.—Ульянищев (1962), т. III, ч. 2, 145.  
На *Cirsium* sp. II, восточнее ущелья р. Спетри, арчевое редко-  
лесье к северо-востоку от пос. Анкаван, юго-зап. скл., 1300—1500 м  
н. у. м., 25. IV. 1958 г., окр. с. Личк. пос. Джиндара, сев.-вост. склон,  
20. VII. 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

45. *Puccinia coronifera* Kleb.—Тетеревникова-Бабаян (1952) 73.  
На *Rhamnus pallasii* F. et M., I, с. Шванидзор, ущелье Герун-  
дара, северо-зап. скл., 1000—1300 м н. у. м. 28. IV. 1958 г., на *Lo-  
lium* sp. II и III, третий отрог Мегринского хребта, восточнее с. Нью-  
вади, совместно с *Tilletia lolii* Auersw, 18. VII. 1963 г.; на *Agropyrum  
gerpens* (L.) P. B., III, окр. пос. Джиндара, левый берег р. Мегри, юго-  
запад. склон, 19. VII. 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые. На *Agropyrum* в Ар-  
мянской ССР гриб указывается впервые.

46. *Puccinia dispersa* Erikss.—Тетеревникова-Бабаян (1952), 81.  
На *Secale cereale* L., II, окр. пос. Джиндара, левый берег р. Мег-  
ри, юго-зап. склон, край поля, 19. VII. 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

47. *Puccinia echinopis* D. S.—Ульянищев (1962), т. III, ч. 2, 130.  
На *Echinops pungens* Trautw., II, с. Личк. пос. Джиндара, северо-  
восточный склон 20. VII. 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

48. *Puccinia Falcaria* (Pers.) Fuck.—Тетеревникова-Бабаян (1952) 95.  
На *Falcaria Rivini* Host., I, восточнее ущелья р. Спетри, арчевое  
редколесье к северо-востоку от пос. Анкаван, юго-западный склон,  
1300—1500 м. н. у. м. 25 IV. 1958.

49. *Puccinia graminis* Pers.—Тетеревникова-Бабаян (1952) 64.  
На *Agropyrum* sp., III, третий отрог Мегринского хребта восточ-  
нее с. Ньюади, 18. VII. 1963 г.

50. *Puccinia Harioti* Lagerh.—Тетеревникова-Бабаян (1952) 100.  
На *Stachys Schtschegleevii* D. Sosn. I и II, дорога Мегри—Легваз,  
западный скалистый склон, 17. V. 1962 г.; на *S. inflata* Benth., I, с.

Шванидзор, ущелье Герун-Дара, сев.-зап. склон, 1000—1300 м н. у. м., 28. IV. 1958 г.

51. *Puccinia jasmini* D. C.—Ульянищев (1962), т. III, часть 2, 53.

На *Jasminium fruticans* L., III, с. Шванидзор, ущелье Герун-дара, сев.-зап. склон, 1000—1300 м н. у. м., 28. IV. 1958 г., дорога Личк—Айгедзор, ущельице по левому берегу р. Мегри. 21. VII. 1963 г.

52. *Puccinia malvacearum* Mont.—Тетеревникова-Бабаян (1952), 91.

На *Alcea flavovirens* Boiss. et Buhse, III, третий отрог Мегринского хребта, восточнее с. Ньюади, 18. VII, 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

53. *Puccinia menthae* Pers.—Тетеревникова-Бабаян (1952), 102.

На *Satureia macrantha* C. A. M., II, дорога Шванидзор—Ньюади, фриганоидный склон, 17. VII. 1963 г.

54. *Puccinia phlei-pratensis* Erikss. et Henn.—Тетеревникова-Бабаян (1952) 70.

На *Phleum phleoides* (L.) Simk., II, окр. пос. Джиндара, левый берег р. Мегри. 19. VII. 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

55. *Puccinia pimpinellae* Mart.—Тетеревникова-Бабаян (1952) 94, Ульянищев (1962), т. III, часть 2, 33.

На листьях *Pimpinella* sp., II, окр. Мегри 16. V. 1962 г.; на *Albovia tripartita* (Kolenicz) B. Schischk., II, единично III.

окр. с. Личк пос. Джиндара, северо-восточный склон, 20. VII. 1963 г.

На *Albovia* в Армянской ССР гриб отмечен впервые.

56. *Puccinia Schneideri* Schg.—Ульянищев (1962), т., III, часть 2, 79.

На *Thymus Kotschianus* Boiss. et Hoh. II, окр. с. Личк, пос. Джиндара, северо-восточный склон, 20. VII. 1963 г.

В Армянской ССР отмечается впервые. По Ульянищеву (1962) в СССР гриб был собран в Азерб. ССР, в Нагорно-Карабахской области, 13. VI. 1937 г.

57. *Puccinia vincae* (D. C.)—Ульянищев (1962), т. III, часть 2, 58.

На *Vinca herbacea* W. et K., II, восточнее ущелья р. Спетри, арчевое редколесье к северо-востоку от пос. Анкаван, юго-зап. склон, 1300—1500 м н. у. м., 25. IV. 1958 г.; дорога Варданадзор—Личк, юго-западный склон, 24. IV. 1958 г.; с. Шванидзор, ущелье Герун-дара, сев.-зап. склон, 1000—1300 м н. у. м., 23. IV. 1958 г.; дорога Личк—Айгедзор, ущельице по левому берегу р. Мегри, 21. VII. 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

58. *Phragmidium potentillae* (Pers.) Karst.—Тетеревникова-Бабаян (1952). 133.

На *Potenstilla recta* L., II и III, окр. с. Личк., левый берег р. Мегри, юго-зап. склон, 19. VII. 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

59. *Phragmidium rubi* Pers.—Тетеревникова-Бабаян (1952) 132.

На *Rubus armeniacus* Socke II, окр. с. Личк, у родника, 19. VII. 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

60. *Phragmidium sanguisorbae* (D. C.) Schr.—Тетеревникова-Бабаян (1952) 135.

На *Poterium polygamum* Walldst. et Kit., II и III, окр. с. Личк, пос. Джиндара, левый бер. р. Мегри, юго-западный склон, 19. VII. 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

61. *Gymnosporangium clavariaeformae* (Jacq.) Rees—Тетеревникова-Бабаян (1952) 138.

На *Cotoneaster integerrima* Med., I, дорога Личк—Айгедзор, ущелье по левому берегу р. Мегри, 21. VII. 1963.

62. *Gymnosporangium confusum* Plowr.—Тетеревникова-Бабаян (1952) 142.

На листьях *Mespilus germanica* L., I, окр. с. Легваз, восточный склон, 17. V. 1962 г.; на листьях *Cydonia vulgaris* L., I, Мегри, приусадебные участки, 17. X. 1962 г.; на *Crataegus Mejeri* Poj., I, окр. с. Личк, пос. Джиндара, сев-вост. склон, 20. VII. 1963 г.; пос. Джиндара, левый берег р. Мегри, юго-западный склон 19. VII. 1963 г.

63. *Gymnosporangium Juniperinum* (L) Mart.—Тетеревникова-Бабаян (1952) 140.

На *Malus* sp., I, окр. с. Легваз, 17. V. 1962 г. пос. Джиндара, левый берег р. Мегри, юго-западный склон, 19. VII. 1963 г.

64. *Gymnosporangium sabinae* Wint.—Тетеревникова-Бабаян (1952) 141.

На *Pirus salicifolia* Pall., I, третий отрог Мегринского хребта восточнее с Ньюади, 18. VII. 1963 г.

65. *Aecidium euphorbiae* Gmel.—Тетеревникова-Бабаян (1952), 144.

На *Euphorbia marschalliana* C. A. M. дорога Шванидзор—Ньюади, фриганоидный склон, 17. VII. 1963 г.

В Мегринском районе встречается впервые.

## Fungi imperfecti

### Hyphales

66. *Ovularia Schroeteri* (Kuhn) Sacc. Васильевский, Каракулин (1937), 38.

На *Alchimilla tredecimloba* Bus. окр. Личк, пос. Джиндара, северо-восточный склон, у родника, 20. VII. 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

67. *Ramularia acquivoca* (Ces.) Sacc.—Васильевский, Каракулин (1937), 136.

На *Ranunculus* sp. окр. пос. Джиндара, в русле р. Мегри, левый берег, 19. VII. 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

68. *Ramularia arvensis* Sacc.—Васильевский, Каракулин (1937). 140.  
На *Potentilla recta* L. окр. пос. Джиндара, левый берег р. Мегри, юго-западный склон, 19. VII. 1963 г.
69. *Ramularia decipiens* Ell et Ev.—Васильевский, Каракулин (1937), 125.  
На *Rumex* sp. окр. с. Ньюади, берег речки, совместно с *Uromyces rumicis* (Schum.) Wint. II (III) 18. VII. 1963 г.
70. *Ramularia deusta* (Fuck.)—Васильевский, Каракулин (1937), 116.  
На *Lathyrus miniatus* M. B. окр. пос. Джиндара, левый берег р. Мегри, юго-западный склон 19. VII. 1963 г.  
В Мегринском районе отмечается впервые.
71. *Ramularia farinosa* (Bon.) Sacc.—Васильевский, Каракулин (1937), 57.  
На *Symphytum asperum* Lер. окр. пос. Джиндара, левый берег р. Мегри, в русле реки, 19. VII. 1963 г.  
В Мегринском районе отмечается впервые.
72. *Ramularia heraclei* (Oud) Sacc.—Васильевский, Каракулин (1937), 159.  
На *Heracleum trachyloma* F. et M. окр. пос. Джиндара, в русле р. Мегри, левый берег, 19. VII. 1963 г. На отмирающих листьях обнаружено большое количество склероциев.  
В Мегринском районе отмечается впервые.
73. *Ramularia macrospora* Fres.—Васильевский, Каракулин (1937) 62.  
На *Samolus garunculoides* L. окр. пос. Джиндара, левый берег р. Мегри, юго-западный склон, 19. VII. 1963 г.  
В Мегринском районе отмечается впервые.
74. *Ramularia melampyrina* Massal.—Васильевский, Каракулин (1937), 151.  
На *Melampyrum* sp. окр. пос. Джиндара, левый берег р. Мегри, юго-западный склон. 19. VII. 1963 г.  
В Мегринском районе отмечается впервые.
75. *Ramularia phlomidis* Bond. et Leb.—Васильевский, Каракулин (1937), 107.  
На листьях *Phlomis orientalis* Mill. дорога Мегри-Легваз, западный сухой скалистый склон, 17. V. 1962 г.
76. *Ramularia plantaginis* Ell. et Mart.—Васильевский, Каракулин (1937) 124.  
На *Plantago* sp. восточнее ущелья р. Спетри, арчевое редколесье к северо-востоку от пос. Анкаван, юго-западный склон, 1300—1500 м н. у. м., 25. IV. 1958 г.
77. *Ramularia pratensis* Sacc.—Васильевский, Каракулин (1937), 126.  
На листьях *Rumex* sp. окр. с. Личк, пос. Джиндара, 2000—2200 м н. у. м. 26. IV. 1958 г., 20. VII. 1963 г.
78. *Ramularia primulae* Thum.—Васильевский, Каракулин (1937) 130.

На *Primula macrocalyx* Vge. окр. с. Личк, пос. Джиндара, 20. VII. 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

79. *Ramularia rufo-maculans* Peck.—Васильевский, Каракулин (1937), 127.

На *Polygonum alpinum* All. окр. с. Личк, пос. Джиндара, 20. VII. 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

80. *Ramularia silvestris* Sacc.—Васильевский, Каракулин (1937), 38.

На *Cephalaria gigantea* (Led.) E. Vogt. окр. пос. Джиндара, левый берег р. Мегри, юго-западный склон 19. VII. 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

81. *Ramularia stachydis* (Pass.) C. Massal.—Васильевский, Каракулин (1937), 110.

На *Ramularia* sp. окр. пос. Джиндара, в русле р. Мегри, левый берег, 19 VII. 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

82. *Clasterosporium carpophilum* Aderh. Опр. низш. раст. (1956), 327.

На *Prunus divaricata* Led. с. Шванидзор, ущелье Герундара, северо-западный склон, 1000—1300 м н. у. м., 28. IV. 1958 г. на *Segetus avium* (L.) Moench.; пос. Джиндара, левый берег р. Мегри, юго-западный склон, 19. VII. 1963 г.; на *Persica vulgaris* L. совместно с *Sphaerotheca pannosa* Lev. var. *persicae* Woron. Мегри, сады, 17. X. 1962 г.

### Melanconiales

83. *Marssonina juglandis* (Lib.) P. Magn.—Васильевский, Каракулин (1950), 389.

На *Juglans regia* L. окр. пос. Джиндара, левый берег р. Мегри, юго-западный склон, 19. VII. 1963 г.; Мегри, сады, 17. X. 1962 г.

84. *Marssonina neilliae* (Harkn.) P. Magn.—Васильевский, Каракулин (1950), 397.

На *Spiraea hypericifolia* L. дорога к с. Личк у родника, 19. III. 1963 г.; дорога к с. Личк-Айгедзор, ущелье по левому берегу г. Мегри, 21. VII. 1963 г.;

В Мегринском районе отмечается впервые.

85. *Marssonina Staritzii* (Bres.) P. Magn.—Васильевский, Каракулин (1950), 381.

На *Lonicera iberica* M. B. окр. с. Личк, пос. Джиндара, северо-восточный склон, 20. VII. 1963 г.; дорога Личк—Айгедзор, ущелье по левому берегу р. Мегри, 21 VII. 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

86. *Cylindrosporium maculans* (Bereng) Jacz.—Васильевский, Каракулин (1950) 542.

На *Morus alba* Z, третий отрог Мегринского хребта восточнее с. Ньюади. 18. VII. 1963 г.

### Pyrenidiales

87. *Phoma oleraceae* Sacc. Grove (1935), 1, 63.

На перезимовавших стеблях *Helianthus* sp. северный склон ущелья р. Айри-Гет у пос. Джиндара, 2000—2200 м н. у. м., 26. IV. 1958 г.

88. *Septoria berberidis* Niessl.—Тетеревникова-Бабаян (1962), 38.

На *Berberis vulgaris* L. третий отрог Мегринского хребта восточнее с. Ньюади. 18. VII. 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

89. *Septoria digitalis* Pass.—Тетеревникова-Бабаян (1962) 88.

На *Digitalis nervosum* St. a. Hans., окр. с. Личк, пос. Джиндара, северо-восточный склон, 20. VII 1963 г.; на *Digitalis* sp. там же, 26. IV. 1958 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

90. *Septoria graminum* Desm.—Тетеревникова-Бабаян (1962) 118.

На *Bromus scorpius* L. окр. пос. Джиндара, левый берег р. Мегри, 19. VII. 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

91. *Septoria origanicola* All.—Тетеревникова-Бабаян (1962) 91.

На *Origanum vulgare* L. окр. с. Личк, пос. Джиндара, северо-восточный склон, 20. VII. 1963 г.

В Мегринском районе отмечается впервые.

92. *Septoria ornithogali* Pass.—Марланд (1948). 103.

На листьях *Ornithogalum* sp. восточнее ущелья р. Спетри, арчевое редколесье к северо-востоку от пос. Анкаван, юго-западный склон, 1300—1500 м н. у. м. 25. IV. 1958 г.

93. *Samarasporium acerina* Sacc. Grove (1937) II, 99.

На сухих веточках *Morus alba* L. окр. с. Легваз, вдоль дороги, 25. IV. 1958 г.

94. *Melasmia acerina* Lev. Опр. низш. раст. (1956) 401.

На *Acer ibericum* M. B., дорога Личк—Айгедзор, ущелье по левому берегу р. Мегри. 21. VII. 1963 г.

95. *Cytospora atra* Sacc. (1935), 270.

На сухих ветках *Morus alba* L. окр. с. Легваз, вдоль дороги, 25. IV. 1958 г.

96. *Cytospora rosarum* Grev. Grove (1935) 1, 280.

На шипах *Rosa* sp. совместно с *Sphaerotheca pannosa* v. *rosae* и *Phoma* sp.—ущелье р. Айригет у пос. Джиндара, 26. IV. 1958 г.

Ս. Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌԻ ՄԵՂՐՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՄԻԿՈՑԻՈՐԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Ներկա հաղորդմանը հիմք են հանդիսանում Հայկական ՍՍՌ Մեղրու շրջանում 1958 թ. գարնանը, 1962—1963 թթ. գարնանն ու աշնանը, ինչպես նաև 1963 թ. ամռանը էքսպեդիցիոն հետազոտությունների ժամանակ հավաքված նյութերը:

Հետազոտություններն ընդգրկել են շրջանի ցածրադիր (Մեղրի, Նյուփադի, Ա.գարակ), նախալեռնային (Շվանիձոր, Վարդանաձոր, Հանքավան) և լեռնալին (Լիճք, Ջինդարա) գոտիները:

Մշակված նյութը բաղկացած է սնկերի 96 տեսակից և 28 ձևից, որոնք դասերի միջև բաշխվում են հետևյալ ձևով. Phycomycetes—4 տեսակ, Ascomycetes—22 տեսակ և 28 ձև, Basidiomycetes—39 տեսակ, Fungi imperfecti—31 տեսակ: Պայուսակավոր սնկերի մեջ ամենից շատ ներկայացված են սլրացողալիները, բադիդիալների մեջ՝ ժանգալիները, իսկ անկատար սնկերի մեծ մասը պատկանում են հիֆոմիցետներին:

Հավաքված սնկերից 5 տեսակ ու 4 ձև Հայկական ՍՍՌ-ում նշվում են առաջին անգամ, իսկ 35 տեսակ ու 6 ձև առաջին անգամ նշվում են Մեղրու շրջանի համար:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Васильевский Н. И., Каракулин Б. П. Определитель несовершенных грибов, т. I. Гифомицеты, Изд. АН СССР, М.—Л., 1937.
2. Васильевский Н. И., Каракулин Б. П. Определитель несовершенных грибов, т. II. Меланкониальные, Изд. АН СССР, М.—Л., 1950.
3. Определитель низших растений. Изд. Советская наука. Москва, т. III, IV, 1954—1956.
4. Марланд А. Г. Критический обзор грибов рода *Septoria* Эстонской ССР. Изд. Тартусск. Гос. ун-та, Тарту, 1948.
5. Симонян С. А. Мучнисто-росяные грибы (Erysiphaceae) Армянской ССР, ч. I. Тр. БИН АН АрмССР, т. XII и ч. II, там же, т. XIII, 1959—1962.
6. Тетеревникова-Бабаян Д. Н. Ржавчинные паразиты культурных и дикорастущих растений Армянской ССР. Изд. Ерев. Гос. универс. Ереван, 1952.
7. Тетеревникова-Бабаян Д. Н. Обзор грибов рода *Septoria* в Армянской ССР. Изд. Ерев. Гос. унив., Ереван, 1962.
8. Ульянищев В. И. Микофлора Азербайджана, т. I. Головневые грибы. Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1952.
9. Ульянищев В. И. Микофлора Азербайджана, т. III, часть 2. Ржавчинные грибы. Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1962.
10. Ячевский А. А. Карманный определитель грибов, т. I. Голосумчатые, т. II. Мучнисто-росяные грибы. Ленинград, 1926, 1927.
11. Grove W. B. 1935—1937 1, 11. British stem-and leaf-fungi. Cambridge University press, 1935—1937.