

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. М. БАРСЕГЯН

НОВАЯ ДЛЯ ФЛОРЫ КАВКАЗА СОЛЯНКА
SALSOLA COLINA PALL.

Проводившееся автором за последние годы геоботаническое изучение солянковых и солончаковых пустынь Армении дало возможность обнаружить много новых и редких растений. Часть этих материалов уже опубликована*. В данной заметке приводится еще одно новое для флоры Кавказа полупустынное растение — солянка холмовая (*Salsola colina* Pall.) Нахождение солянки в Армении имеет большое ботанико-географическое значение.

Salsola collina Pall. принадлежит к числу аборигенных растений Европейской части СССР [1, 2, 3, 4]. Его специфические биологические особенности — нетребовательность к условиям произрастания и обильная семенная продукция позволили за последние столетия широко распространиться в степных и лесостепных районах Союза (за исключением Кавказа и Крыма), а именно в западной и восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней Азии. Он весьма характерный для более северных областей СССР, однако мы собрали вблизи Ереванского ботанического сада АН АрмССР, на правом берегу реки Гедар, в зоне полупустыни. В указанном местообитании солянка холмовая произрастает совместно с *Artemisia fragrans* Willd., *Noaea minuta* Bolss. et Bal., *N. mucronata* (Forsk.) Asch., *Ziziphora tenuior* L., *Kochia prostrata* (L.) Schrad., *Ceratocephalus arenarius* L., *Salsola pestifer* A. Nels. и др.

Незначительность распространения в обширной полупустынной зоне, при большой потенциальной способности растений к расселению, дает основание предположить, что оно занесено в Армению недавно и делает первые шаги к завоеванию новых территорий в южном Закавказье.

Ботанический институт
АН АрмССР

Поступило 14 V 1966 г.

* А. М. Барсегян, Материалы к солянковой и солончаковой флоре Армении. «Биол. журнал Армении», т. XIX, № 8, 1966.

Ա Մ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

ՆՈՐ ՕՇԱՆ (SALSOLA COLLINA PALL.) ԱՆԳՐԿՈՎԿԱՍԻ ՖԼՈՐԱՅԻ ՀԱՄԱՐ

Ա Վ Ր Ո Վ Ո Ւ Մ

Հողվածում բերված են տվյալներ Անգրկովկասի ֆլորայի համար միանգամայն նոր մի բույսի՝ օշանի (*Salsola Collina* Pall.) հայտնաբերման և աշխարհագրական տարածման մասին: Բլրակային օշանը (*S. Collina* Pall.) հայտնաբերվել է Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի բուսաբանական այգու մոտակայքում գտնվող Գետառ գետի աջ ափի օշինդրային կիսաանապատներից: Ենթադրվում է, որ միության հյուսիսային շրջաններին բնորոշ այս տեսակը Անգրկովկաս է թափանցել վերջին երկու-երեք տարիների ընթացքում: Այդ մասին է վկայում վերջինիս արագ սերմակալելու և տարածվելու պոտենցիալ մեծ հնարավորությունը և օշինդրային կիսաանապատում նրա ոչ մեծ արեալի առկայությունը:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Маевский П. Ф. Флора средней полосы Европейской части СССР, 7-ое изд., 1940.
2. Талкин В. И. Определитель высших растений Европейской части СССР, 1940.
3. Флора СССР, т. VI, М.—Л., 1936.
4. Ledebour E. Flora rossica. Stuttgartae, vol. III, 1846.