

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Э. Ц. ГАБРИЭЛЯН

НОВЫЕ ДЛЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И АРМЕНИИ
ВИДЫ РОДА *ALCEA* L.

В процессе работы над семейством *Malvaceae* для «Флоры Армении» были обнаружены некоторые интересные флористические находки—две из них приводятся ниже.

Alcea karsiana (Bordz.) Litv. Новый для Армении и Советского Союза вид. Обитает в горностепной зоне среди скал в среднем горном поясе. Собран в Армении в Гукасянском районе, в окрестностях с. Азизбеков, 8.VIII 1954 г. Ig. Я. И. Мулкиджанян, det. Э. Ц. Габриэлян.

A. karsiana была описана Е. И. Бордзиловским как подвид *A. ficiifolia* Cav. (= *A. rugosa* Alef.) по сборам Татьяны Рооп из Турецкой Армении. [1]. Позднее, Д. И. Литвинов [4] этот подвид возводит в ранг вида, снабдив его подробным латинским диагнозом. В примечании автор указывает, что несмотря на большую близость с *A. rugosa*, описываемый вид легко отличается от предыдущего по форме листьев и бледно-желтой окраске цветов (при сушке бледнеющих, а не зеленеющих, как у *A. rugosa*). И, действительно, у *A. karsiana* цветы кремово-белые, после сушки беловатые. Этот вид кроме окраски венчика хорошо отличается от *A. rugosa* также формой и опушением листа, почти отсутствием цветоножек, листочками подчашия, формой и расположением нектарников и другими признаками. По целому ряду признаков (окраска венчика, форма листьев, нектарники и др.) обнаружено ближайшее родство между *A. karsiana* и *A. sophiae* Hjin. Кстати, последний вид был известен только из двух местонахождений, и, как выяснилось из новейших сборов, *A. sophiae* довольно широко распространена в западной части Армянской ССР. Эти виды довольно четко различаются опушением (у *A. sophiae* волоски звездчатые, а у *A. karsiana*—простые, двуконечные и звездчатые), размерами подчашия и формой его листочков.

Было известно всего лишь три местонахождения *A. karsiana*: Armenia turcica, prov. Kars, prope urb. Ardagan, 15.VIII 1908. Ig. Tatiana Roop., fl. et fr. submat., LE; prope Karaughan, 9.VI 1910. Ig. Roop., fl., LE; prope Karakurt, 13.VII 1914. Ig. D. Litvinov, fl. LE. Как видно из вышеизложенного, все ранее известные местонахождения этого редкого вида были из Турецкой Армении, четвертое же—из Советской Армении.

A. sosnovskyi Hjin. Новый для Армении вид, близкородственный *A. flavovirens*, однако четко отличающийся от него опушением. Этот вид

науке известен по единственному неполному экземпляру с незрелыми схизокарпиями из Кахетии (Чалаубани) и считался эндемом Грузии. Мною собран большой материал по *A. sosnovskyi* из нескольких пунктов Армении. Из-за отсутствия нижней части растения в оригинальном описании этого вида [2] и в описании во Флоре СССР [3] имеются некоторые неточности: многолетность указывается со знаком вопроса. На самом деле, *A. sosnovskyi*, действительно, довольно высокий многолетник со стеблями в нижней части голыми или очень редко звездчато опушенными, а в верхней густо опушенными. Плодики (зрелые), вопреки описанию, крылатые и с боков густо волосистые. Листья и все остальные признаки полностью соответствуют оригинальному описанию.

Привожу армянские местонахождения *A. sosnovskyi*: Северная Армения, Ноемберянский район, с. Кохб, на скалах, 21.VII 1960, lg. et det. Э. Ц. Габриэлян ERE; LE; там же, окр. с. Калача, травянистые полянки в шибляке, 21.VII 1960, она же ERE; там же, между сс. Кохб и В. Кerpилу, на скалах, 21.VII 1960, она же ERE; Даралагез, Егегнадзорский район, окр. с. Арени, ущелье Мец-Дзор, 3.VII 1963, lg. et det. Э. Ц. Габриэлян ERE; там же, окр. с. Гюлистан, юго-западный склон, 1600 м н. ур. м. 10.VIII 1963, lg. A. Погосян, det. Э. Габриэлян, ERE.

Ботанический институт
АН АрмССР

Поступило 4.V 1967 г.

Է. Ց. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

ALCEA L. ՅԵՂԻ ԵՈՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Հայաստանի ֆլորայի ուսումնասիրության ընթացքում հավաքված հերթարհումի մշակման հետևանքով հայտնաբերվել են մի շարք նոր և հազվագյուտ բույսեր, որոնցից երկուսը բերվում են աշխատանքում:

Alcea karsiana (Bordz.) Litw.—Հայաստանի և Սովետական Միության համար նոր տեսակ, բնակվում է լեռնա-տափաստանային գոտում, ժայռերի մեջ: Հավաքված է Ղուկասյանի շրջանում Ազիզբեկով գյուղի շրջակայքում: Այս տեսակը մինչ այժմ հայտնի էր միայն Թուրքիայից:

A. sosnovskyi Iljin—Հայաստանի համար նոր տեսակ, գիտությանը հայտնի էր միայն մեկ, այն էլ ոչ լրիվ, նմուշ հավաքված Վրաստանից և համարվում էր վերջինիս էնդեմը:

Այժմ այս տեսակը հավաքված է Հայաստանի մի շարք վայրերից: Նոր նյութի հիման վրա լրացված է այս տեսակի առաջնային նկարագրությունը:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Бордзиловский Е. И. Тр. Юрьев. Бот. сада, XIII, 1912.
2. Ильин М. М. Зам. по сист. и геогр. раст. вып. 15, 1949.
3. Ильин М. М. Флора СССР, т. XV, 1949.
4. Литвинов Д. И. Журн. Русск. бот. общ., т. VII (1922) 1924.