

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

С. А. ВАРДИҚЯՆ

НОВЫЕ ВИДЫ ПЯДЕНИЦ ДЛЯ ФАУНЫ АРМЯНСКОЙ ССР
(Lepidoptera, Geometridae)

В результате обработки материала Института защиты растений, собранного на светоловушки, и коллекционного материала Зоологического института Академии наук Армянской ССР, для фауны Армении обнаружено 12 новых видов пядениц.

В настоящее время в фауне Армянской ССР насчитывается около 320 видов пядениц, из них 45 видов, как новые для фауны Армении, были опубликованы ранее [1, 2].

Ниже приводятся вновь обнаруженные виды.

1. *Thalera fimbrialis* Sc. Окр. Еревана (зоопарк), 18.VI.54; Алавердский район, окр. г. Алаверди, 7.VII.52; Горисский район, с. Караундж, 13.VII.62, г. Горис, 11.VII.53; Иджеванский район, с. Ачаджур, 7.VI.62; Степанаванский район, г. Степанаван, 15.VII.52; Кафанский район, с. Вачаган, 16.VII.53. Кормовые растения—тысячелистник (*Achillea*), тимьян (*Thymus serpyllum* L.), различные травянистые растения.

Общий ареал: европейская часть СССР, Туркмения, Сибирь. Малая Азия, Корея.

2. *Rhodostrophia badiaria* Fr. Окр. Еревана (зоопарк), 18.V.61; Разданский район, с. Алапарс, 30.V.63. Кормовые растения не известны.

Общий ареал: юг европейской части СССР. Малая Азия, Иран.

3. *Rhodostrophia vibicaria* Cl. Кироваканский район, лес над с. Гамзачиман, 12.VII.51; Разданский район, с. Цахкадзор, 15.VII.55; Басаргечарский район, с. Бабаджан, 9.VII.55; Алавердский район, окр. г. Алаверди, 7.VII.52; Горисский район, окр. с. Караундж, 13.VII.53; Кафанский район, с. Вачаган, 16.VII.53. Кормовые растения—дереза (*Sarothamnus scoparius*), пижма (*Tanacetum vulgare* L.), терновник (*Prunus spinosa* L.).

Общий ареал: европейская часть СССР, Кавказ, Туркмения, Сибирь.

4. *Rhodostrophia sacraria* L. Окр. Еревана (зоопарк), 19.VIII.61; Арташатский район, с. Цахкашен, 24.VIII. 55. Гусеница живет на птичьей гречихе (*Polygonum aviculare* L.).

Общий ареал: юг европейской части СССР, Туркмения. Северная Африка, Малая Азия, Индия.

5. *Anaitis mundulata* Gn. Окр. Еревана (зоопарк), 24.V.54; Арташатский район, с. Цахкашен, 4.V.61; Азизбековский район, с. Гергер, 22.V.53. Кормовые растения не известны.

Общий ареал: Сирия, Ирак. Является новостью и для фауны СССР.

6. *Opogona autumnata* Bkh. Вединский район, окр. с. Веди, 23.X.55. Кормовые растения—ива (*Salix* L.).

Общий ареал: северные и средние районы европейской части СССР. Европа. Встречается редко.

7. *Lygris populata* L. Степанаванский район, с. Куртан, 18.VII.52, с. Вардаблур, 18.VII.52. Кормовые растения—черника (*Vaccinium* L.), ива (*Salix* L.).

Общий ареал: северные и средние районы европейской части СССР, Сибирь до Камчатки. Европа.

8. *Chloroclystis chloreata* Mabille. Окр. Еревана (зоопарк), 19.VIII.52. Гусеницы весной живут в сплетенных паутиной цветках терновника (*Prunus spinosa* L.).

Общий ареал: северные и центральные районы европейской части СССР, Саяны, Забайкалье. Средняя Европа, Япония.

9. *Egannia ankeraria* Stgr. Мегринский район, с. Мегри, 3.XI.62. Кормовые растения не известны. Известен только из Венгрии.

10. *Egannia leucophaearia* Schiff. Мегринский район, с. Мегри, 16.I.62, 22.I.63. Гусеницы объедают листья осины и дуба.

Общий ареал: Молдавия, центр и юг европейской части СССР, на север до Москвы, Кирова, Казани, Приморский край. Средняя и частично южная Европа, Сирия, Япония.

11. *Aprochemia hispidaria* Schiff. Мегринский район, с. Мегри 19.III.63. Гусеницы поедают листья дуба, вяза, березы, боярышника. Совместно с другими видами пядениц-шелкопрядов сильно вредили древесным насаждениям в районе Саратова.

Общий ареал: юг и юго-восток европейской части СССР, Сибирь. Локально в средней Европе, Италии и на Балканах.

12. *Boarmia bistortata* Göze. Иджеванский район, окр. с. Иджеван 8.V.54; Кафанский район, Мтнадзорское ущелье, 3.VII.60. Гусеницы поедают листья березы, ивы, терновника (*Prunus spinosa*) и лиственницы (*Larix decidua* Mill.). Особенно нападают на угнетенные деревья. В году дает две генерации.

Общий ареал: европейская часть СССР, Кавказ, Урал, Саяны, Приморский край. Почти вся западная Европа.

Ս. Ս. ՎԱՐԴԻԿՅԱՆ

ԵՐԿՐԱԶԱՓ ԹԻԹԵՌՆԵՐԻ ՆՈՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՖԱՈՒՆԱՅԻ ՀԱՄԱՐ (LEPIDOPTERA, GEOMETRIDAE)

Ա մ փ ո փ ու մ

Հայկական ՍՍՀ բույսերի պաշտպանության ինստիտուտի՝ լուսաթակարդներով հավաքված նյութերի և Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի կենդանաբանական ինստիտուտի հավաքածուների մշակման արդյունքը հանդիսացավ Հայաստանի երկրաչափ թիթեռների ֆաունայի համար 12 նոր տեսակների հայտնաբերումը:

Ներկայումս Հայկական ՍՍՀ-ում հայտնի են մոտ 320 տեսակ երկրաչափ թիթեռներ, որոնցից 45 տեսակներ տարբեր հոգվածներում նշված են որպես նոր տեսակներ Հայաստանի ֆաունայի համար: Ներկա աշխատության մեջ լրացուցիչ կերպով բերվում են ևս 12 տեսակ երկրաչափ թիթեռներ, որոնք հանրապետության ֆաունայի համար նշվում են առաջին անգամ:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Вардилян С. А. Зоологический сборник, выпуск IX, 5—20, 1956.
2. Вардилян С. А. Известия АН АрмССР (биол. науки), XVII, 1, 91—93, 1964.