Г. С. АРЕВШАТЯН

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОСТИ РТА ЖИВОТНЫХ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ДИАБЕТЕ

Поражение бета-клеток островкового аппарата поджелудочной железы с последующим развитием картины сахарного диабета наступает после введения аллоксана (уретан мезоксалево́й кислоты). Это явление обнаружено в 1943 г. (Данн с сопр.).

Такой диабет можно вызвать почти у всех видов экспериментальных животных, и в этом одно из его преимуществ перед другими экспериментальными моделями диабета.

При экспериментальном аллоксановом диабете сохраняется внешняя секреция поджелудочной железы и нормальная продукция других ее активных факторов, в частности липокаина.

Животные с аллоксановым диабетом долгое время могут жить без инсулина. В зависимости от дозы вводимого аллоксана и реактивности животного можно получить разную степень поражения бета-клеток и разную степень гипофункции островкового аппарата, тогда как после депонкратизации мы имеем полное отсутствие функции этого аппарата. Таким образом, аллоксановый диабет, как экспериментальная модель, ближе стоит к клиническому диабету.

Задачей настоящей работы являлось выявление изменения полости рта у животных с аллоксановым диабетом.

Исследования проведены на 30 кроликах, из них 5 служили контролем. Для опытов использовались здоровые животные обоего пола, одной породы, одного возраста и веса—от 2,7 до 3,4 кг. Все кролики находились на одинаковом рационе питания—овес, сено, овощи. Перед опытом животных взвешивали и определяли количество сахара в крови по Хагедорну—Иенсену.

Диабет вызывали внутривенным введением 5% свежеприготовленного раствора аллоксана из расчета 150 мг на 1 кг веса. После введения аллоксана у животных через 3 дня, а затем каждые 7 дней определяли содержание сахара в крови. К опытам приступали, когда уровень сахара в крови достигал 300 мг% и более, приобретая относительно стабильный характер.

Исследования проводили натощак, кровь для исследования в количестве 0,1 мл брали из краевой вены уха кролика.

На протяжении 5,5 мес. было проведено 6 серий опытов, на 30 кроликах, из которых 25 опытных и 5 контрольных.

Вес животных с аллоксановым диабетом в первые 20 суток опыта

Таблица 1

Динамика содержания сахара в крови (в мг %) у кроликов после введения аллоксана

№ живот- ного	кг вес	Доза аллок- сана в мг % на кг веса	Исходный сахар	Д н и н а б л ю д е н и я																				Содержание сахара в крови к мо- менту забоя (156 день)			
				3	10	17	24	31	38	45	52	59	66	73	80	87	94	101	107	114	121	128	135		142	149	156
1	2,6	390	95	279	275	304	300	370	390	400	420	460	460	470	460	460	461	460	462	460	465	457	460	463	465	466	460
2	3,2	480	87	229	291	315	365	367	400	397	414	360	365	371	375	375	467	461	407	470	471	476	470	470	471	475	479
3	2,9	435	81	299	297	304	331	345	401	431	467	451	467	460	461	460	462	460	465	467	461	459	462	460	456	450	457
4	3,4	510	79	291	291	314	307	311	351	360	391	390	410	400	400	407	403	400	391	389	397	345	350	397	319	320	321
5	2,7	405	83	300	299	307	300	410	402	400	409	412	400	415	476	470	470	475	470	465	470	479	480	490	487	500	504

снижился на 10—11% от исходного, в то время как у контрольных увеличивался в среднем на 12%.

В первые дни опыта изменений в полости рта не обнаружено. В последующие дни, особенно в поздние сроки опыта, при зондировании отмечалась кровоточивость десен, отслаивание десен от шеек зубов, наличие неглубокого патологического кармана. Расшатывания зубов не отмечалось.

У контрольных и подопытных животных определяли степень атрофии альвеолярного отростка нижней челюсти. Степень атрофии особенно заметна в поздние сроки опыта. Такую атрофию при эксперименте на животных отмечают М. Г. Бугаева [1], Н. А. Жижина [2] и др. Результаты исследований были подвергнуты вариационной обработке по методу И. А. Ойвина [3].

Ввиду большого объема материала, приводим лишь один протокол опыта.

Опыт № 1. Под опытом находилось 5 кроликов весом 2,6—3,4 кг. Исходное содержание сахара в крови в среднем до введения аллоксана равнялось 87—95 мг% (табл. 1). Введение аллоксана производилось однократно в количестве 395—500 мг, исходя из общего веса кроликов. Опре-

Рис. 1. Снимок нижней челюсти. Отмечается неравномерная вертикальная ее атрофия в области боковых зубов.

деление сахара в крови проводилось в течение 3 суток и через каждые 7 дней после первоначального введения аллоксана. Следует отметить, что уровень сахара в крови на 7 день после введения аллоксана повышается в 3 и больше раза.

Как видно из таблицы, уровень сахара в крови на 152-й день составлял в среднем 450 мг%. Разница статистически достоверна ($t=2,1$, $P<0,05$).

Как уже отмечалось, в первые и последующие дни опыта со стороны слизистой оболочки полости рта и десен никаких изменений не обна-

ружено. Только в конце опыта, на 156 день, при осмотре полости рта у животных, мы находили в области пародонта наличие краевого гингивита: при прикосновении к воспаленной части десны появлялась незначительная кровоточивость. Подвижность зубов не отмечалась. У всех подопытных и контрольных животных произведены рентгенографические исследования зубов и челюстей до и после опыта. Как показали исследования, никаких изменений со стороны альвеолярного отростка не обнаружено, имеется незначительное расширение периодонтальной щели, горизонтальная и вертикальная атрофия межзубных перегородок. На мацерированной челюсти видна шероховатость в области боковых зубов. Вертикальная атрофия (рис. 1).

В ы в о д ы

1. Изменения десен у животных с сахарным диабетом носят постоянный характер, они проявляются в виде катабального гингивита. Однако подвижность зубов не отмечается.

2. У животных с аллоксановым диабетом возникает атрофия костной ткани альвеолярного отростка челюстей.

Степень атрофии находится в зависимости от тяжести диабета и его длительности.

Ереванский медицинский институт,
кафедра биохимии и кафедра стоматологии

Поступило 15.II 1968 г.

Հ. Ս. ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ

ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԵՆՏՐԱՆԻՆԵՐԻ ՄԱՏ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՇԱՔԱՐԱՆՏԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

Ա մ փ ո փ ու լ մ

Փորձնական շաքարախտի դեպքում կենդանիների մոտ նկատվում են կլինիկական ախտախի երևույթներ, որոնք իրենց ընթացքով նմանվում են բնական շաքարախտին:

Մենք ուսումնասիրել ենք 30 ճագար, որոնցից 5-ը որպես ստուգիչ են հանդիսացել: Փորձը սկսելուց առաջ բոլոր ճագարները կշռվել են, շաքարի տոկոսն արյան մեջ ստուգվել է խազերդորն-Իենսենի մեթոդով: Շաքարախտ առաջացրել ենք ալոքսանի 5% թարմ պատրաստված լուծույթով, որը ներարկվել է ներերակային, միանվազ 150 մլ/կգ կենդանի քաշին:

Դիտումներից պարզվել է, որ շաքարի տոկոսի բարձրացումը արյան մեջ նկատվել է ալոքսանի ներարկումից հետո 2—3-րդ օրը, հաջորդ ստուգումները կատարվել են 7 օրը մեկ:

Ելնելով մեր տվյալներից, կարելի է անել հետևյալ եզրակացությունները. 1. Շաքարախտ հիվանդության ժամանակ, առանձնապես նրա ծանր ընթացքի դեպքում լնդերում նկատվում են փոփոխություններ, որոնք արտահայտվում են նրանց աչտուցով և արյունահոսությամբ: 2. Փոփոխություն է նկատվում նաև ծնոտի ոսկրային հյուսվածքի կողմից, որը բնորոշվում է ավելորար ելուստի ետաձմամբ:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Бугаева М. Г. Научн. конф. по проблеме физиолог. и патолог. пищеварения. 1961.
2. Жижина Н. А. Стоматология, 2, 1966.
3. Ойвин И. А. Патологическая физиология и экспериментальная терапия. Медгиз, 1960.