

С. А. СИМОНЯН

МАТЕРИАЛЫ К МИКОФЛОРЕ МЕГРИНСКОГО РАЙОНА АРМЯНСКОЙ ССР. III*.

В настоящее сообщение вошел 41 вид грибов, относящихся к различным систематическим группам (исключая несовершенные), собранных в Мегринском районе во время экспедиций в 1958, 1962 и 1963 гг. Все приводимые виды отмечаются впервые в Мегринском районе, 18 из них являются новыми для микофлоры Армении.

Класс *Oomycetes*

Сем. *Peronosporaceae*

1. *Peronospora chenopodii* Schlecht. [7], стр. 171—на *Chenopodium album* L., Мегри, повсеместно, 17.V.1962 г.
2. *Albugo tragopogi* (Pers.) Schr. [7], стр. 83—на *Compositae* sp. между сс. Личк и Айгедзор, ущелье по левому берегу р. Мегри, 21.VIII.1963 г.

Класс *Ascomycetes*

Сем. *Dermataceae*

3. *Fabraea fragariae* Kleb. [2], стр. 400—на *Fragaria vesca* L., между сс. Личк и Айгедзор, ущелье по левому берегу р. Мегри, 21.VII.1963 г. Гриб образует только стромы. В Армении отмечается впервые.
4. *Karschia nigerrima* Sacc. [9], стр. 347—на высохших ветвях *Quercus macranthera* F. et M. совместно с *Niptera phaea* Rehm, южные отроги Зангезурского хребта, сев. склон, ущелье реки Айри-гет у Джиндаринской ГРП, 2000—2200 м над ур. м., 26.IV.1958 г. В Армении отмечается впервые.
5. *Niptera phaea* Rehm [9], стр. 560—на высохших ветвях *Quercus macranthera* F. et M. совместно с *Karschia nigerrima* Sacc., южные отроги Зангезурского хребта, северный склон, ущелье реки Айри-гет у Джиндаринской ГРП, 2000—2200 м над ур. м., 26.IV.1958 г.; на стеб-

* Сообщение I—Изв. АН АрмССР (биол. н.), т. XVIII, 1, 1965; сообщение II—Биол. журн. Армении, т. XXII, 2, 1969.

лях *Ephedra procera* F. et M., склоны гор у с. Ньюади, 500—800 м над ур. м., 27.IV.1958 г. В Армении отмечается впервые.

6. *Patinella punctiformis* Rehm [9], стр. 311—на валежнике совместно с *Leciographa parasemoides* Rehm, с. Шванидзор, ущелье Гёрун-дара, северо-западный склон, 1000—1300 м над ур. м., 28.IV.1958 г. В Армении отмечается впервые.

Сем. *Polystigmataceae*

7. *Phyllachora morthieri* Fuck. [11], стр. 902—на листьях *Malabaila dasyantha* (C. Koch.) A. Grossh., окр. Мегри, скалистые склоны, 16.V.1962 г. Вызывает сплошное поражение. В Армении отмечается впервые.

8. *Phyllachora stellariae* Fuck. [2], стр. 328—на перезимовавших стеблях *Dianthus* sp. совместно с *Uromyces caryophyllinus* Wint., *Laestadia caryophylla* (Cooke et Harkn.) Berl. et Vogl., с. Шванидзор, ущелье Гёрун-дара, северо-западный склон, 1000—1300 м над ур. м., 28.IV.1958 г. В Армении отмечается впервые.

9. *Phyllachora trifolii* Pers. [11], стр. 902—на *Trifolium* sp., окр. с. Личк, между Джиндара и Арпалых, северо-восточный склон, 20.VII.1963.

Сем. *Diatrypaceae*

10. *Diatrypella sordida* Pers. [11], стр. 830—на валежнике, с. Шванидзор, ущелье Гёрун-дара, северо-западный склон, 1000—1300 м над ур. м., 28.IV.1958 г. В Армении отмечается впервые.

Сем. *Xylariaceae*

22. *Rosellinia pulveraceae* Ehrh. [11], стр. 228—на валежнике совместно с *Chorostate transversalis* Karst., южные отроги Зангезурского хребта, северный склон, ущелье реки Айри-гет у Джиндаринской ГРП, 2000—2200 м над ур. м., 26.IV.1958 г. В Армении отмечается впервые.

Сем. *Valsaceae*

12. *Chorostate transversalis* Karst. [2], стр. 291—на валежнике совместно с *Rosellinia pulveraceae* Ehrh., южные отроги Зангезурского хребта, северный склон, ущелье реки Айри-гет у Джиндаринской ГРП, 2000—2200 м над ур. м., 26.IV.1958 г. В Армении отмечается впервые.

13. *Diaporthe inaequalis* Currey [11], стр. 645—на сухих веточках *Rhamnus palassii* F. et M., с. Шванидзор, ущелье Гёрун-дара, северо-западный склон, 1000—1300 м над ур. м., 28.IV.1958 г. В Армении отмечается впервые.

Сем. *Clavicipitaceae*

14. *Claviceps purpurea* Tul. [11], стр. 146—на *Dactylis glomerata* L. совместно с *Amastigosporium graminicolum* V. Bond., окр. с. Личк, между Джиндара и Арпалых, 20.VII.1963 г.

Сем. *Pseudosphaeriaceae*

15. *Didymosphaeria winteri* Niessl. [11], стр. 417—на перезимовавших стеблях *Hypericum* sp. совместно с *Coniothecium conglutinatum* Cda., южные отроги Зангезурского хребта, ущелье реки Айри-гет у Джиндаринской ГРП, 2000—2200 м над ур. м., 26.IV.1958 г. В Армении отмечается впервые.

16. *Leptosphaeria artemisiae* Fuck. [11], стр. 476—на перезимовавших стеблях *Artemisia* sp. совместно с *Cladosporium fuscum* Link., восточнее ущелья р. Спетри, арчевое редколесье к северо-востоку от пос. Анкаван, юго-западный склон, 1300—1500 м над ур. м., 25.IV.1958 г.

17. *Leptosphaeria umbrosa* Niessl. [11], стр. 470—на усыхающих веточках *Spiraea hypericifolia* L. совместно с *Coniothyrium fuckelii* Sacc., *Phoma spiraeina* Pass., *Coniothyrium epidermidis* Cda., дорога Мегри-Личк, выше с. Варданадзор, юго-западный от дороги склон, 1300 м над ур. м., 24.IV.1958 г. В Армении отмечается впервые.

18. *Ophiobolus accuminatus* (Sowerby) Winter [11], стр. 527—на перезимовавших стеблях *Echinops* sp. совместно с *Leptothyrium vulgare* (Fr.) Sacc. и *Torula expansa* Pers., южные отроги Зангезурского хребта, северный склон, ущелье реки Айри-гет у Джиндаринской ГРП, 2000—2200 м над ур. м., 26.IV.1958 г. В Армении отмечается впервые.

19. *Pleospora ephedrae* Fabre [11], стр. 349—на отмерших ветвях *Ephedra procera* F. et M., окр. Мегри, скалистые склоны, 16.V.1962 г. В Армении отмечается впервые.

20. *Pleospora orbicularis* Auersw. [1], стр. 508—на веточках *Berberis* sp., дорога Мегри-Личк, выше с. Варданадзор, юго-западный склон, 1350 м над ур. м., 24.IV.1958 г.

Сем. *Mycosphaerellaceae*

21. *Mycosphaerella aceris* Woronich. [2], стр. 256—на перезимовавших листьях *Acer* sp. совместно с *Rhytisma acerinum* Fr., *Gloeosporium campestre* Pass., *Cladosporium epiphyllum* Pers., с. Шванидзор, ущелье Гёрун-дара, северо-западный склон, 1000—1300 м над ур. м., 28.IV.1958 г. В Армении отмечается впервые.

Сем. *Venturiaceae*

22. *Venturia rumicis* (Desm.) Winter [11], стр. 435—на листьях *Rumex alpinus* L., левый берег р. Мегри, с. Личк, летняя кочевка, верхняя опушка леса, 1700—2200 м над ур. м., 14.VII.1958 г.

Класс *Basidiomycetes*Сем. *Coleosporiaceae*

23. *Coleosporium campanulae* (Pers.) Lev. [8], стр. 115 — в уредостадии на листьях *Michauxia laevigata* Vent., окр. станции Мегри, 17.VII.1963 г.; на *Campanula* sp. — с. Гудемнис, северо-восточный склон, дубово-кленовый лес, 1600—2000 м над ур. м., 11.VII.1958 г.

Сем. *Melampsoraceae*

24. *Melampsora alii-salicis-albae* Kleb. [8], стр. 159 — в телейтостадии на листьях *Salix* sp. совместно с *Ramularia rosea* (Fuck.) Sacc. и *Septogloeum salicinum* (Peck.) Sacc., окр. Джиндара, левый берег р. Мегри, 19.VII.1963 г.

Сем. *Pucciniaceae*

25. *Uromyces anthyllidis* (Grev.) Schroet. [4], стр. 344 — в уредостадии на *Anthyllis boissieri* Sag., левый берег р. Мегри, с. Личк, летняя кочевка, верхняя опушка леса, 1700—2200 м над ур. м., 14.VII.1958 г.

26. *Uromyces caryophyllinus* Wint. [3], стр. 46 — в телейтостадии на перезимовавших стеблях *Dianthus* sp. совместно с *Laestadia caryophyllea* (Cooke et Hark.) Berl. et Vogl. и *Phyllachora stellaria* Fuck., с. Шванидзор, ущелье Гёрун-дара, северо-западный склон, 1000—1300 м над ур. м., 28.IV.1958 г.

27. *Uromyces onobrychidis* Lev. [3], стр. 56 — в уредостадии на листьях *Onobrychis transcaucasica* A. Grossh., окр. Джиндара, левый берег р. Мегри, юго-западный склон, 19.VII.1963 г.

28. *Uromyces punctatus* Schroet. [4], стр. 350 — в уредо- и телейтостадиях на *Astragalus* sp., третий отрог Мегринского хребта, восточнее с. Ньюади, 18.VII.1963 г.

29. *Uromyces salsolae* Reichart [4], стр. 303 — на перезимовавших и молодых стеблях *Noaea mucronata* (Forsk.) Asch. Schweinf., подножье гор у Агарака, 23.IV.1958 г.

30. *Puccinia carduorum* Jacky [3], стр. 113 — в телейтостадии на *Carduus* sp., окр. с. Легваз, 17.V.1962.

31. *Puccinia cichorii* Bell. [3], стр. 122 — в уредо- и телейтостадиях на *Cichorium intybus* L., склоны гор между сс. Карчеван и Курис, ближе к с. Курис, северо-западный склон, 1200—1600 м над ур. м., 7.VII.1958 г., в уредостадии, Курис-Вагравар, сухой каменистый юго-восточный склон, 1200—1400 м над ур. м., 8.VII.1958 г.

32. *Puccinia dactylidina* Bub. [5], стр. 94 — в уредостадии на *Dactylis glomerata* L., окр. с. Личк, между Джиндара и Арпалых, северо-восточный склон, 20.VII.1963 г.

33. *Puccinia fragosoi* Bubak [5], стр. 89—в телеитостадии на *Koeleria* sp., между сс. Шванидзор и Ньюади, фриганоидный склон, 17.VII.1963 г. В Армении отмечается впервые.

34. *Puccinia iridis* (D. C.) Wallr. [3], стр. 85—в уредостадии на *Iris sulfurae* C. Koch. совместно с *Heterosporium gracile* Sacc., окр. с. Личк, между Джиндара и Арпалых, северо-восточный склон, 20.VII.1963 г.

35. *Puccinia nigrescens* Kirch. [3], стр. 101—в уредо- и телеитостадиях на *Salvia verticillata* L. совместно с *Septoria salviae* Pass., окр. Джиндара, левый берег р. Мегри, юго-западный склон, 19.VII.1963 г.

36. *Puccinia onopordi* Sydov [6], стр. 156—в телеитостадии на *Onopordon* sp., третий отрог Мегринского хребта, восточнее с. Ньюади, 18.VIII.1963 г.

37. *Puccinia phragmitis* (Schum.) Körn. [1], стр. 284—в эцидиальной стадии на *Rumex* sp., окр. с. Легваз, у ручья, 17.V.1962 г.

38. *Puccinia polygoni-alpini* Cruchet et Mayor [5], стр. 211—в телеитостадии на *Polygonum alpinum* All., окр. с. Личк, [между сс. Джиндара и Арпалых, 20.VII.1963 г.; между сс. Калер и Байбугах, горная степь, южный склон, 2000—2400 м над ур. м., 13.VII.1958 г. В Армении отмечается впервые.

39. *Puccinia taraxaci* (Rebent.) Plowr. [3], стр. 126—на *Taraxacum* sp. восточнее ущелья р. Спетри, арчевое редколесье северо-восточнее пос. Анкаван, юго-западный склон, 1300—1500 м над ур. м., 25.IV.1958 г.

40. *Puccinia triseti* Eriks. [5], стр. 64—в телеитостадии на *Trisetum sibiricum* Rupr., окр. с. Личк, у родника, 19.VII.1963 г.

41. *Puccinia violae* (Schum.) D. C. [3], стр. 92—в уредо- и телеитостадиях на *Viola* sp., склоны гор между сс. Карчеван и Курис. ближе к с. Курис, северный склон, 1200—1600 м над ур. м., 7.VII.1958 г.

Институт ботаники
АН АрмССР

Поступило 2.IV 1968 г.

Ս. Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ՄԵՂՐՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՍՆԿԱՅԻՆ ՖԼՈՐԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ. III

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Մեղրու շրջանում 1958, 1962 և 1963 թթ. գիտարշավների ժամանակ հայտարբերվել են տարբեր սիստեմատիկական խմբերի պատկանող սնկերի 41 տեսակներ, որոնք մինչև այդ հայտնաբերված չեն եղել վերոհիշյալ շրջանում: Նրանցից 18-ը նոր են Հայաստանի ֆլորայի համար:

ЛИТЕРАТУРА

1. Неводовский Г. С. Ржавчинные грибы. (Флора споровых растений Казахстана, т. I). Алма-Ата, 1956.
2. Определитель низших растений, т. 3. Изд. Советская Наука, М., 1954.
3. Тетеревникова-Бабаян Д. Н. Ржавчинные паразиты культурных и дикорастущих растений Армянской ССР. Изд. ЕГУ, 1952.
4. Ульянищев В. И. Микофлора Азербайджана, т. II, Изд. АН Азерб.ССР, 1959.
5. Ульянищев В. И. Микофлора Азербайджана, т. III, ч. I. Изд. АН Азерб.ССР, 1960.
6. Ульянищев В. И. Микофлора Азербайджана, т. III, ч. II. Изд. АН Азерб.ССР, 1962.
7. Ульянищев В. И. Микофлора Азербайджана, т. IV. Изд. АН Азерб.ССР, 1967.
8. Gäumann E. Die Rostpilze Mitteleuropas. Bern, 1959.
9. Rehm H. Ascomyceten: Hysteriaceen und Discomyceten in L. Rabenhorst's Kryptogamen Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. I Band. Pilze. III Abteilung, Leipzig, 1896.
10. Wehmeyer L. E. A world monograph of the genus *Pleospora* and its segregates. Univ. of Michigan Press. 1961.
11. Winter G. Ascomyceten: Gymnoascen und Pyrenomyceten in L. Rabenhorst's Kryptogamen Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. II Abteilung, Leipzig, 1887.