

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 576.895.7

А. Е. ТЕРТЕРЯН

CHRYSOPS BUXTONI AUST, НОВЫЙ ВИД СЛЕПНЯ
(DIPTERA, TABANIDAE) ДЛЯ ФАУНЫ СССР
ИЗ АРМЯНСКОЙ ССР

На южных отрогах горы Арагац в окрестности села Агарак (Аштаракский район) была поймана на воле во время акта кровососания самка слепня—*Chrysops buxtoni* Aust., который оказался новым видом для СССР. Этот слепень распространен в Ираке и в районе Мертвого моря.

Ниже приводится полное описание самки; самец в наших сборах отсутствует, краткое описание его характерных признаков и рисунок брюшка даются по Леклеру [2] (из Остина [1]).

Самка (рис. 1). Лицо, лоб и щеки светло-желтоватые, матовые, опушение из светло-желтоватых волосков. Темя в области глазков черное, слегка блестящее. Лобная мозоль черная, более или менее поперечно вытянутая, боковые ее края не достигают глаз. Лицевые мозоли продольно вытянутые, черные, блестящие; от каждой мозоли к верхнему краю наличника отходит по узкой хитинизированной полоске, которая соединяется с наличниковой мозолью. Последняя едва подмечается в густом серо-желтом налете. Щечные мозоли широкие, темно-коричневые. Усики черные, длинные; 1-й членик желтоватый более половины своей длины. Конечный членик щупалец темно-коричневый, в основании коричневый. Грудь черная, в густом сероватом налете. Спинка с тремя широкими полосками: из них две боковые не доходят до щитка, а срединная в налете, расплывчатая, почти доходит до щитка. Волоски груди белесоватые. Щиток черный, слабо блестящий. Крылья: вершинное пятно отсутствует, перевязь широкая, достигает почти заднего края крыла, заметно просветлена в участке 4—5 заднекрайних и вершины анальной ячейки. Внешний край перевязи располагается более или менее на уровне слияния жилок R_1 с С и наружного вершинного угла 4-й заднекрайней ячейки; дискоидальная ячейка темная. Ноги: передние и задние бедра черные, средние темно-коричневые; передние голени почти наполовину затемнены, вершина средних и задних голеней желто-коричневая. Лапки черные, только основания 1-го членика средних и задних лапок желто-коричневые. Брюшко: 1-й и 2-й тергиты желтые. 1-й тергит с крупным поперечным черным пятном, занимающим переднюю половину тергита; задний и заднебоковые края пятна выемчатые. 2-й тергит посередине с черным пятном в виде перевернутой буквы V, концы которого не до-

стигают заднего края тергита, а по бокам по одной косо расположенной коричневой полоске, соединенной перемычкой с концами срединного V-образного пятна. 2-й тергит по заднему краю с широкой серовато-желтой каемкой; 3-й и последующие грязно-желтоватые с узкой светловатой каемкой по заднему краю. На 3-м и 4-м тергитах по перед-




Рис. 1. *Chrysops buxtoni* Aust. 1—6—части тела у самки (1—лоб, 2—лицо, 3—усик, 4—щупальце, 5—крыло, 6—верх брюшка); 7—верх брюшка самца.

нему краю имеется с каждой стороны по черной поперечной полоске расширенной в треугольнички; внутренние по размеру больше наружных. 5-й тергит по переднему краю несет с каждой стороны по одному маленькому треугольничку. 1-й и 2-й стерниты желтые, в сероватом налете, по заднему краю с узкой желтоватой каемкой, последующие стерниты коричневые. 2-й стернит посередине с округлым черным пятном. Длина тела 8,5 мм.

Самец. (рис. 1). Рисунок крыла почти как у самки. Брюшко: преимущественно желтоватое. 1-й тергит с крупным черным поперечным пятном. 2—4-ые тергиты с одним более или менее округлым черным пятном посередине каждого тергита.

Հ. Ե. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ

ՔՐՈՌՈՒԿԻ ՆՈՐ ՏԵՍԱԿ՝ CHRYSOPS BUXTONI AUST. (DIPTERA,
TABANIDAE) ՍՍՀՄ-Ի ՖԱՌՒՆԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ-ԻՑ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Արագածի հարավային ստորոտում, Ագարակ գյուղի շրջակայքում (Աշտարակի շրջան) եղան վրա արյուն ծծելու ակտի ժամանակ բռնվել է քոռուկի՝ *Chrysops buxtoni* Aust. էգը, որը ՍՍՀՄ-ի համար նոր տեսակ է համարվում։ Այդ քոռուկը տարածված է Իրաքում և Մեռյալ ծովի շրջանում։ Հոգվածում բերվում է էգի լրիվ նկարագրությունը։

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Austen E. Bull. ent. Res., 13, 1922.
2. Leclercq M. Mémoires de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique deuxième série, Fasc. 63, 1960.