

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В. Е. АВETИСЯН

МАТЕРИАЛЫ К ФЛОРЕ АРМЕНИИ

(Сем. Polemoniaceae)

Семейство Polemoniaceae на Кавказе, в частности в Армении, представлено одним видом рода *Polemonium*.

Таксономическая трактовка кавказской синюхи претерпевала изменения в сторону укрупнения или дробления вида в зависимости от ботанического мировоззрения авторов. В 1926 г. Н. Буш [2] на основании более крупного венчика и слегка более широких крыльев семян выделил кавказские синюхи из *P. coeruleum* L. в самостоятельный вид *P. saucasicum*. В дальнейшем такой подход стал традицией для всех отечественных систематиков и флористов [1, 3—8]. Однако предшественники Буша кавказские растения в различных внутривидовых рангах относили к *P. coeruleum* L. Этот вид, широко распространенный в арктической и умеренной зонах обоих полушарий, чрезвычайно полиморфен. Считавшийся сборным многими авторами, он не раз распадался на серии узколокальных видов. Такой точки зрения придерживаются Васильев [3, 4], Клоков [8], Толмачев [9] и др. Однако весьма красноречив тот факт, что монографы рода Бранд [10] и Девидсон [11] понимают *P. coeruleum* L. в широком смысле, признавая лишь внутривидовые категории. Действительно, на протяжении огромного ареала (как в широтном, так и в меридиональном направлениях) встречаются различные экологические расы, которые плавно связаны друг с другом переходными формами (различия между ними, в основном, габитуальные или же зависят от степени опушенности различных органов). Поэтому трактовка Бранда и Девидсона представляется более естественной. Согласно Девидсону, *P. coeruleum* в Евразии имеет два подвида: ssp. *vulgare* (Ledeb.) Brand и ssp. *villosum* (Rud.) Brand. Первый из них, как типичный, по современным правилам международной ботанической номенклатуры, должен быть переименован в *P. coeruleum* L. ssp. *coeruleum*. *P. saucasicum* N. Busch совершенно очевидно входит в состав этого подвида. Встречаясь на высокогорных лугах, среди скал или на открытых местах, и у верхней опушки леса в горах Кавказа, Средней Азии, Алтая и Джунгарии, бушевый вид в ранге вариации является наиболее южной расой *P. coeruleum* ssp. *coeruleum*. Таким образом, в нашей флоре род *Polemonium* представлен *P. coeruleum* L. ssp.

coeruleum v. caucasicum (N. Busch) Avet., stat. nov., basionimum P. caucasicum N. Busch) 1926 Тр. Бот. Муз. 187 (=P. coeruleum L. ssp. vulgare (Ledeb. Brand, p.p; P. coeruleum L. α. vulgare Ledeb., p.p.).

Ботанический институт
АН АрмССР

Поступило 22.XII 1967 г.

Վ. Ե. ԱՎԵՏԻՅԱՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԼՈՐԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(Polemoniaceae ընտանիքը)

Ա մ փ ո փ ո մ

Հոգվածում վերլուծվում է Polemonium caucasicum N. Busch տեսակի տարածման արժեքը, որի հիման վրա այն ընդունվում է որպես P. coeruleum տեսակի սյւատեսակ — P. coeruleum L. ssp. coeruleum v. caucasicum (N. Busch) Avet.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Айдарова Р. А. Род Polemonium во Флоре Киргизии, X, 1962.
2. Буш Н. А. Тр. Бот. Муз., XIX, 1926.
3. Васильев В. Н. Бот. мат. Гербария БИН АН СССР, XV, 1953.
4. Васильев В. Н. Род Polemonium во Флоре СССР, XIX, 1953.
5. Гроссгейм А. А. Определитель флоры Кавказа, 1959.
6. Гроссгейм А. А. Флора Кавказа, 3, 1932.
7. Гроссгейм А. А. Флора Кавказа, 7, 1967.
8. Клоков М. В. Бот. Мат. Герб. БИН АН СССР, 17, 1955.
9. Толмачев А. И. Бот. Мат. Гербария. Гл. Бот. Сада РСФСР, 4, 6, 1923.
10. Brand A. in Engler, Pflanzenreich, IV, h. 27, 1907.
11. Davidson J. F. Univ. Calif. Publ. Botany, 23, 5, 1950.