

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 581.9

Я. И. МУЛКИДАЖНЯН

НОВЫЕ И КРИТИЧЕСКИЕ ВИДЫ ФЛОРЫ АРМЕНИИ

По мере изучения растительных богатств республики выявляются новые и редкие для флоры Армянской ССР растения и разрешаются вопросы номенклатурного порядка.

В статье приводятся данные о 7 видах растений, произрастающих в Армянской ССР.

1. *Lagonichium farctum* (Banks et Sol.) Bobr. [1], мимозка. Новое семейство, род и вид флоры Армении. Собрал VI.1966 г. и определил Я. И. Мулкиджанян. Растение произрастает вдоль железнодорожного полотна, на засоленной, песчаной почве, между ст. Шванидзор и Ньюади, в Мегринском районе. Это же растение собиралось нами ранее в окрестностях станции Минджеван Азербайджанской ССР в 1953 г. Невысокий, до 1 м, полукустарник, с растопыренными беловатыми ветвями, покрытыми многочисленными тонкими коническими колючками. Листья дважды перистые, маленькие, с линейно-продолговатыми листочками. Бобы короткие, двучленные, мясистые, съедобные.

На Кавказе, по А. А. Гроссгейму [2], распространен на Восточном Кавказе, в Восточном Закавказье (Карабах), Шекинском нагорье, на Апшероне и в Талыше. Географический тип Восточно-Средиземноморско-Ирано-Туранский.

2. *Zelkova carpinifolia* (Pall.) Dipp. — дзельква. Редкий вид флоры Армянской ССР. Приводился Тамамшян [6] для Шурнухи. Позднейшими коллекторами сборы не были подтверждены. Вновь собран 15.VII.1965 г. Я. И. Мулкиджаняном в Кафанском районе, в окрестностях с. Уджанис. Дзельква более обильно представлена в Гадрутском районе (урочище Шахназари дзор) Нагорно-Карабахской автономной области, где ей сопутствуют древостой из *Platanus orientalis* L. [4].

3. *Platanus orientalis* L., платан восточный. — Редкий вид флоры Армении. Во время экспедиционных поездок последних лет выявлен еще один новый пункт произрастания платана по ущелью р. Уджанис, в направлении границы Азерб. ССР, где отмечено несколько десятков деревьев платана со стволами толщиной до 60—80 см и более.

Новейшие данные приводит Сафаров [5], отмечая произрастание платана и в долине р. Химбугов-чай, между южным склоном Главного Кавказского хребта и Шекинским нагорьем с юга, что лишний раз подтверждает сведения, приводимые Тумаджановым [8] о его произрастании.

нии здесь (несколько западнее). Восстановление же Сафаровым [5] *Platanus digitifolia* Palib. и отнесение к этому виду произрастающего в Закавказье *P. orientalis* не убедительно. Как глубина лопастей листа, так и размеры соплодий, даже на протяжении Кавказского ареала платана, весьма сильно варьируют.

4. *Rugus fedorovii* Kuthat.—Новый вид флоры Армянской ССР. Собрал и определил Я. И. Мулкиджанян. Как и в области классического местопроизрастания, в Центральном Закавказье [3] растет среди ксерофильных редколесий и кустарниковых зарослей. У нас выявлен в ряде пунктов: Даралагяз, окрестности с. Кавушук, 28.8.68 г.; на склонах Варденисского хребта, близ развалин с. Варданес, 29.8.68 г.; на Макбутдагском хребте, у с. Гелайсор, 12.7.68 г. Вид весьма близок к *P. oxurghion* Wogonow, как это отмечает и крупнейший знаток рода *Rugus* Федоров [9]. От *P. oxurghion* он отличается лишь цельнокрайними (без зубцов) листьями. Наблюдая значительное варьирование, как в характере зубчатости, размерах и форме листьев, так и в опушении, возможно, правильное было бы считать *P. fedorovii* разновидностью *P. oxurghion*, ареалы которых в пределах Армянской ССР, к тому же, полностью совпадают.

5. *Licium barbagum* L.—Новинка для Армянской ССР. Был собран Я. И. Мулкиджаняном 28 июня 1962 г. в северной Армении (Ноемберянский район, окр. с. Кохп) и Я. И. Мулкиджаняном, А. А. Григоряном 25 октября 1968 года в южной части центральной Армении (близ с. Мгуб, на откосе шоссе, у «Чайки»). Образует значительную куртину. Отмечается обильный самосев. Возможно, что ранее, лет 10 назад, он здесь был высажен, но акклиматизировался и в настоящее время стал сильно распространяться.

6. *Zyzyphus jujuba* Mill.—Также новинка для центральной части Армянской ССР. Ранее здесь был известен только в культуре [7]. Собирали на Урцском хребте, в двух пунктах: в окрестностях развалин с. Асни, на южном шлейфе хребта, и на восточном склоне хребта между Араздаем и с. Кярки. В обоих пунктах образует массовый самосев и корневые отпрыски; цветет, плодоносит. Поселяется в небольших оврагах, на мощной делювиальной почве. Значительные заросли его отмечаются в нижней части ущелья Джанам-дере, восточнее Араздаяна, на границе с. Нахичеванской АССР.

7. *Halantium laterifolium* C. Koch.—соляноцветник редколистный.—Является небольшим однолетним растением. Обильно встречается на третиных красных глинах и на гаммаде Армянской ССР, где образует сплошной желтовато-зеленоватый ковер: Описан Карлом Кохом, из долины р. Аракс [12].

Последующими авторами и издательствами видовое название неоднократно искажалось. Так, у Е. Boissier [11] это растение приводится как *H. garifolium*, а еще позже во «Флоре СССР» [15] уже цитируется, как *H. gariflorum*. Проверка и восстановление приоритетного названия произведены по предложению А. Л. Тахтаджяна.

Յա. Ի. ՄՈՒԼՔԻՋԱՆՅԱՆ

ՆՈՐ ԵՎ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԼՈՐԱՅԻՑ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Հոդվածում բերվում են տվյալներ *Lagonichum farctum* մասին, որը ՀՍՍՀ-ի համար ներկայացնում է նոր ընտանիք (Mimosaceae), ցեղ և տեսակ: Նոր քննադատական տվյալներ են բերվում *Lycium ruthenicum*, *Zelkova carpinifolia*, *Platanus orientalis* տեսակների մասին: Պարզված և վերականգնված է *Halanthium rariflorum*-ի առաջնային, հեղինակային անվանումը — *Halanthium laterifolium* C. Koch.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Бобров Е. Г. Род мимозка, во Флоре СССР, 11: 14, 1945.
2. Гроссгейм А. А. Определитель растений Кавказа. Изд. Сов. Наука, М., 1949.
3. Кутателадзе Ш. И. Зам. по систематике и географии растений Инст. бот. АН ГрузССР.
4. Мулкиджанян Я. И. Биологический журнал Армении, 18: 10, 1965.
5. Сафаров И. С. Ботанический журн. СССР, 51, 6: 877, 1966.
6. Тамамшян С. Г. Закавказ. Краев. сборник, ССР. А. Естествознание, 1, 1930г.
7. Тахтаджян А. Л. и Федоров Ан. А. Флора Еревана: 241, 1945.
8. Тумаджанов И. И. Тр. БИН АзФАН, СССР, 4, 1938.
9. Федоров Ан. А. Деревья и кустарники СССР, 3, 1954.
10. Флора СССР. 6: 343, 1936.
11. Boissier E. Flora Orientalis, 4:982, 1875.
12. Koch C. Linnaea, 17:314, 1843.