

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 581.9

Э. Ц. ГАБРИЭЛЯН

ОБ ИНТЕРЕСНОЙ НАХОДКЕ *ERIOLOBUS TRILOBATUS*
В ТУРЦИИ

В материалах рябин, присланных мне Г. Пешменом в 1967 г. на определение из Измирского университета (Турция, Измир-Борнова), под эпитетом *Sorbus torminalis* оказалась чрезвычайно интересная находка — *Eriolobus trilobatus* (Poir.) M. Roem.

Это растение представляет собой декоративный кустарник или небольшое дерево до 6 м высоты, с красивыми лопастными листьями и щитковидными яблонеподобными соцветиями. Благодаря сходству листьев *E. trilobatus* с кленовыми эта находка была определена как *Sorbus torminalis*, у которого листва также кленовидная. *E. trilobatus* обычно произрастает на скалистых местах, в лесах, в среднем горном поясе, от 800 до 1500 м над ур. моря.

Этот своеобразный, очень редко встречающийся вид с дизъюнктивным ареалом, представляет собой одну из таксономических загадок семейства розоцветных. По своим морфологическим признакам *E. trilobatus*, будучи сильно обособленным от ближайших родов, в то же время очень схож с ними, благодаря чему этот вид до сих пор не имеет определенного родового статуса. Он включался в целый ряд различных родов, таких как *Crataegus* L., *Pyrus* L., *Sorbus* L., *Malus* Mill., и даже выделялся в отдельный род, *Eriolobus*, описанный М. Рёмером еще в 1847 г. В современных сводках большинство авторов склонны принимать этот таксон как монотипный род, *Eriolobus* M. Roem.

Будучи древним реликтовым видом, *E. trilobatus*, кроме таксономического, представляет также большой флористический интерес. Впервые собранный и описанный в начале XIX века, этот вид считался эндемом Ливана, пока позднее не был найден в Сирии, Турции и Палестине. Затем он был обнаружен на юге Балканского полуострова, близ границы с Турцией. Находка *E. trilobatus* из Турции известна по сборам Оше-Элуа (Aucher-Eloy, 1838) в окрестностях города Измира. Несмотря на повышенный интерес ботаников к замечательной флоре Анатолии, повторить этот более чем вековой давности измирский сбор Оше-Элуа никому не удалось. Исходя из этого, а также того, что в ареале *E. trilobatus* получается довольно большой разрыв (западная часть Анатолии и Ливан), эта находка стала вызывать сомнение среди ботаников. С этой

точки зрения новое местонахождение *E. trilobatus* в Турции — East Anatolia, Bursah, Hani-Edremit (Bahkesir), Pinus brutia forest № 886 10.V.1966 г., коллектор Hasan Reşmen — имеет большое значение. Сбор Пешмена окончательно подтверждает распространение рода *Eriolobus* и на территории Малой Азии.

Находка *E. trilobatus* представляет также значительный теоретический интерес. Она в какой-то степени восполняет разрыв в географическом распространении (юг Балкан и Палестина) и может оказать определенную помощь при флорогенетическом анализе и выявлении путей миграций отдельных видов и флор.

Институт ботаники
АН АрмССР

Поступило 9.I 1969 г.

Է. Յ. ԳԱՐԻԵԼՅԱՆ

ERIOLOBUS TRILOBATUS-ի ՀԵՏԱԲՐՔՐՈՎԱԿԱՆ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ ԹՈՒՐԻԱՅԻՑ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Sorbus ցեղի հերբարիումում, որը Իզմիրի համալսարանից ուղարկված էր ինձ՝ որոշման համար, հայտնաբերվեց *Eriolobus trilobatus* (Poir.) M. Roem. տեսակի նմուշ, հավաքված Թուրքիայից:

Այն հետաքրքրություն է ներկայացնում ոչ միայն կարգաբանական տեսակետից, որը դասել են *Crataegus* L., *Pyrus* L., *Sorbus* L., *Malus* Mill., *Eriolobus* M. Roem. ցեղերի մեջ, այլև ֆլորիստիկայի տեսակետից: Կեննյով հնազույն ռելիկտային տեսակ, *Er. trilobatus*-ը նախկինում համարվում էր միայն Լիբանանյան էնդեմ: Հետագայում այն հայտնաբերվեց նաև Սիրիայից ու Պաղեստինից, իսկ մոտ ժամանակներս՝ նաև Բալկանյան թերակղզու հարավում: Մեր հայտնաբերած նմուշի նոր աճման վայրը վերջնականապես հաստատում է այս տեսակի տարածումը նաև Փոքր Ասիայում: Այն ներկայացնում է նաև տեսական հետաքրքրություն, քանի որ լրացնում է աշխարհագրական տարածվածության ընդհանուր արեալը և կարող է օգտակար լինել ֆլորաների և առանձին տեսակների ծագման ու միգրացիաների ուղիների հայտնաբերման գործում: