

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК

Э. Ц. ГАБРИЭЛЯН, П. П. ГАМБАРЯН

НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ И РЕДКИЕ ВИДЫ ФЛОРЫ АРМЕНИИ

В заметке приводятся новые флористические находки, собранные во время экспедиций последних лет.

Malvalthaea transcaucasica (Sosn.) Iljin. Новый род и вид для Армении, впервые собран П. Гамбаряном и Э. Габриэлян на травянистых склонах в ущелье Герун-Дара в окрестностях с. Шванидзор Мегринского района, 3.V.1967 г. Второе местонахождение этого рода оказалось в Зангезуре, в Кафанском р-не, в окрестностях с. Цав. Собрано 7.VI.1967 г. Я. Мулкиджаняном и В. Манакяном. Ближайшие пункты, где встречается этот вид,—Карабах и Восточное Закавказье. *M. transcaucasica* общим обликом очень похожа на *Althaea hirsuta* L., и поэтому в гербариях часто встречаются ошибочные определения. Хорошим диагностическим признаком при определении этих видов является строение листочков подчашия. Гроссгейм [4] указывает, что у *M. transcaucasica* «венчик голубой», но на самом деле в живом состоянии венчик розовый и лишь в сушке слегка голубеет.

Arrhenatherum kotschyi Boiss. Новый вид для Армении. Этот своеобразный злак с клубневидно-утолщенными при основании стеблями на территории Советского Союза приводился только для Нахичевана по самой границе с Арменией (кочевье Дым-Оглы). В Армении он был найден Габриэлян в Вединском районе, в окрестностях Азизкенда, на щебнистых склонах, 27.V.1960 г.; в Арташатском р-не, по правому берегу р. Азат, по дороге из Гарни в Зовашен (Джанатлу), на щебнистых склонах, 9.V.1961 г.; на Урцском хребте, г. Кармир-Кар, на каменистых склонах, 9.VI.1963 г.

Cichorium glandulosum Boiss. et Hohen. Новый вид для Армении. Этот однолетний цикорий описан из Турецкой Армении и приводится для западной части бассейна р. Аракс. На территории республики найден Э. Габриэлян совместно с В. Аветисян и П. Гамбаряном в окрестностях Еревана близ с. Шорбулаг на третичных глинах, где произрастает совместно с дикой пшеницей, 30.V.1965 г.

Peltariopsis grossheimii N. Busch. Новый вид для Армении. Это весьма редкое растение было описано из Нахичеванской АССР, и ареал его ограничивался только этой республикой. Во «Флоре Армении» [11]

указывается на возможность нахождения этого вида в нашей республике. В мае 1967 г. *P. grossheimii* нами был обнаружен на отвесных скалах отрогов Зангезурского хребта в окр. пос. Агарак. Определила В. Аветисян.

***Medicago falcata* L.** Новый вид для Армении. В дикорастущем виде в Армении впервые обнаружен в окр. Артика в горной степи, 19.V.1962 г., М. Галстян и Т. Асланян. Определила Э. Габриэлян. Еще Гроссгейм [5] писал, что этот вид в Закавказье восточнее Сурамского хребта совершенно отсутствует, хотя в литературе довольно часто приводился. Эти указания были основаны на ошибочных определениях видов *M. polychroa* Grossh., *M. hemicycla* Grossh., *M. papillosa* Boiss.

В Северной Армении, в окр. Степанавана, (в Лорплемсовхозе) *M. falcata* изредка встречается только в культуре. Поэтому во «Флору Армении» [10] этот вид не был включен. Для Турецкой Армении он довольно обычен (материалы П. Дэвиса из гербария Эдинбургского ун-та, присланные на определение Э. Габриэлян). Поэтому кажется вполне естественным нахождение *M. falcata* в западных районах республики, т. е. на самой границе с Турцией.

***Gypsophilla virgata* Boiss.** Новый вид для Армении. Во «Флоре Армении» [8] указана возможность нахождения этого вида. Известен из западного Ирана и Нахичеванской АССР. Довольно обильно произрастает в Вединском р-не по окраинам песчаной пустыни окрестностей с. Горован, где и собран П. Гамбаряном, М. Галстян и Т. Асланян 23.VII.1967 г. Определен П. Гамбаряном.

***Centaurea arpensis* (Czer.) Czer.** Собран Э. Габриэлян в Вединском р-не, в окрестностях с. Азизкенд на щебнистых склонах по правому берегу р. Веди. Этот эндемичный вид был описан С. Черепановым из Даралагеза, с левого берега р. Арпа против устья р. Элегис.

***Centaurea acmophylla* Boiss.** Собран нами с южных макросклонов г. Арагац между Нор-Амбертом и Амбертом в июле 1968 г. Ближайшее местонахождение—Зангезурский хребет.

***Orthurus heterocarpus* (Boiss.) Juz.** Найден нами в Вединском р-не на Урцском хребте, г. Кармир-Кар, среди скал, 22.VI.1967 г.; в Хосровском заповеднике, Хосров, речка у пещеры с развалинами часовни, 1968 г.; Араилер, близ часовни Цахкеванк, 17.IX.69 г. *O. heterocarpus* является одним из редчайших видов Кавказа. Судя по отечественным флорам, в том числе и по «Флоре Армении» [9], на Кавказе до сих пор было известно единственное местонахождение этого вида, на г. Союх (Зангезурский хребет), на границе Армении и Нахичеванской АССР. В гербарии Ботанического института АН АрмССР имеется один экземпляр, собранный А. Тахтаджяном 23.VII.1950 в Даралагезе, к северу от с. Хачик, в ущелье левого притока р. Арпа. Наши находки значительно расширили ареал этого вида.

***Dianthus cyri* Fisch. et C. A. Mey.** Собрали П. Гамбарян, М. Галстян и Т. Асланян в Вединском р-не между селами Дашлу и Карабаглар 23.VII.1967 г. Гроссгейм [5] указывает нахождение этого вида

между Ереваном и Шорбулагом. Во «Флоре Армении» [8] приводится возможность нахождения его в республике. Ближайшее местонахождение—Нахичеван. АССР.

Gypsophila porrigens (L.) Fenzl. Второе местонахождение в Армении этой редчайшей гипсолюбки, известной на Кавказе только из Нахичеван. АССР; Абовянский р-н, с. Джрвеж, ущелье, август 1966, собрал и определил П. Гамбарян. Впервые для Армении привела Э. Габриэлян [1] из окрестностей Арташата.

Phalaris paradoxa L. Этот редчайший в Армении злак впервые был найден в 1931 г. С. Тамамшян совместно с В. Малеевым между Авдалляром (ныне Ацаван) и Шорбулагом, у дороги по краю заброшенного поля вместе с *Actinolema macrolema*. Вторично в том же пункте обнаружен нами в 1965 г. Третий экземпляр собран М. Галстян в окр. с. Аван (Ереван) на сухих каменистых склонах.

Adiantum capillus-veneris L. Вединский район, Хосровский заповедник, 25.VI.1962 г.; там же, в 1968 г. собрал и определил П. Гамбарян. Этот очень декоративный папоротник, встречающийся на травертинах у родников и водопадов, известен был в Армении из Джермука, между Мегри и Ордубадам и у Чортова Моста через р. Воротан ниже с. Татев.

Caropodium platycarpum (Boiss. et Hausskn.). Schischk. Абовянский р-н, по дороге Гохт—Алимардан—Елиджа выше Алимардана, 13.VIII.1950 г. Собрала А. А. Авакян. Ближайшее местонахождение этого редкого и интересного зонтичного в Даралагезе и Нахичевани. Находка значительно расширяет ареал этого вида и является новинкой для флоры Еревана.

Geum xintermedium Ehrh. Этот гибридный вид не указан во «Флоре Армении» [9]. Собран Э. Габриэлян, Н. Агаповой, П. Гамбаряном с северных склонов г. Арамазд со стороны с. Сваранц в ущелье Бзовчидара в приречных зарослях борщевика 2.VII.1967 г. В гербарии БИН АН АрмССР имеются следующие экземпляры этого вида, ошибочно определенные как *G. rivale*, *G. urbanum*: окр. Джелал-Оглы, лиственный лес, Гнилая балка, 30.5.1922, собрал А. Б. Шелковников, определил Б. Шишкин; Зангезур, между Карчеваном и Ваграваром, 30.V.1923, собрал и определил А. Гроссгейм; Нор-Баязет (Камо), к югу от Арчаоц, близ села Цамакаберд, собрали О. Зедельмейер и А. Шелковников, определил А. Гроссгейм; Кироваканский р-н, г. Маймех, 6.VI.1936. Собрал и определил Наринян; Мартунинский район, Яных, 11.VI.1939 г. Собрал и определил Наринян.

Saxifraga adscendens L. Новый вид для Армении. Зангезур, Баргушатский хр., северные отроги г. Арамазд, урочище Бзовчидара, на скалах, 2.VII.1967 г. собрали Э. Габриэлян, Н. Агапова, П. Гамбарян, определил Гамбарян. Найден так же П. Гамбаряном в Даралагезе, на северных отрогах г. Мурад-Тапа, выс. 3000 м., на скалах, 27.VII.1965 г. Ближайшее местонахождение этого вида находится в северной части Карабаха [10].

Orobanche gamosepala Reut. Северный отрог г. Арамазд, урочище Бзовчи-дара, травянистый склон, 2.VII.1967 г., Э. Габриэлян, Н. Агапова, П. Гамбарян. Эта красивая паразитическая растение с пурпурно-красными цветками паразитирует на видах рода *Geganium*. В республике была известна лишь только по сборам Шелковникова 1922 г. из Северной Армении (окр. Степанавана).

Woodsia alpina Gray. Баргушатский хр., северный отрог г. Арамазд, урочище Бзовчи-дара, на скалах, 2.VII.1967 г., Э. Габриэлян, Н. Агапова, П. Гамбарян. В отличие от первой находки этого нового для Армении рода [2] *W. alpina* на северных отрогах г. Арамазд встречается в необычайном изобилии.

Botrychium lunaria (L.) Swartz. Северные отроги г. Арамазд, на сильно задерненном лугу среди скал, 2.VII.1967 г., Э. Габриэлян, Н. Агапова, П. Гамбарян. Ранее этот редчайший в Армении папоротник соби-рался только на горах Хуступ и Капуджих А. Тахтаджяном и Э. Габриэлян с А. Еленевским.

Androsace albana Stev. Северные склоны г. Арамазд, 15.VII.1967 г., Э. Габриэлян, Н. Агапова, П. Гамбарян. В Армении известен был лишь с г. Арагац (Радде, 1875 г.) и из Кафанского р-на [7].

Институт ботаники
АН АрмССР

Поступило 8.II 1968 г.

Է. Յ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ, Պ. Պ. ՂԱՍՏՐՈՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԼՈՐԱՅԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՆՈՐ ԵՎ ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ ՏԵՍԱԿՆԵՐ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Հայաստանի ֆլորայի ուսումնասիրության ընթացքում հավաքված հերթա-րիումի մշակման հետևանքով հայտնաբերվել են մի շարք նոր և հազվագյուտ հանդիպող բույսեր՝ *Malvalthaea transcaucasica* (Sosn.) Iljin, (նոր ցեղ և տեսակ), *Arrenatherum kotschyi* Boiss., *Cichorium glandulosum* Boiss. et Hohen., *Peltariopsis grossheimii* N. Busch, *Gypsophila virgata* Boiss., *Medicago falcata* L., *Centaurea arpensis* (Czer.) Czer. և ուրիշ տեսակներ:

Աշխատության մեջ բերվում են նաև տվյալներ այդ ցեղերի ու տեսակների տարածման, սիստեմատիկայի և էկոլոգիայի մասին:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Габриэлян Э. Ц. Изв. АН АрмССР, биол. науки, 14, 6, 1961.
2. Габриэлян Э. Ц. и Еленевский А. Г. Изв. АН АрмССР, биол. науки, 14, 1, 1961.
3. Гроссгейм А. А. Зап. научн. прикл. отд. Тифл. Бот. Сада, вып. I, Тбилиси, 1919.
4. Гроссгейм А. А. Определитель растений Кавказа. 1949.
5. Гроссгейм А. А. Флора Кавказа, 3, 1945.
6. Гроссгейм А. А. Флора Кавказа, 4, 1950.
7. Еленевский А. Г. Флора Зангезура и некоторые вопросы истории флоры За-кавказья. Диссер. 1964.
8. Флора Армении, 2, 1956.
9. Флора Армении, 3, 1958.
10. Флора Армении, 4, 1962.
11. Флора Армении, 5, 1966.