

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 581.9

А. М. БАРСЕГЯН

МАТЕРИАЛЫ ПО ФЛОРЕ АРМЕНИИ

В процессе геоботанического исследования водно-болотной растительности Армении нами обнаружен ряд интересных в флористическом отношении видов [1—3]. Ниже приводятся еще три новых для флоры Армении растения, обнаружение которых представляет некоторый ботанико-географический интерес. Гербарные образцы этих видов растений хранятся в Институте ботаники АН Армянской ССР в Ереване.

1. *Lycopus exaltatus* L.

Произрастает: Туманянский район, с. Туманян, у прибрежных болот озера Цовер, высота 1500 м н. ур. моря, 30.IX.1969 г. За пределами Армении данное растение встречается, по Гроссгейму [4], в Предкавказье, западном и восточном Кавказе и зап. центральном Закавказье.

Фитоценологическая роль *L. exaltatus* довольно существенна: он образует как самостоятельные, так и смешанные группировки на сильно зарастающих частях озера.

2. *Juncus tenuis* Willd.

Произрастает: Калининский район, с. Кыз-Кала, на прибрежных заболоченных местах озера Жангот-лич (Ржавое озеро), на высоте 1400 м н. ур. моря, 26.VIII.1960 г.

J. tenuis является одним из редких ситников Кавказа. Гроссгейм [4] приводит его только для западных частей Кавказа и Закавказья. Новое местонахождение является самым южным в СССР. В фитоценологическом отношении найденный ситник никакой роли не играет и легко вытесняется другими многолетними корневищными гигрофитами. Этим и объясняется весьма ограниченный ареал его распространения.

3. *Linum gallicum* L.

Одно из редких для флоры СССР и Кавказа растений. По данным Юзепчука [5], единственными пунктами произрастания *L. gallicum* в СССР являлось восточное и западное Закавказье. Нами обнаружен новый наиболее южный пункт произрастания французского льна: Ара-ратский район, Араздаян, предгорья солянской полупустыни, 29.VII.1965 г., вторично — Ара-ратский район, урочище «Тту-джур», за-

соленные болота, в кочках *Juncus acutus* L., 30.VIII.1965 г., 850 м н. ур. моря.

Следует отметить, что Араздаянская равнина является одним из немногих уголков Кавказа, богатых дикорастущими льнами, — об этом свидетельствует также недавно обнаруженный нами [3] новый для флоры СССР лен (*Linum seljukorum* Davis).

Фитоценологическая роль *L. gallicum* незначительна. Он очень быстро проходит жизненный цикл развития. Уже в середине июня высыхает. Его нужно включить в экологическую группу эфемеров.

Институт ботаники
АН АрмССР

Поступило 22.I 1970 г.

Ա. Մ. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԼՈՐԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ու մ

Հայաստանի ճահճուտների բուսականությունն ուսումնասիրելու ընթացքում հեղինակը հավաքել է հանրապետության ֆլորայի համար միանգամայն նոր հետեյալ երեք տեսակները.

Ճահճակղինջ բարձրահասակ (*Lycopus exaltatus* L.); կնյուն նուրբ (*Juncus tenuis* Willd.), վուշ ֆրանսիական (*Lynum gallicum* L.).

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Барсегян А. М. Биол. журнал Армении, XIX, 8, 1966.
2. Барсегян А. М. Биол. журнал Армении, XIX, 12, 1966.
3. Барсегян А. М. Биол. журнал Армении, XXI, 7, 1968.
4. Гроссгейм А. А. Определитель растений Кавказа, М., 1949.
5. Юзепчук С. В. Семейство Linaceae во флоре СССР, XIV, 1949.
6. Davis P. H. Notes from the Royal Botanical Garden Edinburgh, XXII, 3, 1957.