

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 581.9

Т. Н. ПОПОВА

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ В АРМЕНИИ

Во время поездок по Армении в 1968 г. и при определении ранее собранных гербарных материалов Ботанического института АН АрмССР были сделаны интересные флористические находки. Сведения о некоторых из них приводим ниже.

Ophioglossum vulgatum L.— новый род и вид для флоры Армении, обнаружен нами в Апаранском флористическом районе [3] на территории Арзаканского лесничества, урочище Хандзукмат, на отрогах хребта Цахкуняц, относящегося к системе Малого Кавказа. Папоротник найден на высоте 1800 м над ур. моря на северо-восточном склоне, занятом дубовым редколесьем из *Quercus macranthera* Fisch. et Mey. с пышно развитым травяным покровом, с обилием злаков и бобовых.

Этот вид, широко распространенный в умеренных районах Европы, Азии и Северной Америки, на Кавказе собирался ранее лишь в Центральном Предкавказье и в районах, прилегающих к Черному и Каспийскому морям. В 1931 г. экземпляры *O. vulgatum*, собранные на территории Азербайджанской ССР, были изданы Ю. Н. Вороновым в серии *Herbarium Florae Caucasicae* с примечанием: «распространен по всем лесным провинциям Кавказского края и в Талыше, но с Малого Кавказа пока не известен». Дэвис [5] приводит этот вид для Анатолийского полуострова, но в непосредственно прилегающих к Армянской ССР районах Турции и Ирана *O. vulgatum* пока не обнаружен.

Heliotropium supinum L.— новый вид для Армении, собран в 1954 г. неизвестным коллектором (гербарий Ботанического института АН АрмССР) в Арташатском районе, близ с. Реган. На Кавказе встречается лишь на Кура-Араксинской низменности и в Талыше. Таким образом, новое местонахождение в Армении является наиболее западной точкой его ареала в Закавказье. Ареал распространения охватывает Средиземноморье, Иран и территорию до Гималаев. По Кузнецову [2], вид является, по-видимому, мигрантом, проникшим на Кавказ с юга. *H. supinum* — своеобразный в морфологическом отношении вид, интересен своими плодами, состоящими из одного орешка, образующегося только из одного гнезда обычной для *Boagipaseae* четырехгнездной завязи, при недоразвитии трех гнезд, срastaющихся с фертильным. Благодаря

этой особенности *H. supinum* выделялся в самостоятельный монотипный род *Piptoclaina* G. Don. Другие авторы ограничивались рангом секции *Piptoclaina* (G. Don) Endl. рода *Heliotropium* L. или — в последнее время — подрода *Piptoclaina* (G. Don) H. Riedl [6].

Myosotis refracta Boiss. — новый вид для флоры Кавказа. В СССР известен из Крыма и Средней Азии. Ареал этого вида охватывает территорию от Испании, откуда он и описан, через Средиземноморье до Пакистана и Памиро-Алая. Характерными признаками, отличающими его от близких видов, являются наличие крючковатых жестких волосков не только на чашечке, но и на нижней поверхности листьев и у основания стебля, в сочетании с нежным курчавым шерстистым опушением на стебле вплоть до области соцветия, на плодоножках и чашечке, а также своеобразное положение плодоножек, которые обычно отогнуты вниз и прилегают к стеблю.

Местонахождения в Армянской ССР: Талинский р-н, окр. с. Кармрашен, каменистые склоны, 9.VI.1959, Ш. Асланян и Р. Карапетян; Вединский р-н, правый берег р. Веди в окр. с. Кюсус, 28.V.1960, А. Тахтаджян, Я. Мулкиджян, Э. Габриэлян.

Rhynchocorys elephas (L.) Griseb. — редкий для Армении вид. Впервые обнаружен Э. Ц. Габриэлян и А. Г. Еленевским на Зангезурском хребте, на г. Хуступ в 1959 [1]. В 1968 г. он был найден нами в Кироваканском районе, в окрестностях с. Лермонтово, под пологом смешанного леса, по берегу ручья.

Два известных теперь в АрмССР местонахождения *Rh. elephas* находятся в различных флористических и экологических районах в пределах горных хребтов, относящихся к системе Малого Кавказа. *Rh. elephas* — средиземноморский горный вид, во «Флоре СССР» [4] приводится только для Западного и Восточного Закавказья и Талыша, но в действительности широко распространен и на северном макросклоне Большого Кавказа — от басс. р. Кубани через Приэльбрусье на восток до Северной Осетии.

Институт ботаники
АН АрмССР

Поступило 9.I 1969 г.

Տ. Ն. ՊՈՊՈՎԱ

ՅԼՈՐԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Սեփական հավաքների և Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի բուսաբանական ինստիտուտի հերբարիումի նյութերի որոշման հիման վրա, բերվում են տեղեկություններ Հայկական ՍՍՀ-ում Անդրկովկասի համար հազվագյուտ տեսակների նոր գտնված տեղերի մասին:

Ophioglossum vulgatum L. — Հալաստանի ֆլորայի համար նոր ցեղ է տեսակ. *Heliotropium supinum* L. — Հալաստանի ֆլորայի համար նոր տեսակ. *Myosotis refracta* Boiss. — Կովկասի ֆլորայի համար նոր տեսակ. *Rhynchocorys elephas* (L.) Griseb — Հալաստանում հազվագյուտ տեսակ:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Габриэлян Э. Ц. и Еленевский А. Г. Изв. АН АрмССР, XIV, 1, 1959.
2. Кузнецов Н. И. Мат. Фл. Кавк. IV, 2, 1913.
3. Тахтаджян А. Л. Карта районов флоры Армянской ССР. Флора Армении, 1, 1954.
4. Флора СССР, I, XIX, XXII, изд. АН СССР, М.—Л., 1934, 1953, 1955.
5. Davis P. H. Flora of Turkey and the East Aegean Islands 1, 1965.
6. Riedl H. In Rechinger K. H. Flora iranica 48, 1967.