Э. Г. АКРАМОВСКАЯ

НОВЫЕ ДЛЯ ФАУНЫ СССР, КАВКАЗА И АРМЕНИИ
ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ С АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ
И ПРИЛЕГАЮЩИХ ПРЕДГОРИЙ

В статье сообщается о нескольких находках, сделанных нами при изучении фауны полужесткокрылых Араратской равнины и прилегающих предгорий, которые являются новыми для Армении. Некоторые из них оказались новыми для СССР**, другие—для Кавказа*.

В статье использованы личные сборы, а также коллекционные материалы, хранящиеся в Зоологическом институте АН АрмССР.

Сем. *Nepidae*

Nepa dollfusi Esaki*

Ранее этот вид в наших сборах значился как *N. cinerea* L. и *N. cinerea* L. f. *minor* Put. [1]. В настоящее время выделены более существенные признаки для определения видов рода [5], благодаря чему удалось уточнить, что этот вид—*N. dollfusi* Esaki.

Материал: Аштаракский район: Аштарак—Ереван; Абовянский район: Джрвежское ущелье, водоем; Арташатский район: Бурастан, водоем; Октемберянский район: оз. Айгер-лич и истоки р. Севджур. Найден в других районах Армении: г. Степанаван; Иджеванский район; родник Хачбулах; Абовянский район: Зар.

Общее распространение: СССР (Средняя Азия), Марокко, Сардиния, Корсика, Израиль.

По нашим данным, имаго встречаются с ранней весны до поздней осени и являются зимующей фазой.

Сем. *Anthocoridae*

Orius vicinus Ribaut

Материал: Ереван (Советашен); Эчмиадзинский район: Эчмиадзин, Нижняя Зейва; Октемберянский район: Шаварут, Камышлу; Арташатский район: Димитров; Араратский район: совхоз им. Кирова.

Общее распространение: СССР (Европейская часть, всюду, кроме Севера, Северный Кавказ и Черноморское побережье Кавказа, Грузия, Азербайджан, Средняя Азия), Турция, Израиль.

По нашим данным, имаго встречаются с ранней весны в детрите под деревьями. Выходят с мест зимовок в начале апреля на сорную расти-

тельность, затем с начала июня имаго и личинки встречаются в скрученных листьях лоха, где питаются эриофинидными клещами и, по-видимому, тлями. В начале июля, а при ранней весне в конце июня, начинается активная деятельность имаго и личинок орнусов на культурах огурцов и баклажан и в меньшей степени на дынях, арбузах, помидорах. Они встречаются преимущественно на нижней стороне листьев, где питаются паутиным клещиком, бахчевой тлей, табачным трипсом и др. Днем имаго прячутся в гуще листьев, активны к девятнадцати часам или в пасмурную погоду. Уходят на зимовку в 20-х числах октября.

Сем. *Miridae*

Deraeocoris (C.) *serenus* Douglas et Scott

Ранее этот вид в наших сборах смешивался с *D. (C) punctulatus* Fall., который обычен для Армении. После изучения гениталий— [3] в этом материале был найден также *D. (C.) serenus* Dgl. et Sc.

Материал: Абовянский район: Джрвежское ущелье; Ереван (ущелье Бердадзор, ущелье р. Раздан, лесопосадки под Часовым заводом, Комсомольский парк); Эчмиадзинский район: Паракар. Вид широко распространен по всей Армении.

Общее распространение: СССР (средняя полоса и юг Европейской части, Средняя Азия), все Средиземноморье, Австрия, Чехословакия, Венгрия, Югославия, Иран, Ирак.

Хищник. По нашим данным, имаго встречаются с ранней весны до поздней осени и являются зимующей фазой.

Adelphocoris *ticinensis* Meyer Dür

Материал: Ереван (ущелье Бердадзор); Аштаракский район: лесополоса.

Общее распространение: СССР (средняя полоса и юг Европейской части СССР, Северный Кавказ, Грузия), Средняя и Южная Европа, Алжир, Иран.

Имаго отмечены нами в начале июня и в конце августа.

Phytocoris (Kt.) *niveatus* Horvath

Материал: Абовянский район: Джрвежское ущелье; Ереван (ущелье Бердадзор).

Общее распространение: СССР (Дагестан, Нахичеванская АССР), Турция.

Имаго отмечены нами в первой половине августа и в середине октября.

Сем. *Tingidae*

Tingis (L.) *ciliaris* Puton

Материал: Аштаракский район: Агарак.

Общее распространение: СССР (Крым, Черноморское побережье Кавказа, Грузия, Азербайджан, Дагестан).

Отмечен нами во второй половине апреля.

Сем. Lygaeidae

Emblethis brachynotus Horvath*

Материал: Ереван (Парк Победы, в травяной подстилке).

Общее распространение: СССР (Юго-Восток Европейской части, Средняя Азия, Сибирь), Чехословакия, Венгрия, Турция, Монголия.

Имаго отмечены нами в середине апреля.

Emblethis persicus Josifov**

Материал: Ереван; Арташат. Кроме того, собран в Армении из Туманянского района: Ахтала; Кафанского района: Вачаган.

Общее распространение: Иран.

Имаго отмечены нами поздней осенью и являются зимующей фазой.

Emblethis karamanus Seidenstücker*

Материал: Абовянский район: Джрвежское ущелье; Ереван (ущелье Бердазор, Детская железная дорога, Советашен); Арташат; Октемберянский район: Бахчалар.

Кроме того, собран в Армении из Аштаракского района: Бюракан; Абовянского района: Джрабер; Амасийского района: Дашкерпи.

Общее распространение: СССР (Средняя Азия), Турция.

По нашим данным, имаго встречаются с ранней весны до поздней осени и являются зимующей фазой.

Scolopostethus decoratus Hahn

Материал: Абовянский район: Джрвежское ущелье, с болотной растительности.

Общее распространение: СССР (лесная зона Европейской части, Крым, Черноморское побережье Кавказа, Нахичеванская АССР), вся Европа, Алжир, Марокко, Передняя Азия.

Сем. Cydnidae

Aethus hispidulus Klug

Материал: Ереван (холм Цицернакаберд и ущелье р. Раздан).

Общее распространение: СССР (Азербайджан, Средняя Азия), Средиземноморье (без Малой Азии), Египет, Иран.

Живет в поверхностном слое почвы.

Имаго встречались нам ранней весной в конце марта и являются зимующей фазой.

Aethus sahlbergi Reuter**

Материал: Ереван (ущелье р. Раздан и ущелье р. Гетар, правый склон у Зейтуна).

Общее распространение: Средиземноморье и Иран.

Живет в поверхностном слое почвы.

По нашим данным, имаго встречаются с ранней весны, с конца марта и являются зимующей фазой.

Canthophorus mixtus Asanova

Ранее этот вид в наших сборах по старым определениям значился как *C. dubius* var. *melanopterus* H.—S. [1]. По гениталиям [2] этот вид должен быть отнесен к *C. mixtus* Asanova.

Материал: Абовянский район: Вохчаберд, Джрвежское ущелье; г. Ереван. Кроме того, найден в Армении в следующих местах: Туманянский район: Ахтала; Гукасянский район: Гукасян, Казанчи, окрестности Арпи-лич, Шурабад; Амасийский: Амасия; г. Лениакан, г. Артик; Анийский: Маралик; Севанский: берег р. Гехарот, Севан, Агавнадзор, Цахкадзор, Фонтан; Красносельский: Шоржа; Аштаракский район: гора Арагац; Басаргечарский: Шишкая, Джанахмед; Мартунинский: Яных; г. Камо; Абовянский: Гарни, Гехард; Даралагязский хребет (Вайоцдзор), гора Сенгер; Азизбековский район: Куши (Кушибулах).

Общее распространение: СССР (юг Европейской части, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Киргизия).

Заселяет большей частью степные, открытые места, целинные участки, склоны холмов и оврагов, парки; песчаные, глинистые, черноземные и щебнистые почвы.

По нашим данным, имаго встречаются с ранней весны до поздней осени и являются зимующей фазой.

Сем. *Pentatomidae*

Sciocoris umbrinus Wolff*

Материал: Абовянский район: Джрвежское ущелье, под *Thymus*.

Общее распространение: СССР (лесная и лесостепная зоны Европейской части, Сибирь), Северо-восточная, Средняя и Южная Европа, Малая Азия, Израиль, Иран.

В лесной и лесостепной зонах, на каменистых склонах и в сухих песчаных биотопах. Под *Thymus*, *Salvia*, *Calluna vulgaris*, *Astragalus*, *Artemisia*, *Plantago* [6].

Нами собран в середине октября.

Встречаются с ранней весны до поздней осени [4].

По литературным данным, зимуют имаго [7].

Bagrada abeillei Puton

Материал: Октемберянский район: Хербеклу.

Общее распространение: СССР (Грузия, Азербайджан), Израиль, Сирия, Турция, Иран.

Собран в конце апреля.

Է. Գ. ԱՎՐԱՄՈՎՍԿԱՅԱ

ՄԻՈՒԹՅԱՆ, ԿՈՎԿԱՍԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՆՈՐ ՄԼՈՒԿՆԵՐ
ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՀԱՐԹԱՎՈՅՐԻՑ ԵՎ ՆՐԱՆ ԿԻՑ ՆԱԽԱԼՆՌԵՆԱՅԻՆ ՄԱՍԻՑ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Հոդվածում բերված են 15 նոր տեսակի մլուկների Հայաստանի համար, որոնցից 2-ը նոր են Միուսյան, իսկ 4-ը՝ Կովկասի համար: Դրանք են՝

1. *Nepa dollfusi* Esaki*
2. *Orius vicinus* Ribaut
3. *Deraeocoris* (C.) *serenus* Douglas et Scott
4. *Adelphocoris ticinensis* Meyer Dür
5. *Phytocoris* (Kt.) *niveatus* Horvath
6. *Tingis* (L.) *ciliaris* Puton
7. *Emblethis brachynotus* Horvath*
8. *Emblethis persicus* Josifov**
9. *Emblethis karamanus* Seidenstücker*
10. *Scoloposthetus decoratus* Hahn
11. *Aethus hispidulus* Klug
12. *Aethus sahlbergi* Reuter**
13. *Canthophorus mixtus* Asanova
14. *Sciocoris umbrinus* Wolff*
15. *Bagrada abeillei* Puton

Տրվում է նրանց հավաքման տեղերը, աշխարհագրական տարածումը և որոշ ֆենոլոգիական տվյալներ:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. *Акрамовская Э. Г.* Зоологический сборник, XI, стр. 79—143, 1959.
2. *Асанова Р. Б.* Энтомологическое обозрение, т. XIII, 1, стр. 138—144, 1964.
3. *Кержнер Н. М. и Ячевский Т. Л.* В книге: Определитель насекомых Европейской части СССР, т. I, М.—Л., стр. 655—843, 1964.
4. *Пучков В. Г.* Фауна Украины, т. XXI, Щитники. Изд. АН УкрССР Кив, стр. 240, 1961.
5. *Seidenstücker G.* „Reichenbachia“ (Dresden), Bd. 1, 37, S. 315—322, 1963.
6. *Stichel W.* Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. Europa, vol. 1—4, Berlin—Hermsdorf 1956—1961.
7. *Wagner E.* Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meerteile. Wanzen oder Heteropteren 1, Pentatomorpha, 233S., Jena, 1966.