

А. А. АВАКЯН

ВРЕДИТЕЛИ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ АРМЯНСКОЙ ССР

Для выявления и изучения видового состава вредителей ягодных культур в условиях Армянской ССР нами за 1964—1968 гг. были проведены маршрутные обследования ягодных культур во всех районах их выращивания. В результате обследований и по имеющимся литературным данным нами было установлено, что ягодные культуры повреждаются 65 видами вредителей.

На землянике — полевой слизень (*Derocerces laeve* Müll.), янтарка стройная (*Succinia elegans* R.), хризантемная нематода (*Aphelenchoides ritzemabosi* St.), крапчатая многоножка (*Blanjulus guttulatus* L.), обыкновенный паутинный клещ (*Tetranychus urtica* Koch.), земляничный (прозрачный) клещ (*Tarsonemus pallidus* Banks.), свободноживущий четырехногий клещ (*Sierraphytoptus setiger* Nal.), зеленый кузнечик (*Tettigonia viridissima* L.), медведка обыкновенная (*Gryllotalpa gryllotalpa* L.), обыкновенная уховертка (*Forficula auricularia* L.), огородная уховертка (*Forficula tomis* Kol.), цикадка (*Typhlocyba* Sp.), клоп луговой (*Lygus pratensis* L.), клоп многоядный (*Lygus pabulinus* L.), клоп травяной (*Lygus rubicundus* Fall.), ягодный клоп (*Dolycoris baccarum* L.), табачный трипс (*Thrips tabaci* Lind.), закавказский мраморный хрущ (*Polyphylla olivieri* Cast.), мягкотелка цветочная (*Contarinia livida* L.), жук-мягкотел (*Malachius affines* Mén.), волнистая блошка (*Phyllotreta undulata* K.), синяя блошка (*Phyllotreta nigripes* F.), малинно-земляничный долгоносик-цветоед (*Anthonomus rubi* Hbst.), *Sciaphilus asperatus* Bamsd., земляничная листовертка (*Ancyliis comptana* Froel.), листовертка-чеканщица (*Sacoecia strigana* Hb.), листовертка-неглектана (*Clepsis neglectana* Hs.), муравей из рода *Lasius* и малинная минирующая муха (*Agromyza spiraeae* Kalt.).

На малине — обыкновенный паутинный клещ (*Tetranychus urtica* Koch. (малинный паутинный клещ) *Neotetranychus rubicola* Bagd.), листовая малинная тля (*Macrosiphum rubi* Klt.), акациевая ложнощитовка (*Partenoleconium corni* Bché.), *Phyllobius schneidus* S.), малинный жук (*Byturus tomentosus* F.), малинно-земляничный долгоносик-цветоед (*Anthonomus rubi* Hbst.), *Sciaphilus asperatus* B., *Polydrosus inustus* Germ., совка расписная (*Grammodes alginii* L.), совка геометрика (*Grammodes geometrica* F.), темно-серая ранняя совка

(*Monia gracilis* F.), буро-серая садовая совка (*Polia contigua* Vill.), малинный минирующий пилильщик (*Entodecta pumilius* Kl.), таволговый полосатый пилильщик (*Pristiphora pallidiventris* Fall.), малинный пестрый пилильщик (*Arge caerulescens* Geoffr.), *Empria tridens* Knw., *Emphytus viennensis* Schr., *Hartigia nigra* Harr., *Syrista parreyssi* Spin.

На смородине — обыкновенный паутинный клещ (*Tetranychus urtica* Koch.), смородинная листовая галловая тля (*Capitophorus ribis* L.), крыжовниковая побеговая тля (*Aphis grossulariata* Kalt.), акациевая ложнощитовка (*Partenoleconium corni* Bché.), армянская запятовидная ложнощитовка (*Lepidosophes malicola* Barch.), березовая подушечница (*Pulvinaria bitulae* L.), смородинная узкотелая златка (*Agrilus chrysoderes* Ab.), смородинная стеклянница (*Synanthedon tipuliformis* Cl.), смородинная листовертка (*Pandemis ribeana* Hb.), розанная листовертка (*Cacoecia rosana* L.), кольчатый шелкопряд (*Malacosoma neustria* A.), смородинная серая пяденица (*Thomponoma vauaria* L.), крыжовниковая пяденица (*Abraxas grossulariata* L.), цветочная пяденица драковая (*Thymnoscelis pumilata* Hb.), совка с — черная (*Graphiphora s — nigrum* L.), мешочница чистая (*Fumea casta* Pall.), *Thyridopteryx ephemeraeformis* H., непарный шелкопряд (*Lymantria dispar* L.), *Pristiphora discoidales* Thoms., черносмородинный ягодный пилильщик (*Pachynematus pumilio* Knw.), *Emphytus viennensis* Schr.

На крыжовнике — обыкновенный паутинный клещ (*Tetranychus urtica* Koch.), крыжовниковая побеговая тля (*Aphis grossulariata* Kalt.), акациевая ложнощитовка (*Partenolecnium corni* Bché.), березовая подушечница (*Pulvinaria bitulae* L.), *Pristiphora discoidales* Thoms., желтый крыжовниковый пилильщик (*Pteronidea ribesii* Scop.), совка с — черная (*Graphiphora s — nigium* L.).

Из перечисленных видов для СССР указывается впервые *Sierraphytoptus setiger* Nal. а для Армении — *Derocercus laeve* Müll., *Tarsonemus pallidus* Banks., *Capitophorus ribis* L., *Aphis grossulariata* Kalt., *Agrilus chrysoders* Ab., *Byturus tomentosus* F., *Cacoecia strigana* Hb., *Clepsis neglectana* Hs., *Ancyliis comptana* Froel., *Entodecta pumilius* Kl., *Agromyza spiraeae* Kalt.

Армянский сельскохозяйственный институт

Поступило 26.II 1971 г.

Полный текст статьи депонирован в ВИНТИ