

С. Г. АКОПЯН

## ВИДОВОЙ СОСТАВ ТРИПСОВ, ПОВРЕЖДАЮЩИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ В АРМЯНСКОЙ ССР

В результате наших исследований в течение 1969—70 гг. в АрмССР были выявлены следующие виды трипсов.

**Трипс тонкогрудый** (*Melanthrips gracilicornis* Maltbaek) — обитает в соцветиях сложноцветных и в цветках плодовых, повреждает завязи.

**Трипс закавказский** (*Limothrips transcaucasicus* Savenko) — повреждает пшеницу и ячмень.

**Трипс виноградный** (*Drepanothrips reuteri* Uzel) — обитает на листьях, является вредителем виноградной лозы.

**Трипс люцерновый** (*Odontothrips phaleratus* Haliday) — повреждает в семенных посевах цветки клевера и люцерны.

**Трипс бобовый** (*Odontothrips intermedius* Uzel) — обитает в соцветиях гороха, чечевицы, фасоли и нута.

**Трипс тонкоусый** (*Frankliniella tenuicornis* Uzel) — обитает на колосьях, метелках и листовых обертках злаковых.

**Трипс разноядный** (*Frankliniella intonsa* Trybom) — обитает в соцветиях и на листьях различных растений, особенно повреждает табак.

**Трипс грушевый** (*Taeniothrips unconsequens* Uzel) — встречается на листьях и соцветиях плодовых и ягодных культур.

**Трипс Федорова** (*Taeniothrips fedorovi* Priesner) — встречается на соцветиях различных растений.

**Трипс подбеловый** (*Taeniothrips annalatus* Karny) — обитает в основном в соцветиях сложноцветных.

**Трипс тучный** (*Thrips validus* Uzel) — встречается в соцветиях различных растений, особенно плодово-ягодных.

**Трипс субальпийский** (*Thrips physapus* Linne) — обитает в соцветиях многих растений.

**Трипс табачный** (*Thrips tabaci* Lind) — повреждает многие растения, в основном репчатый и семенной лук.

**Трипс желтый** (*Thrips flavus* Schrank) — обитает в соцветиях овоще-бахчевых культур.

**Трипс пасленовый** (*Thrips fuscipectus* Haliday) — обитает в цветках картофеля, баклажана, перца и томата.

**Трипс луковичный** (*Liothrips vaneeskei* Priesner) — обитает между чешуйками репчатого лука и чеснока.

**Трипс чернобрюхий** (*Xylaplothrips fuliginosus* Schille) — обитает в трещинах коры на плодовых деревьях.

**Трипс пустоцветный** (*Haplothrips aculeatus* Fabricius) — повреждает злаковые.

**Трипс клеверный** (*Haplothrips niger* Osborn) — встречается в цветках фасоли, гороха и нута.

**Трипс короставниковый** (*Haplothrips acanthoscelis* Karny) — встречается в соцветиях лука.

**Трипс пшеничный** (*Haplothrips tritici* Kurd) — повреждает в основном зерновые культуры — озимую и яровую пшеницу.

**Трипс ромашковый** (*Haplothrips angusticornis* Priesner) — обитает в соцветиях клевера, люцерны и томата.

**Трипс пупавковый** (*Haplothrips kraussei* Priesner) — повреждает семенники редьки и редиса.

**Трипс нивянкковый** (*Haplothrips Leucanthemi* Schrank) — обитает в соцветиях различных растений.

**Трипс сучьевый** (*Hoplandrothrips bispinosus*) — обитает под корой деревьев и кустарников.

Армянский сельскохозяйственный институт

Поступило 1.VI 1971 г.

Полный текст статьи депонирован в ВИНТИ