

РЕФЕРАТ

УДК 576.895.7

А. Е. ТЕРТЕРЯН

МАТЕРИАЛЫ ПО ФАУНЕ И СЕЗОННОМУ ЛЕТУ СЛЕПНЕЙ АРМЯНСКОЙ ССР. III.

В предыдущих двух сообщениях в систематическом порядке был приведен список видов и подвидов слепней Армянской ССР из родов *Silvius* (2), *Nemorius* (2), *Chrysops* (5), *Dasyramphis* (1), *Philipomyia* (1), *Tabanus* (32), *Hybomitra* (1). Для каждого вида и подвида было дано географическое распространение по Армении, а также приведены сведения о сроках лета, сезонной активности, численности слепней и ряд других данных по их экологии, в частности по роению и копуляции слепня *T. tergestinus* Egg. и ночной активности *T. anthrax* Ols.

В настоящем сообщении продолжен список видов и подвидов слепней из родов *Hybomitra* (5), *Theriopectes* (2), *Atylotus* (5), *Haematopota* (3). Приведен также материал по распространению, по срокам лета, сезонной численности, соответственно по отдельным географическим участкам Армении. В этом сообщении имеются также сведения по ряду моментов поведения слепней, мало освещенных в литературе. На протяжении многих лет изучения слепней в различных зонах республики удалось собрать данные по питанию их растительной пищей. Приводится материал по посещению самок отдельных видов слепней для взятия нектара с соцветий зонтичных (*Ferula* sp., *Heraclium* sp.). Представляют интерес наблюдения за поведением некоторых слепней в Араратской котловине и Мегринском районе, которые питались выделениями тлей, в массе встречающихся на тростнике. На этих участках отмечены слепни, питающиеся соком ягод тутовых деревьев (шелковицы). В Мегринском районе на сочных плодах инжира сорта кюрджент были обнаружены самки и самцы слепней, слизывающие сочащийся по поверхности плода сладкий сок. Приводятся также сведения о перелетах самок слепней, полученные в опытах с их маркировкой. Опыты были поставлены в Мегринском и Гугаркском районах. В Мегринском районе маркированные слепни вторично были пойманы на расстоянии 3,5—4 км, а в Гугаркском—8,5—9 км от места выпуска.

Иллюстраций 1. Библиографий 6. Таблиц 3.

Институт зоологии

АН АрмССР

Поступило 10.X 1972 г.

Полный текст статьи депонирован
в ВИНТИ