

РЕФЕРАТ

УДК 576.895.7

А. Е. ТЕРТЕРЯН

МАТЕРИАЛЫ ПО ФАУНЕ И СЕЗОННОМУ ЛЕТУ СЛЕПНЕЙ АРМЯНСКОЙ ССР. I.

Слепни (Tabanidae) относятся к комплексу летающих кровососущих двукрылых-гнусу. Они очень активно нападают на различных сельскохозяйственных и диких животных, а также на человека. Помимо этого, их вред заключается еще и в переносе различных трансмиссивных заболеваний человека и животных.

Первые сведения о видах слепней с указанием местонахождения «Армения» встречаются до 1928 г. в работах русских и иностранных исследователей. В дальнейшем в трудах отечественных и зарубежных ученых приводится перечень видового состава слепней из некоторых географических точек Армянской ССР. Планомерное изучение фауны слепней Армянской ССР началось с 1948 г. Была поставлена задача выяснить видовой состав, экологию имагинальных и преимагинальных фаз развития в поясном разрезе, сезонный и дневной ритмы лета и численность взрослых слепней в разных природно-географических зонах республики.

В настоящей статье мы касаемся только части видового состава слепней Армении. Порядок родов в ней принят по Олсуфьеву.

Фауна слепней Армянской ССР еще полностью не изучена, что видно по списку, в котором дан ряд видов и подвидов, впервые указываемых для территории республики: *Silvius latifrons* Ols., *S. vituli* F., *Nemorius caucasicus* Ols., *Chrysops (Heterochrysops) flavipes punctifer* Lw., *Dasyramphis umbrinus* Mg., *Tabanus regularis* Jaenn., *T. indrae indrae* Haus., *T. indrae vappa* Bog. et Sam., *T. laetitinctus laetitinctus* Beck., *T. caucasicus* Kröb., *T. hauseri* Ols., *T. anthrax* Ols., *Hybomitra distinguenda* Verr., *H. schineri* Lyn., *H. peculiaris* Szil., *H. nigrivitta* Ols., *Therioptes carabaghensis* Portsh., *Atylotus fulvus transcaucasicus* Haus., *At. proditor* Bog. et Sam., *At. ? agrestis* Wd., *At. pulchellus carybenthinus* Szil., *At. flavoguttatus* Szil.

В статье в систематическом порядке приводится список 24 видов и подвидов слепней. Для каждой формы указано географическое распространение по Армении на основе личных коллекционных сборов и наблюдений в природе. Дана также общая характеристика сезонного лета и численность отдельных видов слепней в различных природно-географических зонах Армении. В таблицу сведены данные по началу и концу

лета для ряда широко распространенных видов. В северных лесных районах республики эти насекомые достигают большой численности, уровень обилия в некоторых пунктах сходен с таковым, отмечаемым разными исследователями для Карелии, средней полосы СССР, Азербайджана, Средней Азии и ряда мест Сибири. Приведены материалы по дневному ритму лета ряда видов слепней Армении, характеризующему активность их нападения в различных зонах республики. Таблиц 1. Иллюстраций 4. Библиографий 18.

Институт зоологии АН Арм ССР

Поступило 18.IV 1972 г.

Полный текст статьи депонирован в ВИНТИ