

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 582.998

Н. С. ХАНДЖЯН

НОВЫЕ ДЛЯ СССР И АРМЕНИИ ВИДЫ РОДА
TRIPLEUROSPERMUM SCH. Bip.

Обнаружены новые для СССР и Армении виды рода *Tripleurospermum* Sch. Bip.

T. grossheimii (Fedor.) Pobed. — новый вид для ССР и Армении вид; *T. tzvelevii* Pobed. — новый для Армении вид.

При обработке материала по роду *Tripleurospermum*, собранного нами в 1969—1971 г.г. на Кавказе, обнаружены новые для СССР и Армении флористические находки.

T. grossheimii (Fedor.) Pobed. — Новый для Армении и СССР вид. Данный вид по сборам Гроссгейма с г. Большой Арарат Федоров [2] описал как *Chamaemelum grossheimii*. Немногочисленные экземпляры *T. grossheimii* (4 экз.), собранные в Турции (г. Большой Арарат) разными коллекторами, хранятся в гербарии Института Ботаники АН Груз. ССР. В гербарии АН СССР находится лишь типовой экземпляр вида. До настоящего времени вид считался эндемом Арарата. На территории Советской Армении *T. grossheimii* собран нами в 1969 г. на границе Армении с Турцией, близ вершины г. Гукасян-Мец на высоте 2900 м над ур. м. Вид обитает в верхнем горном поясе среди камней.

При просмотре материала, хранящегося в гербарии отдела местной флоры Ботанического института АН АрмССР, любезно предоставленного А. А. Ахвердовым и Н. В. Мирзоевой, выяснилось, что данный вид в 1965 г. был собран ими в Армении, на горе Спитак сар (Аг-даг). Нахождение вида в различных пунктах Кавказа не исключает возможности произрастания его и на других горных массивах Кавказа.

T. tzvelevii Pobed. — Новый вид для Армении. Описан Победимовой [1] по сборам А. Е. Боброва и Н. Н. Цвелева из Лерикского района Азербайджанской ССР и пока известен только из этого местонахождения. Данный вид нами был найден в 1970 г. в окрестностях Еревана по дороге между Вардашеном и Советашеном, в условиях полынной полупустыни. В указанном районе в основном глинистый краснозем. Как выяснилось, чернозем (на небольшой территории), на котором произрастали крупные, достигающие 1 метра экземпляры *T. tzvelevii* привозился из Разданского р-на Армянской ССР. Таким образом, не исключается, что этот вид

произрастает и в других пунктах Кавказа, в частности в Разданском районе Армении.

Институт ботаники
АН АрмССР

Поступило 9.II 1972 г.

Ե. Ս. ԽԱՆՉՅԱՆ

TRIPLEUROSPERMUM SCH. BIP. ՅԵՂԻ ՆՈՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐ
ՍՍՇՄ-Ի ԵՎ ՀՍՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

1969—1971 թթ. Կովկասում մեր հավաքած հերբարիումի որոշման ժամանակ հայտնաբերվել են երկու նոր տեսակներ՝ ՍՍՇՄ-ի և Հայաստանի համար:

T. grossheimii (Fedor.) Pobed. — նոր տեսակը հավաքվել է Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանագլխին Ղուկասյան-Մեծ լեռան վրա: *T. tzvelevii* Pobed. տեսակը՝ Երևան-Վարդաշեն ճանապարհ-հատվածում:

Այս տեսակների նոր հավաքները թույլ են տալիս ենթադրելու, որ նրանք կարող են հայտնաբերվել նաև Կովկասյան լեռնաշղթայի այլ վայրերում:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Победимова Е. Г. Новости систематики высших растений, 1965.
2. Федоров Ан. А. Ботанический журнал. 34, 3, 1949.