

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 582.683

В. Е. АВЕТИСЯН

ALYSSUM PERSICUM BOISS. ВО ФЛОРЕ КАВКАЗА

В статье обосновывается объединение видов *Alyssum persicum* Boiss. и *A. muelleri* Boiss. et Buhse под приоритетным эпитетом *A. persicum* Boiss. Последний в новом понимании впервые приводится для флоры СССР.

Alyssum persicum Boiss. был известен только из Ирана. Для Кавказа (Южное Закавказье) приводился лишь близкородственный *A. muelleri* Boiss. et Buhse. Однако изучение типового материала и богатых гербарных коллекций из Южного Закавказья утвердило меня в мнении о тождественности этих видов.

A. muelleri в ботанической литературе [2—5 и др.] фигурирует как один из характерных компонентов сухих, каменистых, ксерофитизированных склонов нижнего и среднего горных поясов Южного Закавказья и Ирана. Описан [7] из окрестностей Еревана и из Ирана (In den Vorbergen des Kisildagh bei Gamarlu in der Nähe von Erevan, 21.IV.1847, № 93/1; Gebirge bei Yasd (Deh ballo) 24.IV.1849, № 1358. isosyntypus LE!). В первоописании указано, что высота стебля равна 5—10 см и что близкий вид, *A. persicum*, отличается от *A. muelleri* более высоким ростом и более крупными цветками и листьями. Последующие авторы, в частности Буш [3] и Карягин [5], допустимую высоту стебля доводят до 17—25 см. Но во «Flora Iranica», где цитируется всего 7 гербарных образцов, Рехингер [8] указывает размеры, соответствующие первоописанию. *A. persicum* во «Флоре СССР» приводится Бушем [3] ориентировочно, на случай возможного нахождения его на территории СССР. Описан [7] из Ирана („Israhan, Aucher, № 4089“, isotypus LE!) Для Ирана данный вид приводится Рехингером [8] как эндем, причем также в соответствии с первоописанием, но всего по трем гербарным экземплярам.

Судя по «Flora Iranica», сборы обоих этих видов из Ирана весьма скудные и габитуально соответствуют типовым экземплярам. Однако при изучении богатых сборов из Южного Закавказья (АрмССР, Нах. АССР), хранящихся в различных гербариях (LE, ERE, ТВУ, ВАК) под эпитетом *A. muelleri*, выяснилось, что данное родство здесь представлено как крайними формами, соответствующими диагностическим комплексам *A. muelleri* и *A. persicum*, так и множеством переходных форм.

Отличия между *A. persicum* и *A. muelleri* в основном габитуальные и заключаются в следующем:

	<i>A. persicum</i>	<i>A. muelleri</i>
Стебли	(8—12) 13—30 см выс.	(1,5—5) 5—10 (17—25) см выс.
Листья	(15) 20—25 мм дл.	до 10 (15) мм дл.
Соплодия	удлиненные	укороченные
Чашелистики	4,5—5 мм дл.	3,5—4 мм дл.
Лепестки	6—7 мм дл.	4—5 (6) мм дл.
Стручочки	(4,5) 5—7 (8) мм дл.	3—4,5 (5) мм дл.
Столбики	4—6 мм дл., преимущественно опушенные, реже голые	2,5—4 мм дл., обычно голые, реже опушенные
Семена	от широко крылатых до бескрылых	бескрылые, реже с узким крылом

Как видно из приведенных данных, все признаки перекрываются, и четкой границы между *A. persicum* и *A. muelleri* провести нельзя. Переходные формы представлены в различных комбинациях признаков: габитус крупный, но столбики голые; растения очень низкие, но плоды крупные и столбики опушенные; на одном и том же экземпляре есть и голые и опушенные столбики и пр. Кроме того, с одних и тех же мест есть сборы, соответствующие крайним формам. Несомненно, на территории Ирана наблюдается та же картина переходов, в настоящем, к сожалению, не зафиксированная в гербарных сборах.

Таким образом, учитывая отсутствие морфологических и количественных отличий, а также какой-либо экологической и географической приуроченности, данные виды следует объединить под приоритетным эпитетом *A. persicum* Boiss.

К этому же родству принадлежит пока известный только из Ирана *A. iranicum* Hausskn. et Baumg., который габитуально близок низкорослым экземплярам *A. persicum* s. l., но отличается от последнего соотношением длины столбика и стручочка (столбик в 2—3 раза короче стручочка, тогда как у *A. persicum* они почти равны).

Итак, со времени выхода в свет обработки крестоцветных Буша [3] для «Флоры СССР», из 3 видов рода *Alyssum*, приведенных им на случай возможного нахождения их на территории СССР, два нами уже зарегистрированы: *A. macrostylum* Boiss. et. Huet. из северо-западных районов АрмССР, примыкающих к Турции, откуда этот вид известен [1], и *A. persicum* (в новом понимании) — из флористических округов Закавказья, находящихся под непосредственным влиянием иранской флоры.

Վ. Ե. ԱՎԵՏԻՍԻԱՆ

ALYSSUM PERSICUM BOISS. ՏԵՍԱԿԸ
ԿՈՎԿԱՍԻ ՖԼՈՐԱՅՈՒՄ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Հողվածում հիմնավորվում է *Alyssum persicum* Boiss. և *A. muelleri* Boiss. et Buhse տեսակների միացման անհրաժեշտությունը *A. persicum* Boiss. անվան տակ, ըստ որում վերջինս (նոր հասկացությունը) առաջին անգամ է բերվում Կովկասի համար:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Аветисян В. Е. Изв. АрмССР (сер. биол.), 16, 6, 1963.
2. Аветисян В. Е. Сем. Brassicaceae в «Флоре Армении», 5, 1966.
3. Бун Н. Н. Род *Alyssum* L. в «Флоре СССР», 8, 1939.
4. Гроссгейн А. А. Флора Кавказа, 4, 1950.
5. Карягин И. И. Род *Alyssum* L. в «Флоре Азербайджана», 4, 1953.
6. Boissier E. Ann. Scienc. Nat. Ser., 2, 17, 1842.
7. Boissier E., et Buhse F. A. Nouv. Mem. Soc. Nat. Mosc., 12, 1860.
8. Rechinger K. H. Flora Iranica, 57, 1968.