Г. А. ПАНОСЯН, Е. Е. ТАМРАЗЯН

К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ГИСТОНА С ГИББЕРЕЛЛИНОМ И АУКСИНОМ

Приводятся результаты экспериментов по влиянию обработки семян кукурузы ВИР-44 различными концентрациями гиббереллина, ауксина, гистона, протаминсульфата и их смесей с целью выяснения взаимодействия между ними.

Гистон и протаминсульфат влияют на физиологические эффекты гиббереллина и ауксина, что выражается в сильной стимуляции скорости и энергии прорастания и эффективности роста корешков и стебельков. Этот стимулирующий эффект нельзя объяснить только действием гистона на проницаемость клеток к гиббереллину или ауксину. Предполагается, что гистон влияет на эффект гиббереллина и ауксина на геномном уровне.

Одним из методов исследования регуляторной функции гистонов является изучение взаимодействия между ними и различного рода регуляторами роста, гормонами, активаторами и т. д. Имеются данные, указывающие на то, что растительные гормоны (ауксины, гиббереллины, цитокинины) регулируют синтез РНК и белков [1, 7, 8, 10—12], а также указывающие на образование комплексов растительных гормонов с гистонами [13, 14].

В наших предыдущих исследованиях было показано, что кратковременная обработка семян различных растений гистоном [5] или зеленым прочным—красителем, связывающимся с эндогенным гистоном [4], приводит к целому ряду функциональных и генетических изменений у развивающихся из этих семян растений.

В данном сообщении приводятся результаты экспериментов по влиянию обработки семян кукурузы ВИР-44 различными концентрациями гиббереллина, ауксина, гистона, протаминсульфата и их смесей с целью выяснения взаимодействия между этими соединениями.

Материал и методика. В экспериментах были использованы нефракционированный гистон эритроцитов кур, выделенный по методу Джонса и др. [9], протаминсульфат отечественного производства, гиббереллин и ауксин.

Воздушно-сухие семена кукурузы линии ВИР-44 обрабатывали водными растворами гистона, протаминсульфата, ауксина, гиббереллина и их смесей в разных концентрациях в течение 24 час. при 20°C рН около 6. Контрольные семена замачивали в тех же условиях в водопроводной воде. После обработки семена промывали проточной водопроводной водой и проращивали в чашках Петри на фильтровальной бумаге. Вели учет скорости прорастания семян, энергии прорастания и скорости роста корешков и стебельков.

Для оценки влияния исследуемых веществ использовали метод определения эффективности прорастания семян и роста растений, описанный нами ранее [3], а также метод определения a_{max} и b_{50} , значение которых понятно из следующего.

Под энергией прорастания обычно понимается выраженное в процентах число проросших семян к общему их количеству на определенный, условно принятый день прорастания [2, 6]. Иногда даже между скоростью и энергией прорастания ставится знак равенства [6]. Подобная оценка всхожести семян кажется не совсем верной, исходя опять-таки из временной ее характеристики. При сравнении действия различных соединений на прорастание семян, как это будет видно из дальнейшего изложения, мы часто сталкиваемся с тем, что данное соединение вначале несколько задерживает прорастание и только затем стимулирует его. При обычной оценке энергии прорастания «эффект начальной задержки» не учитывается, что может оказаться важным для оценки биологической активности исследуемого соединения.

Результаты и обсуждение. Определение $a_{\max}$ и b_{50} становится понятным при рассмотрении рис. 1. На оси абсцисс откладываются дни измерения (на рис.— три дня, обычно от 1 до 5 дней, в зависимости от используемой культуры). За это время контрольные семена прорастают максимально, и последующее

Рис. 1. Результаты гипотетического опыта по влиянию соединений на скорость и энергию прорастания (b_{50} и $a_{\max}$) (объяснение в тексте).

выдерживание в тех же условиях обычно не приводит к увеличению количества проросших семян. На оси ординат приводится отношение количества проросших семян в опытном образце (группе, варианте и т. д.), N к количеству проросших семян в контроле в последний день измерения. $N a_{\max}$ представляет собой ординату данной кривой, когда число проросших семян максимально. Если данное соединение оказывает стимулирующий эффект на прорастание, то $a_{\max} > 1$; если не оказывает никакого действия, то $a_{\max} = 1$ как и в контроле, а если угнетает, то $a_{\max} < 1$.

b_{50} представляет собой отношение времени t_{50} , при котором прорастает половина всех проросших семян опытной группы, к тому же времени t_{50} контрольной (или наоборот). Следовательно, скорость прорас-

тания семян будет определяться временем t_{50} , а сравнительная оценка эффекта данного соединения—величиной b_{50} . При этом, если $b_{50}=1$, то данное соединение не оказывает никакого действия на скорость прорастания. Если b_{50} с положительным знаком (отношение t_{50} опытной группы к t_{50} контрольной), то скорость прорастания увеличивается в b_{50} раз, если с отрицательным (отношение контрольной t_{50} к опытной), то имеется такое же угнетение скорости прорастания. В обоих случаях большее t_{50} делится на меньшее. На рис. 1 приводятся примеры, когда имеется одновременная стимуляция энергии и скорости прорастания (кривая 1; $a_{\max}=1,2$; $t_{50}=0,5$ дням; $b_{50}=2,4$), стимуляция энергии, но уменьшение скорости прорастания (кривая 2; $a_{\max}=1,2$; $t_{50}=2,0$ дней; $b_{50}=-1,67$), угнетение и энергии, и скорости прорастания (кривая 3; $a_{\max}=0,8$; $t_{50}=1,7$ дней; $b_{50}=-1,42$). Контрольные значения равны соответственно 1,0, 1,2 и 1,0. Это позволило нам в наших экспериментах разграничить действие исследованных соединений на скорость прорастания и энергию прорастания.

Как видно из табл. 1, между гиббереллином, ауксином, гистоном и протамином наблюдается взаимовлияние.

Обработка семян гиббереллином и ауксином приводит к изменению скорости и энергии прорастания, которое зависит от концентрации этих веществ. Гиббереллин лишь в самой слабой концентрации стимулирует скорость прорастания при отсутствии стимуляции энергии прорастания. Большие концентрации замедляют прорастание семян. Некоторое увеличение $a_{\max}$ наблюдается при концентрации 0,001%, тогда как 0,01%, гиббереллин несколько тормозит всхожесть семян.

Ауксин во всех случаях либо не действует на всхожесть, либо очень слабо тормозит прорастание. Однако скорость прорастания при малых концентрациях увеличивается, а при концентрации 0,01% наблюдается сильное его замедление ($b_{50}=-1,44$).

При совместном действии гиббереллина и ауксина наблюдается некоторая конкуренция между ними в отношении влияния на скорость прорастания, тогда как это взаимодействие не замечается при определении только энергии прорастания.

Гистон и протаминсульфат в концентрации 0,04% вызывают стимуляцию как энергии, так и скорости прорастания.

Совместное использование гистона и гиббереллина при всех применяемых нами концентрациях последнего приводит к довольно значительному увеличению энергии и скорости прорастания.

Гистон во всех случаях стимулирует энергию прорастания семян при совместном использовании с ауксином.

Протаминсульфат с гиббереллином и ауксином, используемыми в наивысших концентрациях (0,01%), вызывают стимуляцию и скорости, и эффективности прорастания, причем в случае ауксина он довольно значительно стимулирует скорость прорастания ($b_{50}=+1,56$).

Данные таблицы показывают, что в отношении скорости и энергии прорастания между гиббереллином и ауксином, с одной стороны, и

Т а б л и ц а

Влияние различных соединений и их смесей на $A_{\max}$ и b_{50} кукурузы ВПР-44

Соединение, ‰	$A_{\max}$	b_{50}
Гиббереллин 0,0001	1,02	+1,38
Гиббереллин 0,001	1,07	-1,11
Гиббереллин 0,01	0,96	-1,22
Ауксин 0,0001	0,96	+1,06
Ауксин 0,001	0,96	+1,12
Ауксин 0,01	0,68	-1,44
Гистон 0,04	1,08	+1,39
Протаминсульфат 0,04	1,14	+1,09
Гиббереллин + ауксин по 0,0001	0,98	1,00
Гиббереллин + ауксин по 0,001	0,89	-1,28
Гиббереллин + ауксин по 0,01	0,93	-1,67
Гистон 0,04 — гиббереллин 0,0001	1,22	+1,20
Гистон 0,04 + гиббереллин 0,01	1,28	+1,19
Гистон 0,04 + гиббереллин 0,01	1,28	+1,56
Гистон 0,04 + ауксин 0,0001	1,22	+1,56
Гистон 0,04 + ауксин 0,001	1,28	+1,79
Гистон 0,04 + ауксин 0,01	1,11	-1,20
Протаминсульфат 0,04 + гиббереллин 0,01	1,23	+1,47
Протаминсульфат 0,04 + ауксин 0,01	1,08	+1,56

гистоном и протаминсульфатом, с другой, имеется определенное взаимодействие, выражающееся (в зависимости от использованных концентраций) либо в снятии, либо во взаимном торможении или усилении эффектов.

Взаимодействие между гиббереллином, ауксином, гистоном и протаминсульфатом наблюдается также при исследовании их влияния на эффективность роста корешков и стебельков кукурузы ВПР-44.

На рис. 2 представлены результаты подобных экспериментов. Опыты показали, что обработка семян гиббереллином приводит к резкому увеличению эффективности роста стебельков. Стимуляция зависит от концентрации: 0,0001 ‰ гиббереллин стимулирует рост стебельков в 2 раза, тогда как 0,01 ‰ гиббереллин—в 5. Обработка семян гиббереллином приводит также к увеличению эффективности роста корешков в 2,2—2,6 раз. Отсюда видно, что стебельки стимулируются в большей степени, чем корешки.

Ауксин при обработке воздушно-сухих семян резко стимулирует рост стебельков только при относительно высоких концентрациях—0,01 ‰, при меньших концентрациях—0,001 и 0,0001 ‰—оказывает тормозящее действие (тормозит почти в два раза). Ауксин в концентрации 0,01 ‰ стимулирует рост корешков всего на 65%, тогда как 0,001 и 0,0001 ‰ концентрации тормозят рост корешков более, чем в два раза.

Обработка семян смесью растворов гиббереллина и ауксина, применяемых в концентрациях, оказывающих максимальный стимулирующий эффект, оказывает стимулирующее влияние на эффективность роста стебельков, но в гораздо меньшей степени, чем в случае обработки семян каждым из этих веществ в отдельности—всего в 2,35 раза. То есть наблюдается как бы взаимное угнетение эффекта. Меньшие кон-

центрации обоих веществ (0,0001%), по-видимому, не оказывают взаимного тормозящего действия, даже в какой-то мере наблюдается аддитивность эффектов гиббереллина и ауксина. Однако полное взаимное угнетение роста корешков наблюдается при обработке семян смесью гиббереллина и ауксина в обеих концентрациях (0,01 и 0,0001%).

Рис. 2. Эффективность (E_{100} , з. 1) роста стебельков и корешков кукурузы ВИР-44 (% к контролю) при обработке семян различными концентрациями гиббереллина, ауксина, гистона, протаминасульфата и их смесей. 1—контроль, 2—0,01% гиббереллина, 3—0,001% гиббереллина, 4, 5, 6—соответственно 0,1; 0,001; 0,0001% ауксина, 7—0,04% гистона, 8—0,04% протамина, 9—0,01% гибберелл.+0,01% ауксин, 10—0,0001% гибберелл.+0,0001% ауксин, 11—0,04% гистон+0,01% ауксин, 12—0,04% +0,0001% гиббереллина, 13, 14, 15—0,04% гистон+0,01, 0,001, 0,0001% гиббереллина соответственно, 16—0,04% протамина+0,01% гиббереллина, 17—0,04% протамина+0,01% ауксина.

Как видно из рис. 2, гистон и протаминасульфат в концентрации 0,04% приводят к стимуляции роста стебельков и корешков: гистон почти в 2 раза, а протаминасульфат—несколько слабее.

Интересны данные по влиянию на эффективность роста стебельков и корешков обработки семян смесью гистона и гиббереллина. Концентрация гиббереллина 0,01% совместно с гистоном не дает аддитивной реакции по отношению к эффективности роста стебельков, даже наблю-

дается некоторое торможение стимуляции. Однако в отношении эффективности роста корешков наблюдается стимулирующий эффект, превышающий сумму таковых гиббереллина и гистона в отдельных соответствующих концентрациях.

Резко выраженное взаимодействие между эффектами гиббереллина и гистона наблюдается при определении эффективности роста стебельков и корешков в случае с меньшими концентрациями гиббереллина (0,0001%), которые сами по себе дают относительно слабую стимуляцию стебельков и корешков по сравнению с более концентрированными растворами гиббереллина. Смесь гистона и гиббереллина в данной концентрации (0,000%) приводит к резкому стимулирующему эффекту роста стебельков (в 5,3 раза), что намного превышает сумму стимулирующих эффектов гистона и гиббереллина. В большей степени этот эффект выражен в отношении роста корешков, где стимуляция их роста смесью гиббереллина (0,0001%) и гистона достигает 72%.

Сложные взаимодействия наблюдаются при использовании смеси гистона и ауксина в различных концентрационных соотношениях. Если ауксин в 0,01% концентрации вызывает резкую стимуляцию роста стебельков, а более слабые угнетают их рост, то в смеси с гистоном 0,01% концентрация приводит к резкому угнетению скорости роста стебельков, тогда как 0,001% концентрация оказывает такой же резкий стимулирующий эффект, как и 0,01% ауксин без гистона. Создается впечатление, что гистон повышает чувствительность клеток к ауксину, делая 0,01% ауксин очень концентрированным, а 0,001% ауксин достаточно эффективным.

Та же картина наблюдается и в отношении роста корешков, с той лишь разницей, что гистон увеличивает эффективность 0,001% ауксина в отношении роста корешков во много раз больше, чем это делает эффективная концентрация ауксина (0,01%) без гистона. Протаминсульфат так же, как и гистон, резко увеличивает эффект гиббереллина на рост корешков и снимает эффект ауксина.

Таким образом, гистон и протаминсульфат влияют на физиологические эффекты гиббереллина и ауксина. Этот эффект нельзя объяснить действием гистона на проницаемость клеток к гиббереллину или ауксину, т. к. во многих случаях (0,0001% гиббереллин, 0,001% ауксин с гистоном и гиббереллин с протаминсульфатом) полученные эффекты никак не могут являться результатом простого увеличения концентрации этих веществ в клетке за счет увеличения проницаемости. Создается впечатление, что гистон, обладая стимулирующим эффектом, влияет на эффект гиббереллина и ауксина на уровне тех же процессов, на которые действуют первично и ауксин, и гиббереллин, и гистон, т. е. на геномном уровне.

Գ. Հ. ՓԱՆՈՍՅԱՆ, Ե. Ե. ՔԱՄՐԱԶՅԱՆ

ՀԻՔԵՐԵԼԻՆԻ ԵՎ ԱՌԻՔՍԻՆԻ ՓՈԽԱԶԴԻՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻՍՏՈՆԻ ՀԵՏ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Աշխատանքում ներկայացված է հիբերելինի, աուքսինի, հիստոնի, պրոտամինսուլֆատի և նրանց խառնուրդների տարբեր կոնցենտրացիաներով մշակված եգիպտացորեն *ВІР-44*-ի սերմերը՝ նպատակ ունենալով վերհանել նրանց միջև եղած փոխազդեցությունը:

Պարզվել է, որ հիստոնը և պրոտամինսուլֆատը ազդում են հիբերելինի և աուքսինի ֆիզիոլոգիական էֆֆեկտի վրա, որն արտահայտվում է որոշ դեպքերում ինչպես աճման արագության և ծլման էներգիայի խթանումով, այնպես էլ արմատիկների ու ցողունների աճման էֆֆեկտիվությամբ:

Խթանման էֆֆեկտիվությունը չի կարելի բացատրել միայն բջիջներում հիբերելինի և աուքսինի թափանցելիության վրա հիստոնի ունեցած ազդեցությամբ: Ենթադրվում է, որ հիստոնն ազդում է հիբերելինի և աուքսինի էֆֆեկտի վրա գենոմի մակարդակում:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Кулаева О. Н. Усп. совр. биол., 63, 28, 1967.
2. Авчаров К. Е. Физиологические основы всхожести семян, М., 1969.
3. Паносян Г. А., Тамразян Е. Е. Биологический журнал Армении, 24, 12, 1971.
4. Паносян Г. А., Тамразян Е. Е. Биологический журнал Армении, 26, 2, 1973.
5. Паносян Г. А., Тамразян Е. Е. Генетика, 9, 5, 1973.
6. Руге У. Практикум по физиологии роста и развития растений. М., 1955.
7. Хавкин Э. Е. Индуцированный синтез ферментов в условиях роста и морфогенеза растений, М., 1969.
8. Heslop-Harrison. Ann Rev. Plant Physiol, 18, 325, 1967.
9. Johns E. W., Phillips D. M. P., Butler J. A. V. Biochem. J., 80, 189, 1961.
10. Stern W. Ann Rev Plant Physiol. 17, 345, 1966.
11. Van Overbeck J. Science, 152, 721, 1966.
12. Varner J. E. Ann N. Y. Acad. Science 144, 219, 1967.
13. Yamade Y., Yasuda T. BBRC 43, 488, 1971.
14. Yasuda T., Yamade Y. BBRC 40, 649, 1970.