

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 599.728

Г. Д. АВАКЯН

РЕДКИЙ КУЗНЕЧИК—СТЕПНАЯ ДЫБКА
(SAGA PEDO (Pall.) (TETTIGONIODEA) ИЗ АРМЕНИИ

В 1957 г. во время экскурсии на освобожденной от воды территории, на западном берегу озера Севан, нами был пойман редко встречающийся вид кузнечика *Saga pedo* (Pall.)—степная дыбка. Ниже дается описание самки.

Тело крупное, но почти вдвое меньше, чем у седловидной дыбки, узкое, длинное. Голова небольшая, едва шире переднеспинки; лоб сильно наклонный, одноцветно-желтый, посередине пунктированный, с двумя сдавленными глубокими точками. Усики одноцветно-желтые, не достигают вершины брюшка или заднего бедра, усиковые впадины глубокие, соприкасаются друг с другом; первый членик усиков большой и толстый, его длина в 1,5 раза больше ширины; второй членик цилиндрический. Глаза шарообразные, сильно выпуклые. Темя и затылок гладкие, едва выпуклые, одноцветно буровато-желтые. Переднеспинка почти цилиндрическая, посередине и в задней части сверху сильно вдавлена; задний край не отогнут кверху; передний край ровный; боковые лопасти вертикальные, сзади тупоугольные. Надкрылья и крылья почти полностью отсутствуют, едва заметны их следы. Передняя и задняя грудь с острыми шипами. Ноги тонкие и длинные. Все бедра одноцветные, слабо зеленовато-желтые. Передние и средние бедра с 12 большими черными вершинными шипами. Передние голени сверху с небольшим щелевидным тимпанальным органом. Задние бедра: основание их незначительно утолщено, снаружи с 14—15, изнутри с 12 мелкими шипиками, бедра едва достигают вершины брюшка. Брюшко снизу слабо оливкового цвета, все тергиты с темными или мутно-бурыми продольными длинными пятнами. Церки почти цилиндрические с тонкими светлыми вершинами. Генитальная пластинка по заднему краю с широкой округлой выемкой и со слабо изогнутыми боковыми краями (рис. 1). Яйцеклад длиннее переднеспинки в 3 раза и почти прямой, вершинная часть с мелкими темноватыми зубчиками у нашего экземпляра частично повреждена. Длина тела 62, переднеспинки 11, заднего бедра 40, яйцекада 33 мм.

Распространение—Армения, Севанский район, с. Чкаловка, на берегу оз. Севан (на освобожденной от воды территории), 14/IX—57 г. 1♀ (Авакян), на высоте 2000 м над ур. м.

Биология этого вида слабо изучена. По литературным данным, степная дыбка размножается и партеногенетическим путем [4]. Место

обитания дыбки—высокогорная степь со злаковой растительностью, вблизи зерновых культур и пастбищ. Бей-Биенко [1] считает, что этот крупный кузнечик находится под угрозой исчезновения.

Еще в 1909 г. этот вид был приведен Щелкановцевым [5] из Геокчайской степи и из Грузии, но позднее Тарбинский [3], считая эти указания сомнительными, все же включил Грузию и Армению в географическое распространение этого вида.

Савенко [2] также считает сомнительным обитание этого вида в Закавказье, поскольку не указано точное место его нахождения.

Рамме [6] хотя и упоминает о нахождении степной дыбки в Грузии, но судя по всему, также основываясь на литературных данных.

Таким образом, находка степной дыбки в Севанском районе Армении является первым точным указанием на место обитания этого редкого вида не только для Армении, но и для всего Закавказья.




Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 1. *Saga pedo* (Pall.). 1 — правый церк; 2 — генитальная пластинка-оригинал.

Рис. 2. *Saga erhippiger* F.—W. 3 — генитальная пластинка; 4 — правый церк-оригинал.

Степная дыбка очень похожа на седловидную дыбку (*Saga erhippiger* Fisch.—W.), но отличается следующим признаком: у степной дыбки генитальная пластинка по заднему краю с широкой округлой выемкой и со слабо изогнутыми боковыми краями и почти цилиндрическим церком (рис. 1, 2).

Институт зоологии
АН АрмССР

Поступило 28.I 1974 г.

Գ. Դ. ԱՎԱԳՅԱՆ

ՀԱԶՂԱԴԵՊ ՏԱՓԱՍՏԱՆԱՅԻՆ ԾՂՐԻԴ
SAGA PEDO (Pall.) (TETTIGONIODEA) ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Հետաքրքիր և սակավ հանդիպող տափաստանային այս ծղրիդի միակ էգը գտնվել է 1957 թ. Սևանա լճի արևմտյան ափերում, Չկալովկա գյուղի մո-

տակայքում՝ լճի ջրերից աղատված հողային տարածքում: Նա հավանաբար այդտեղ էր եկել մերձակա վայրերի հացազգի բուսականությամբ հարուստ տափաստաններից:

Հստ գրականության մեջ եղած տվյալների, այս տեսակը բազմանում է նաև կուսածնությամբ: Ուստի, նրա արուի հազվագեղ լինելը մասամբ էլ դրանով պետք է բացատրել:

Շշեկանովցի [5], Տարբինսկին [3], Ռամմեն [6], ցույց շտալով նրա գտնվելու կոնկրետ վայրը, այս ծղրիդին համարում են Անդրկովկասից հայտնաբերված: Մինչդեռ Սավենկոն [2], իրավացիորեն, այն կասկածելի է համարում:

Այսպիսով, տափաստանային *Saga pedo* (Pall.) ծղրիդի հայտնաբերումը Սևանա լճի արևմտյան սահմաններում, առաջին անգամ նշվում է ոչ միայն Հայաստանի այլև Անդրկովկասի համար:

Բեյ-Բիենկոն [1] գտնում է, որ այս ծղրիդի գոյությունը վտանգի տակ է և եթե այն չպահպանվի շուտով կանհետանա:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Бей-Биенко Г. Я. Природа. 11, 39, 1972.
2. Савенко Р. Ф. Тр. Зоол. Ин-та АН Груз. ССР, 7, 54, 1947.
3. Тарбинский С. П. Прыгающие прямокрылые насекомые Азербайджанской ССР. 17, 93, М.—Л., 1940.
4. Якобсон Г. Г. и Бианки В. Л. Прямокрылые и ложносетчатокрылые Российской империи и сопредельных стран. Кузнециковые, СПб.: 338, 388, 1905.
5. Шелкановцев Я. П. Раб. Зоол. Лабор. Варш. Унив.: 1—70, 1909.
6. Ramme W. Zur Systematik und Biologie der Orthopteren von Südost Europa und Vorderasien. Mitt. Zool. Berlin (Jahrgang, 1950), 27:185, figs. 35, 39, 1951 (April)