В. О. КАЗАРЯН, В. А. ДАВТЯН, И. А. ГЕВОРКЯН

РЕАКЦИЯ РАСТЕНИЙ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОДКОРМКУ ЖЕЛЕЗОМ КОРНЕЙ И ЛИСТЬЕВ

При определении содержания хлорофилла, прочности его связи с липопротеидным комплексом листа, интенсивности фотосинтеза, синтеза белков и нуклеиновых кислот в корнях и листьях при дополнительной подкормке железом указанных органов в отдельности установлено, что внекорневая подкормка приводит к более интенсивному образованию хлорофилла, чем корневая, однако в последнем случае ослабляется его связь с липопротеидным комплексом листа. Синтез же белков усиливается в листьях при корневом, а в корнях—при внекорневом дополнительном питании железом. В отношении нуклеиновых кислот обнаруживается усиленный синтез в корнях и листьях при корневой подкормке.

Железо имеет исключительно важное значение для общей жизнедеятельности растений, несмотря на весьма малое (примерно 0,02 %) его содержание в последних [2, 3]. Оно входит в состав органо-минеральных компонентов [16, 21], в первую очередь в структуру целого ряда ферментов [20, 28]. Существенным является также его участие в синтезе зеленых пигментов [4], формировании листового аппарата [12, 17] и др. Исключение железа из питательной смеси весьма отрицательно отражается на обмене веществ растений: понижается активность железосодержащих ферментов [20], увеличивается содержание органических кислот [22, 26], нарушается соотношение аминокислот [23], ослабляется накопление сухой массы [5]. Большое значение имеет этот элемент и для предотвращения хлороза [4, 9]. Наряду с этим мы располагаем данными об активном участии корневой системы в образовании зеленых пигментов через синтез Fe-порфиринов [13, 14 и др.].

Эти факты, хотя и расширяют наши знания о многогранности роли железа в жизни растений и о его доступности корням и листьям, тем не менее не дают основания заключить о преимуществе одного из применяемых способов питания (корневого и внекорневого) железом для жизнедеятельности растений. Если учесть высокую способность корней энергично вовлекать в метаболизм поглощенные ими минеральные элементы, в том числе и железо, можно допустить, что многие процессы жизнедеятельности (синтез хлорофилла, белков, нуклеиновых кислот и др.) должны протекать более активно при подаче железа корням. Для установления преимущества того или иного способа подкормки растений железом требуются специальные исследования. При корневой подкормке питательные вещества, поступающие непосредственно в корни, подвергаются обмену с образованием разнообразных метаболитов, необходимых

для роста и нормального функционирования надземных метамеров и самих корней. При внекорневой подкормке листьев существенно затягивается или же исключается подобный корневой метаболизм для отдельных элементов минерального питания, принимающих участие в синтезе жизненно важных структурных элементов живой клетки. Исходя из этого, мы попытались выяснить роль отдельных элементов минерального питания в синтезе хлорофилла, нуклеиновых кислот при их поступлении в растение как через корни, так и листья.

Материал и методика. Объектом исследования служили растения подсолнечника сорта Гигант-549, выращенные в пятилитровых глиняных вазонах с садовой почвой (чернозем, речной песок и перепревший навоз в соотношении 3:1:1).

В фазе вегетации (5—6 пар листьев) растения разделили на три группы (в каждой по 8 растений). Первая—получила одновременно корневую, внекорневую подкормку, вторая—корневую, а третья—внекорневую. Корневую подкормку растения получали поливом 500 мл однонормальной питательной смесью, используемой при гидропонном выращивании растений. Внекорневую—опрыскиванием листьев растений 50 мл 0,25-нормального того же раствора. Каждую из этих групп соответственно разделили на 2 варианта, первый из которых получил полную питательную смесь (ППС); второй—тот же раствор, но без железа.

Для опытных растений внекорневое или корневое питание служило по сути дела дополнительной подкормкой и исключение при этом из питательной смеси железа, разумеется, не могло привести к возникновению хлороза. После пятидневной дополнительной подкормки растений были определены содержание хлорофилла, прочность его связи с липопротеидным комплексом листа, содержание белков и нуклеиновых кислот в корнях и листьях, а также интенсивность фотосинтеза.

Фотосинтез был определен с помощью прибора Чатского и Славика [19] в условиях 6000 люкс освещенности и 25—27° температуры; содержание разных форм хлорофилла—по Осиговой [11], с дальнейшим спектрофотометрированием—по Маккинни [27]; различные формы азота—по Кьельдалю [1]. Фиксация материала для определения нуклеиновых кислот была проведена в холоде. Обработка—по Шмидту и Тангаузеру [30], определение их содержания—по Цаневу и Маркову [18]. Повторность определений трехкратная, полученные данные статистически обработаны.

Результаты и обсуждения. Результаты анализов по определению содержания хлорофилла в листьях опытных растений (табл. 1) наглядно показывают, что наиболее интенсивный синтез зеленых пигментов происходит у растений, получивших одновременно корневое и внекорневое питание. Однако более или менее неожиданным оказалось сравнительно активное образование хлорофилла при внекорневой подкормке, нежели корневой. Это обстоятельство дает основание думать, что внекорневая подкормка способствует непосредственному поступлению железа в листья, и столь же интенсивному включению его в процесс образования хлорофилла, о чем свидетельствуют и другие опыты [11].

Своеобразными оказались данные относительно прочности связи хлорофилла с липопротеидным комплексом у опытных групп растений. Более прочная связь обнаружена при подаче минеральных элементов одновременно через корни и листья. У растений же, получивших ППС через листья, величина этого показателя меньше. Отсюда следует, что внекорневая подкормка способствует как усиленному синтезу хлорофил-

ла, так и упрочению его связи с липопротеидным комплексом. В случаях исключения из раствора железа подавляется не только синтез хлорофилла, но и ослабляется его прочность с липопротеидным комплексом.

Таблица 1
Содержание хлорофилла в листьях подсолнечника в зависимости от способов подкормки питательной смесью и исключения железа

Способ подкормки	Варианты	Хлорофилл, мг на 1 г сухого вещества		Сумма	% слабо-связанного от общего
		прочносвязанный	слабосвязанный		
		M ± m			
Корневая + внекорневая	ППС	10,13 ± 0,81	4,46 ± 0,22	14,59 ± 0,87	30,5
	—Fe	5,25 ± 0,27	4,16 ± 0,18	9,41 ± 0,32	44,2
Корневая	ППС	5,87 ± 0,30	4,15 ± 0,18	10,02 ± 0,15	41,4
	—Fe	4,10 ± 0,14	5,42 ± 0,22	9,52 ± 0,26	56,9
Внекорневая	ППС	8,50 ± 0,33	4,46 ± 0,16	12,96 ± 0,36	34,3
	—Fe	5,45 ± 0,26	4,47 ± 0,19	9,92 ± 0,32	45,0

Казалось бы уменьшение содержания железа, а, следовательно, и хлорофилла должно привести к упрочению связи последнего с белком. Однако, если слабая прочность связи зеленых пигментов с липопротеидным комплексом является показателем энергичного обновления как хлорофилла, так и белков [6], то мы вправе объяснить этот факт именно неудовлетворительной активностью образования хлорофилла и белков. Действительно, недостаток железа, как известно, приводит к ослаблению синтеза Fe-порфириновых соединений и понижению активности гемсодержащих ферментов, участвующих в образовании хлорофилла.

В зависимости от способа подкормки растений или исключения из питательной смеси железа опытные растения существенно различались по интенсивности фотосинтеза (рис.1). Максимальный уровень этого процесса, как мы видим, обнаружен у растений, получивших одновременно корневое и внекорневое питание; минимальный — при исключении железа из питательной смеси. Железо, по данным Чернявиной [20], входит в каталитическую систему фотосинтеза. Подобные ферменты геминной природы ускоряют реакции фотосинтеза [26], поэтому при исключении железа из питательной смеси существенно ослабляется ассимиляция поглощенного углерода.

Приведенные данные иллюстрируют преимущество корневого питания при активации фотосинтеза. Поглощенные корнями многие из минеральных элементов непосредственно включаются в метаболизм, способствуя синтезу разнообразных ферментов, которые, поступая в листья, стимулируют фотосинтез [7].

Имеются данные и о том, что при недостатке железа ослабляется поглощение и накопление азота в растениях [24, 25], синтез белков [27], уменьшается процентное содержание белкового азота [32] и др. Однако

для выявления разницы в азотном обмене корней и листьев в зависимости от способов подкормки (питания) растений минеральными элементами

Рис. Фотосинтетическая активность листьев подсолнечника при исключении или даче питательной подкормки железом. 1—корневая; 2—внекорневая; 3—корневая+внекорневая подкормка.

тами, в частности железом, требовались специальные опыты, результаты которых приведены в табл. 2.

Таблица 2

Содержание азота в корнях подсолнечника при разных способах подкормки питательной смесью и исключении железа, мг/г сухого вещества

Способ подкормки	Варианты	Общий	Белковый	Небелковый	% белкового азота от общего
		M±			
Корневая + внекорневая	ППС	36,2±1,24	34,3±1,18	1,9±0,05	94,7
	-Fe	33,8±0,80	28,9±0,26	4,9±0,22	85,5
Корневая	ППС	32,4±0,81	28,0±0,61	4,4±0,19	86,4
	-Fe	28,8±0,92	21,8±0,73	7,0±0,09	75,6
Внекорневая	ППС	35,9±0,90	32,6±0,38	3,3±0,15	90,6
	-Fe	30,2±0,87	24,4±0,76	5,8±0,11	80,7

По этим данным более заметная разница в отношении содержания белкового азота в зависимости от способов подкормки питательной смесью, а также наличия или отсутствия в ней железа обнаружена в корнях. При этом, если максимальное содержание белкового азота в корнях растений I группы вполне закономерно, то довольно трудно объяснить количественное преобладание указанного азота в корнях растений III группы. Обычно растения при корневом питании получают больше азота, чем при внекорневом, но, видимо, поглощенный листьями азот обеспечивает син-

тез белков, требуемых для жизнедеятельности надземных органов. В результате ослабляется перемещение азотистых соединений из корней и усиливается синтез белков в корневой системе, о чем свидетельствует и больший процент белкового азота от общего (90,6%).

По данному показателю корни растений указанной группы уступают лишь растениям I группы. Таким образом, независимо от способа подкормки растений железом синтез белков в корнях активизируется.

Аналогичная картина обнаружена и в отношении синтеза белков в листьях (табл. 3). Однако в этом случае констатировано более сущест-

Таблица 3

Содержание азота в листьях подсолнечника при различных способах подкормки питательной смесью и исключении железа, мг/г сухого вещества

Способ подкормки	Варианты	Общий	Белковый	Небелковый	% белкового азота от общего
		M ± m			
Корневая + внекорневая	ППС	64,7 ± 2,12	60,9 ± 2,03	3,8 ± 0,12	91,3
	-Fe	46,5 ± 1,64	40,0 ± 1,56	5,5 ± 0,01	86,2
Корневая	ППС	71,1 ± 2,25	60,7 ± 1,87	10,4 ± 0,50	85,3
	-Fe	53,9 ± 1,00	44,0 ± 0,73	9,9 ± 0,39	81,4
Внекорневая	ППС	59,6 ± 1,50	55,2 ± 1,89	4,4 ± 0,19	92,6
	-Fe	53,8 ± 1,50	48,5 ± 1,45	5,3 ± 0,01	90,1

венное расхождение в содержании общего азота в листьях опытных растений.

Наибольшее количество общего азота, как и ожидалось, обнаружено в листьях растений I и II групп. Но процентное соотношение белкового и общего оказалось меньше у растений II группы. Если этот вариант принять за контроль, то растения I варианта оказываются менее активными в отношении поглощения азота, осуществляемого как через корни, так и листья.

Видимо, азот, поступающий через листья, способствует непосредственному синтезу в листьях белков, коррелятивно подавляя дальнейшее поглощение корнями почвенного азота.

Отсутствие железа в питательной смеси всегда приводило к уменьшению содержания общего и белкового азота в листьях, что свидетельствует об участии данного элемента в азотном обмене растений. Этот факт косвенно указывает на роль азота в синтезе нуклеиновых кислот. В этом аспекте мы располагаем данными о том, что Fe участвует в сохранении конфигурации молекул РНК и стабилизации структуры с помощью присоединения их азотных оснований ковалентными связями [20].

Для выявления зависимости синтеза нуклеиновых кислот от подкормки растений железом нами определено их содержание в корнях (табл. 4) и листьях (табл. 5).

Таблица 4

Содержание нуклеиновых кислот в корнях подсолнечника при различных способах подкормки питательной смесью и исключении железа, мг/г сухого вещества

Способ подкормки	Варианты	РНК	ДНК	Общая сумма	% от полной питательной смеси
		M ± m			
Корневая + внекорневая	ППС	26,5 ± 0,86	4,7 ± 0,18	31,2 ± 0,77	100,0
	-Fe	22,9 ± 0,40	4,4 ± 0,21	27,3 ± 0,55	87,5
Корневая	ППС	19,7 ± 0,67	4,3 ± 0,14	24,0 ± 0,53	100,0
	-Fe	17,5 ± 0,27	3,4 ± 0,13	20,0 ± 0,46	87,0
Внекорневая	ППС	18,7 ± 0,68	4,5 ± 0,17	23,2 ± 0,80	100,0
	-Fe	16,4 ± 0,38	3,3 ± 0,15	19,7 ± 0,18	84,9

Таблица 5

Содержание нуклеиновых кислот в листьях подсолнечника при различных способах подкормки питательной смесью и исключении железа, мг/г сухого вещества

Способ подкормки	Варианты	РНК	ДНК	Общая сумма НК	% от полной питательной смеси
		M ± m			
Корневая + внекорневая	ППС	34,9 ± 1,53	8,8 ± 0,29	43,7 ± 1,39	100,0
	-Fe	29,6 ± 0,61	8,6 ± 0,23	38,2 ± 0,65	87,2
Корневая	ППС	29,8 ± 0,72	8,4 ± 0,30	38,2 ± 0,45	100,0
	-Fe	24,4 ± 0,72	7,6 ± 0,20	32,0 ± 0,50	59,9
Внекорневая	ППС	21,6 ± 0,58	7,8 ± 0,39	29,4 ± 0,30	100,5
	-Fe	19,3 ± 0,50	6,0 ± 0,26	25,3 ± 0,29	86,3

Из приведенных данных следует, что роль железа в синтезе дезоксирибонуклеиновой кислоты оказалась гораздо слабее, чем в образовании рибонуклеиновой кислоты. Объясняется этот факт, по всей вероятности, связью синтеза РНК с белковым обменом [8, 15], который, как мы убедились из предыдущих данных, в значительной степени зависит от содержания железа в растениях.

Далее выясняется, что поглощенное листьями железо оказывает определенное действие на процесс синтеза нуклеиновых кислот в корнях. Конечно, трудно допустить, что подобное влияние осуществляется перемещением из листьев железа или Fe-содержащих органических соединений в корни. Вероятнее всего участие железа в синтезе РНК в корнях зависит от мощности листового аппарата, в связи с чем ослабляется поглощение Fe из почвы и подавляется синтез РНК в корнях.

Аналогичная картина выявлена и в отношении содержания нуклеиновых кислот в листьях (табл. 5), с той лишь разницей, что в опытных вариантах расхождение в содержании РНК более существенно.

Наибольшее количество РНК обнаруживается в листьях растений, получавших корневое и внекорневое питание, тогда как при внекорневом — наблюдалось заметное уменьшение ее (на 38,1%).

Таким образом, хотя в процессе эволюции основная функция поглощения минеральных элементов перешла к корневой системе, приобретшей метаболическую функцию, тем не менее это свойство сохранилось и у листьев, притом, более сильно в отношении железа, с чем и связано более усиленное образование хлорофилла при внекорневом питании растений железом, нежели при корневом. Для интенсификации же фотосинтеза (рис. 1), синтеза белков (табл. 3) и нуклеиновых кислот (табл. 5) роль железа, поглощенного корнями, оказалась более значительной. Активное участие Fe в указанных процессах, несомненно, осуществляется через те порфириновые соединения, многие из которых имеют ферментативную природу.

Результаты изложенных опытов интересны также тем, что выявляется существенное изменение метаболической деятельности корней в отношении синтеза белков и нуклеиновых кислот при внекорневом обогащении листьев железом. Этот факт свидетельствует о коррелятивном влиянии листового метаболизма указанных важнейших для жизнедеятельности клеток структурных соединений на аналогичные процессы, осуществляющиеся в корнях.

Институт ботаники АН АрмССР

Поступило 27.VII 1975 г.

Վ. Հ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ, Վ. Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ, Ի. Ա. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՌԵԱԿՑԻԱՆ ԵՐԿԱԹԻ ԱՂԵՐՈՎ ԱՐՄԱՏՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՐԵՎՆԵՐԸ ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՆԴԵՊ

Ա մ փ ո փ ու մ

Արմատները կլանելով հանքային նյութերը ենթարկում են նյութափոխանակության և վերերկրյա օրգաններն են ուղարկում տարբեր ֆիզիոլոգիական ակտիվ նյութեր, որոնք նպաստում են սպիտակուցների, նուկլեինային թթուների, քլորոֆիլի սինթեզին, ինչպես և տերևների կենսագործունեության բոլոր պրոցեսներին: Այս է պատճառը, որ արմատային սննդառությունը ավելի մեծ չափով է նպաստում բույսի կենսագործունեությանը, քան արտաարմատային սննդառությունը: Չնայած դրան, երկաթի աղերով արտաարմատային սնուցման ուղղությամբ կատարած մեր փորձերը ցույց են տվել, որ այս դեպքում ավելի է ուժեղանում ֆոտոսինթեզը և քլորոֆիլի առաջացումը:

Մյուս կողմից՝ պարզվել է, որ սպիտակուցների սինթեզը տերևներում ուժեղանում է արմատային, իսկ արմատներում՝ արտաարմատային սնուցման դեպքում: Նուկլեինային թթուների առաջացումը ինչպես տերևներում, այնպես էլ արմատներում ակտիվանում է, երբ երկաթի աղերը տրվում են վերերկրյա օրգաններով:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Белозерский А. Н., Проскурякова Н. И. Практическое руководство по биохимии растений, М., 1951.

2. *Виноградов А. П.* Труды биохимической лаборатории АН СССР, 3, 1935.
3. *Виноградов А. П.* ДАН СССР, 17, 45, 1938.
4. *Власюк П. А.* Биологические элементы в жизнедеятельности растений, Киев, 1969.
5. *Володарский Н. И.* В кн.: Физиология сельскохозяйственных растений, 11, М., 1971.
6. *Казарян В. О.* Старение высших растений, М., 1969.
7. *Казарян В. О., Акопова Ж. М.* Тр. Бот. ин-та АН АрмССР, 28, 1972.
8. *Конарев В. Г.* Нуклеиновые кислоты и морфогенез растений, М., 1959.
9. *Макарова Г. М.* Химия в сельском хозяйстве, 10, 9 (107), 1972.
10. *Моцков Ф. Ф.* Внекорневая подкормка растений, Киев, 1957.
11. *Осипова О. П.* ДАН СССР, т. 57, вып. 8, 1947.
12. *Прянишников Д. Н.* Избранные сочинения, 3, 1952.
13. *Рубин Б. А., Гермаманова-Гавриленко В.* ДАН СССР, 135, 2, 1960.
14. *Рубин Б. А.* Вестник с/х наук, 6, 1963.
15. *Столетов В. Н., Кокшарова Т. А., Агамалова С. Р., Никитина Е. И., Будницкая Е. Б.* Известия АН СССР, сер. биол. № 2, 1970.
16. *Троцкий Е. П.* Вестник МГУ, 5, 1960.
17. *Украдыга Ф. Я.* Свекловодство, Киев, 1940.
18. *Цанев Р. Г., Марков Г. Г.* Биохимия, 21, 1, 1960.
19. *Чатский И., Славик Б.* Biologia plantarum, 51, 1, 1958.
20. *Чернявина И. А.* Физиология и биохимия элементов. М., 1970.
21. *Школьник М. Я.* Физиология с/х растений, 2, 1967.
22. *Decock P. C., Morrison R. J.* Biochem J. 70, 272, 1958.
23. *Decock P. C., Morrison R. J.* Biochem J. 70, 266, 1958.
24. *Hjin W. S.* Planta Soil., 3, 239, 1951.
25. *Hjin W. S.* Planta Soil., 4, 11, 1952.
26. *Jacson W. A., Coleman N. I.* Planta a. Soil., 11, 1, 1959.
27. *Mackinney G.* Journ. Biol. Chem., 140, 1, 1941.
28. *Nicholas D. J. D.* Ann. Bot., 21, 84, 1957.
29. *Perur N. G., Smith J., Wiebe H. H.* Plant Physiol., 36, 6, 1961.
30. *Schmidt G., Thannhauser S. J.* Biol. Chem., 161, 1, 1945.
31. *Wallace A.* Soil Sci., 80, 101, 1955.
32. *Yacobsen J.* Plant Physiol., 26, 2, 1945.