

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 581.9

В. Е. АВЕТИСЯН, А. М. БАРСЕГЯН

НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ И РЕДКИЕ ВИДЫ ФЛОРЫ
АРМЕНИИ И КАВКАЗА

В статье приводятся некоторые флористические находки — *Mentha arvensis* из Талыша; *Astragalus talyschensis*, *Trifolium resupinatum*, *Tetragonolobus maritimus* из Армении, а также указаны новые места нахождения для 12 редких видов флоры Армении. Гербарные образцы под соответствующими номерами хранятся в Ереване, в гербарии Ботанического института АН АрмССР (ERE).

Mentha arvensis L. Палеарктический вид на Кавказе, известный из Западного Предкавказья, Западного, Центрального и Южного Закавказья. Обнаружен также в Талыше: близ г. Ленкорань, опушка железнякового леса, в окрестностях совхоза им. Кирова, 25.VI.71, собр. А. Барсегян и В. Аветисян, опр. А. Барсегян, № 46301.

Astragalus talyschensis Bunge. Новый вид для флоры Армении, имеющий довольно ограниченный ареал — Сев.-зап. Иран, Армянский Курдистан, Талыш, Зуванд. В Армении обнаружен на восточных отрогах Зангезурского хребта: Сисианский р-он, скалистые склоны по левому борту р. Джамалкаласычай, 2600 м над ур. м., 5.VII.1966, собр. и опр. В. Аветисян, № 101964, 101965.

Trifolium resupinatum L. Вид средиземноморского происхождения. На Кавказе произрастает в Колхиде, Талыше и в Восточном Пред- и Закавказье. Для Армении приводится впервые: Октемберянский р-он, мемориал «Сардарапат», в условиях обильного полива, 20.IX.1972, собр. А. Барсегян и С. Симонян, опр. В. Аветисян, № 98519, 98520. Занесен через культуру. Дичает.

Tetragonolobus maritimus (L.) Roth. (= *T. siliquosus* (L.) Roth. *T. erectus* (L.) Prokh.). Данный вид обнаружен на территории Ереванского ботанического сада: 1.VI.1972, собр. А. Барсегян и В. Аветисян, опр. В. Аветисян, № 101966, 101967. Видимо, занесен недавно, так как в списке дикорастущих травянистых растений сада, составленном А. Барсегяном и А. Абрамяном (Бюлл. Бот. сада АН АрмССР, № 21, 1966), не приводится. Естественный ареал приурочен к Вост., Южн., Зап. Европе, Крыму, Сев. Африке, Турции. На Кавказе известен из Аджарии, близ границы с Турцией.

Astragalus agasii Manden. Своеобразный вид, описанный из Армении с Баргушатского хребта и известный только из классического местообит-

гания. Новое местонахождение: Сисианский р-он, отроги Зангезурского хребта, окр. с. Аревис (Аравус), снежные скалы в верховьях р. Джамалкаласычай, 2900 м над ур. м., 5.VIII.1966, собр. и опр. В. Аветисян, № 84757, 84758.

Thlaspi zangezuricum Tzvel. Входит в состав секции *Apterigium*, на Кавказе представленной двумя эндемичными очень редкими видами — *T. rostratum* N. Busch (окрестности Ордубада) и *T. zangezuricum* (Мегринский р-он, окр. с. Варданадзор; Кафанский р-он, г. Хуступ). Новое местонахождение *T. zangezuricum* приурочено к скалистым склонам Зангезурского хребта: Сисианский р-он, окр. с. Аревис, снежные скалы примерно в 10 км от правого лесистого борта верховья р. Ацаван (Тахтакюрпичай), 2450 м над ур. м., 8.VII.1966, собр. и опр. В. Аветисян, № 82879.

Anchonium elichrysifolium (DC.) Boiss. Переднеазиатский высокогорный петрофит, в Армении известный с Гегамского хребта (г. Спитак) и в Зангезуре с г. Капутджух и г. Хуступ. Новое местонахождение: Сисианский р-он, окр. с. Аревис, снежные скалы примерно в 10 км от правого лесистого борта верховья р. Ацаван (Тахтакюрпичай), 2450 м над ур. м., 8.VII.1966, собр. и опр. В. Аветисян, № 85040.

Arabidopsis pumila (Steph.) N. Busch (= *A. griffithiana* (Boiss.) N. Busch). Одна из форм полиморфного *A. pumila* с вниз отогнутыми цветоножками и повислыми стручками многими авторами расценивается в качестве самостоятельного вида, *Arabidopsis griffithiana*, приуроченного к Ср. Азии и Афганистану. На Кавказе эта форма обнаружена впервые в Армении, на Урцском хребте: Араратский р-он, ур. Асни, г. Кармир-Кар, на скалах, в затененных расщелинах, 9.VI.1963, собр. Э. Габриэлян, опр. В. Аветисян, № 101985, 101986; 22.VI.1967, собр. и опр. В. Аветисян, № 101987—101991.

Lepyrodiclis holosteoides (C. A. Mey.) Fisch. ex C. A. Mey. Новинка для Араратской котловины. В Армении был известен из флористических округов Лори и Севан. Новое местонахождение: Абовянский р-он, окрестности с. Джрвеж, на тенистом склоне под церковью по влажному руслу родничка, в зарослях *Juglans regia*, 29.V.1974, собр. В. Аветисян и П. Гамбарян, опр. В. и Е. Аветисян, № 102006, 102007. Произрастает совместно с *Buchingera axillaris* Boiss et Hohen., для которой данное местонахождение также новое. Это редкое на Кавказе крестоцветное ирано-туранского происхождения ранее было известно лишь из садов Еревана (Норк, ущ. р. Раздан).

Jurinea spectabilis Fisch. et Mey. В Армении известен из Зангезура, Мегри и Гюнейского побережья оз. Севан. Новинка для Ереванской котловины, обнаруженная среди дублетов Киевского ботанического сада, любезно присланных С. С. Харкевичем. Собрана из Араратского р-на: отроги Урцского (Сарайбулагского) хребта, каменистая полупустыня, на щебнистых осыпях у дороги, 22.VIII.1962, собр. и опр. С. С. Харкевич, № 101968. На Кавказе произрастает также в Карабахе и На-

хичеване. Условный эндем, тяготеющий к атропатенскому ареалу. Видимо, должен встречаться и в Северном Иране.

Veronica scutellata L. Довольно редко встречающийся на Кавказе бореальный вид. В Армении до последнего времени был известен только из Калининского района, где был собран А. М. Барсегяном в 1958 г. Новое местонахождение: Азизбековский р-он, с. Сараван, оз. Коша-гель, в прибрежных болотах, 28.VII.1973, собр. и опр. А. Барсегяном, № 100770.

Pimpinella affinis Ledeb. Новое для флоры Араратской котловины растение. Произрастает в Араратском р-оне, пос. Арарат, урочище Тту-джур, на высохших кочках *Juncus acutus*, 30.VII.1966, собр. и опр. А. Барсегян, № 101963, 101962. Во «Флоре Армении» (т. VI) данный вид приводится И. И. Манденовой для двух близких друг к другу флористических округов: Зангезур и Мегри.

Potamogeton perfoliatus L. Это широко распространенное на Кавказе водное растение в Армении до сих пор собиралось только из бассейна оз. Севан. Новые местонахождения: Азизбековский р-он, с. Мартирос, озеро Бироси-гель, 27.VI.1973, № 102013, 102014; Разданский р-он, г. Раздан, городское водохранилище, 25.VI.1969, № 102011, 102012, собр. и опр. А. Барсегян.

Artemisia tournefortiana Reichenb. Редкий для Армении вид, известный из Ереванского флористического округа, из окр. с. Паракар. Однако, видимо, в связи с интенсификацией сельского хозяйства и освоением целинных территорий данный вид исчез из этого пункта. Новое местонахождение: Аван, Норские склоны (I массив), 12.IX.1972, собр. и опр. А. Барсегян, № 100828—100832.

Ranunculus lateriflorus DC. Одно из редких для флоры Кавказа и Армении растений. В гербарии БИН АН АрмССР существует только один экземпляр данного вида, собранный А. А. Гроссгеймом и О. М. Зедельмейер, 3.VIII.1923 из урочища Айрилжа (Мартунинский р-он). Во «Флоре Армении» (т. I) приводится также для Зангезура. Новое местонахождение: Азизбековский р-он, с. Сараван, оз. Коша-гель, на прибрежных болотах, 28.VII.1973, собр. и опр. А. Барсегян, № 100936—100939. Как однолетнее растение *R. lateriflorus* в фитоценологическом отношении никакой роли не играет и легко вытесняется другими многолетними корневищными гигрофитами.

Menyanthes trifoliata L. Это очень интересное в ботанико-географическом отношении болотное растение в Армении было известно из озера Гилли по сборам О. М. Зедельмейер, 1923 г., 1928 г. В настоящее время в связи с иссушением озера данный вид исчез с этой территории и совершенно неожиданно был обнаружен нами в Азизбековском районе: с. Мартирос, мелководное оз. Чимо-гель, 26.VII.1973, собр. и опр. А. Барсегян, № 100621—100625.

Վ. Ն. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, Ա. Մ. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԿՈՎԿԱՍԻ ՖԼՈՐԱՅԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՆՈՐ ԵՎ
ՀԱԶՎԱԴԻԵՊ ՏԵՍԱԿՆԵՐ

Ա մ փ ա փ ո լ մ

Հոդվածում առաջին անգամ բերվում են Թալիշի համար *Mentha arvensis* տեսակը, Հայաստանի համար *Astragalus talyschensis*, *Trifolium resupinatum*, *Tetragonolobus maritimus* տեսակները և 12 տեսակների համար նշվում են նոր բնակավայրեր: