

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 595.782

В. В. ПУСТОВАРОВ

ЛИСТОВЕРТКИ (LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE)
РОДА ACLERIS Нбп. В ЛЕСАХ ЮГО-ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ
АРМЕНИИ

В литературе содержится мало сведений о листовертках рода *Acleris* Нбп. из Армении. Данные об их распространении в пределах СССР также весьма недостаточны. Поэтому считаем целесообразным дать обзор видов этого рода, обнаруженных нами в 1969—71 гг.

Последовательность видов приводится по Ганнеману [4].

Acleris variegana Den. et Schiff. Гусеницы отмечены на *Rosa* L., *Prunus spinosa* L., *Padus avium* L., *Malus* Mill., *Crataegus* L., *Corylus* L., *Ulmus* L., *Vaccinium myrtillus* L. [4, 6].

Гусеницы живут между сплетенными шелковой нитью листьями и в листовых трубках также на *Pirus caucasica* Led. и *Quercus iberica* Stev., возможно также на *Quercus araxina* A. Grossh. и *Quercus macranthera* F. et M.

В наших сборах гусеницы встречались с 4 по 9.VII, окукливались в подстилке и очень редко в местах повреждений с 10 по 24.VII, вылет бабочек отмечался с 26.VII по 4.VIII. Вид развивается в двух поколениях: первое — в мае-июне, второе — в июле-августе. Зимуют яйца, откладываемые на кору ветвей и побегов. Вид встречается вблизи с. Цав Кафанского р-на и на северных склонах гор около Гориса, где бабочки были выловлены сачком 16.VII.1971 г. Известны также из Севана, на листьях кизильника (Арутюнян, 21.VIII.1970 г.).

Распространение: Палеарктика [4]. СССР — Европейская часть (кроме крайнего севера) с Кавказом. Отмечен на Украине [3]. Западная Европа, Малая Азия, Северная Африка [2].

Acleris literana L. Вид развивается в двух поколениях и представлен разными цветовыми формами.

Гусеницы отмечены на *Quercus araxina* A. Grossh. и, возможно встречаются на *Q. iberica* Stev. и *Q. macranthera* F. et M. Живут в листовых трубках. В наших сборах встречались с 26.V по 14.VI, окукливались в земляном коконе с 15 по 26.VI, вылет бабочек наблюдался с 27.VI по 3.VIII.

Бабочки относились к типичной форме *A. literana literana* L. Отмечен вблизи с. Цав Кафанского р-на и в с. Арзакан Разданского р-на 10.VIII 1965 г.

Acleris literana f. *suavana* H.—S. Гусеницы между сплетенными шелковой нитью листьями на *Q. iberica* Stev., возможно, встречаются и на *Q. araxina* A. Grossh. и *Q. macranthera* F. et M. В наших сборах обнаружены на южных склонах гор по дороге в с. Шишкерт Кафанского р-на с 4 по 18.VII, окукливались с 19 по 29.VII в земляном коконе, вылет бабочек отмечался с 30.VII по 5.VIII. По всей вероятности, как и типичная форма *A. literana literana* L., развивается в двух поколениях, первое — в мае-июне, второе — в июле-августе.

Распространение: Палеарктика [4]. СССР — запад и юг Европейской части, Кавказ, Средняя и Южная Европа, Малая Азия [2].

Acleris sparsana Den. et Schiff. Вид развивается на *Acer campestre* L. и *Q. iberica* Stev., возможно, встречается и на *Q. araxina* A. Grossh. и *Q. macranthera* F. et M. Гусеницы живут в листовых трубках и между сплетенными шелковой нитью листьями.

В наших сборах гусеницы встречались с 14.V по 15.VI, окукливались с 16 по 26.VI, вылет бабочек с 7 по 28.VII. Возможно развитие двух поколений. Встречается вблизи сс. Цав и Неркин Анд Кафанского р-на.

Распространение: Европа [4]. СССР — Европейская часть с Кавказом, отмечен на Украине [3].

Acleris cristana Den. Schiff. Гусеницы этого вида обнаружены на дикой яблоне *Malus silvestris* (L.) Mill., между сплетенными шелковой нитью листьями и в листовых трубках, на северных и южных склонах гор вблизи с. Цав Кафанского р-на.

В наших сборах гусеницы встречались с 15.V по 10.VI, окукливались с 11.VI по 15.VII, вылет бабочек с 26.VI по 27.VII.

По всей вероятности, вид развивается в двух поколениях. Бабочки летают до зимы, затем весной и в начале лета [2, 4].

Распространение: Палеарктика [4]. СССР — Европейская часть, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток [2]. В Армении собирался также в Гехарде, с магалебской вишни (Арутюнян, 4.VIII 1970 г.).

Acleris quercinana Z. Гусеницы развиваются на *Q. iberica* Stev. и *Q. araxina* A. Gossh., возможно и на *Q. macranthera* F. et M., между сплетенными шелковой нитью листьями и очень редко в листовых трубках. Собраны в Кафанском р-не — сс. Цав, Срашен, Шикахох. Развиваются в двух поколениях: первое — в апреле-мае-июне, второе — июле-августе. Гусеницы первого поколения встречались в первой половине апреля, окукливались с 4 по 28.V, вылет бабочек отмечался с 17.V по 3.VI. Гусеницы второго поколения встречались во второй половине июля, в наших сборах — с 17.VII по 10.VIII, окукливались с 11.VIII по 24.VIII, вылет наблюдался с 25.VIII по 16.IX.

На светоловушку бабочки выловлены 24—29.V и затем 22.VIII и 9.IX.

Распространение: Европа, Малая Азия [4]. СССР — дубравы степной и лесостепной зоны Европейской части до Прибалтики, Крым, Кавказ [2]. В Армении встречается также в Антаруте Аштаракского р-на на дубе (Аветян, 10.VIII 1964).

Acleris caucasica Fil. Кормовые растения гусениц этого малоиз-

вестного вида ранее оставались неизвестными. Оказалось, что они развиваются на *Acer campestre* L., возможно, и на дубе.

В наших сборах вблизи сс. Цав, Срашен, Шикахох, Кафанского р-на гусеницы встречались с 14.V по 24.VI, окукливались с 29.V по 15.VII, вылет бабочек отмечался с 17.VI по 2.VIII. По всей вероятности, развивается в двух поколениях, первое — в мае-июне и второе — в июле-августе.

Распространение: Грузия—Лагодехи [4].

Встречается локально.

Acleris rhombana Den et Schiff. Бабочки этого вида были выловлены сачком на северных и южных склонах гор вблизи сс. Цав и Неркин Анд Кафанского р-на. Из кормовых растений гусениц, по литературным данным [5], известны: *Prunus* L., *Crataegus* L., *Pyrus* L., *Rosa* L., *Quercus* L., *Corylus* L., *Malus* Mill. Казинян собирал в северной Армении с яблони.

По всей вероятности, в юго-восточных районах Армении вид развивается на дубе или боярышнике.

Распространение: Европа, Малая Азия, Северная Америка [4].

Acleris парaea Meug. Бабочки этого малоизвестного вида выловлены на свет ультрафиолетовой лампы ПРК-4 вблизи с. Неркин Анд Кафанского р-на 18.VI 1971 г.

Бабочки летают в мае-июне-июле, затем осенью. Развивается в двух поколениях. По литературным данным, гусеницы живут на *Salix* sp. (Иран) и на *Populus euphratica* Oliv. (Кара-Кала Туркмения) [2, 4].

Распространение: Европа, Малая Азия, Сирия, Иран [4]. СССР—Крым, Поволжье, Кавказ, Средняя Азия. Кроме того — из Армении: Ереван, ботанический сад, 10.VIII 1969, Арутюнян.

Acleris boscana F. Бабочки вида выловлены на свет лампы ПРК-4, вблизи с. Неркин Анд Кафанского р-на, 18.VI.1972 г. По литературным данным, гусеницы живут на подросте *Ulmus campestre* и других ильмовых [2]. Развиваются в двух поколениях. Первое в мае-июне, второе — в августе [4].

Распространение: Европа, Малая Азия, Центральная Азия [4]. СССР—повсеместно в лесостепной и степной зонах Европейской части, на севере в пределах распространения вяза, Кавказ, Западная Сибирь [2].

Таким образом, в статье впервые дан обзор листоверток рода *Acleris* Hbn. из юго-восточных районов Армении. Некоторые из отмеченных видов являются новыми для фауны Армении. Все они могут вредить древесным породам в лесу при массовом размножении.

Վ. Վ. ՊՈՒՍՏՈՎԱԼՈՎ

ACLERIS Hbn. ՍԵՌԻ ՏԵՐԵՎԱ-ՎՈՂՈՐՆԵՐԸ (LEPIDOPTERA,
TORTRICIDAE) ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՐԱՎ-ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ
ԱՆՏԱՌՆԵՐՈՒՄ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Հոդվածում առաջին անգամ տրվում է Հայաստանի հարավ-արևելյան շրջաններում *Acleris* Hbn. սեռի մասին ակնարկ: Այս սեռի երկու տեսակներ՝ *Acleris sparsana* Den. et Schiff., *A. caucasica* Fll. և համարի հանդիպող *A. iterana* տեսակի *sauvana* H.—S. ձևը նոր են Հայաստանի ֆաունայի համար:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Арутюнян Г. А. Вредная энтомофауна важнейших древесных экзотов в условиях Еревана. Научная сессия по интродукции растений, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина Тез. докл. Ереван, 1969: 89—90.
2. Вредители леса. Справочник, 1. 1955. 1—285.
3. Костюк Ю. А. Автореф. канд. дисс., Киев, 1968.
4. *Hannemann J.* Der Tierwelt Deutschlands. 48 Teil. Kleinschmetterlinge oder Microlepidoptera. Die Wickler (s. str.) (Tortricidae), Berlin Jena, 54—66, 1961.
5. *Razowski J.* World Fauna of the Tortricini (Lepidoptera, Tortricidae). Państwowe wydawnictwo naukowe, Kracow 3—577, 1966.