

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 595.754

Э. Г. АКРАМОВСКАЯ

СЛУЧАЙ МАССОВОГО ЛЕТА КЛОПА, СЕХИРУСА БОЛЬШОГО
(SEHIRUS MORIO L.)

Вид сехирус большой, относящийся к семейству земляных щитников (Cydnidae) отряда полужесткокрылых насекомых (Hemiptera) встречается в СССР на Украине, заходит на север Европейской части СССР до Литовской ССР, Рязанской и Калужской областей, живет также в Казахстане, Сибири, Средней Азии, Закавказье. За пределами СССР широко распространен в Европе, северной Африке, Турции.

Это довольно крупное насекомое длиной в 9—11 мм¹. Кормовыми растениями его являются дикорастущие травы из семейства бурачниковых, в частности воловик и румянка.

В Армении, в Кафанском районе, в селах Неркин Анд, Шикаох, Цав в начале июля 1973 г. в течение нескольких дней наблюдался массовый лет этого клопа — явление, которое в литературе для этого вида отмечено еще не было. В селе Неркин Анд с 5 по 8 июля клопы этого вида в массовом количестве летели в темноте на электрический свет, залетая в помещения—люди вынуждены были тушить свет. Тогда клопы с шумом садились на крыши и землю. Утром, не причинив вреда культурам, они снялись с места и улетели. К вечеру то же явление повторилось. Следующим утром они вновь покинули село. Так продолжалось 4 дня.

В селе Шикаох такое явление продолжалось с 7 по 10 июля, а в с. Цав с 8 по 11 июля. Вероятно это была миграция.

Никаким сельскохозяйственным культурам в Кафанском районе они вреда не причинили. Из соседних районов тревожных сигналов от агрономов и населения не поступало.

Мы попали в Неркин Анд 18/VII-1973 г. и застали там уже единичные экземпляры *Sehirus morio* L. в домах. Сведения о массовом лете клопов поступили к нам от агрономов и населения. По их словам, такой же массовый лет наблюдался в 1972 г.

В июле 1974 г. мы специально для наблюдения этого явления выехали в Кафанский район, но массового лета этого вида в тот год отмечено не было.

¹ В. Г. Пучков, Фауна Украины. Том 21, вып. I, Київ, 1961; В. Г. Пучков, Щитинки Средней Азии. Фрунзе, 1965 г.

Вид сехирус большой по своим экологическим особенностям, кормовым растениям и биотопам не отличается от сехируса малого (*Sehirus luctuosus* Mls. R.), массовое отрождение личинок которого наблюдалось на Украине в мае и массовое окрыление—в середине июля. Однако сехирус малый был отмечен в Германии как вредитель зерновых культур и картофеля, в Чехословакии питался ягодами земляники и малины, а в СССР в Полтавской области отмечался лишь как незначительный вредитель свеклы.

В литературе сведений о вредной деятельности сехируса большого нет.

Институт зоологии
АН АрмССР

Поступило 22.XII 1974 г.

Է. Գ. ԱՎՐԱՄՈՎՍԿԱՅԱ

ՄԵԾ ՍԵՆԻՐՈՒՍ (SEHIRUS MORIO L.) ՄԼՈՒԿԻ ՄԱՍՍԱՅԱԿԱՆ
ԹՈՒՉՔԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ու մ

1973 թ. հուլիսի սկզբներին Ղափանի շրջանի ներքին Հանդ (5—8), Մավ (8—11) և Շիկահող (7—10) գյուղերում նկատվել է մլուկների *Sehirus morio* L. տեսակի մասսայական թռիչք: Մլուկները մեծ քանակով թռչում էին դեպի լույսը, անհանգստությամբ պատճառելով տեղի բնակիչներին, որոնք ստիպված էին լույսերը հանգցնել: Միջատները մթնոթյան մեջ կարկուտի նման աղմկալից թափվում էին տների կտուրների և գետնի վրա: Առավոտյան նրանք թռել էին դյուղերից դուրս: Նման երևույթ կրկնվել է 4 օր: Մլուկների այսպիսի վարք դիտվել է նաև 1972 թ. հուլիսին, իսկ 1974 թ. չի դիտվել:

Sehirus morio L. միջատը որպես վնասատու չի նշված և մասսայական թռիչքի ժամանակ գյուղատնտեսական կուլտուրաներին որևէ վնաս չի պատճառել: Նման թռիչք արձանագրվել է Ուկրաինայում, միջատաբան Վ. Գ. Պուշկովի (1961) կողմից, մեր մլուկին նման *S. luctuosus* Mls. R. տեսակի մոտ: