

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 582.6

М. Г. ГРИГОРЯН

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ ИЗ ХОСРОВСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА

При изучении флоры и растительности Хосровского заповедника (АрмССР) нами собран ряд редких и новых для Армении и СССР видов, перечень которых приводится ниже. Гербарные экземпляры хранятся в БИН АН АрмССР под соответствующими номерами и в гербарии Хосровского заповедника.

Micromeria marifolia (Willd.) Benth. Новый род для флоры Кавказа и новый вид для флоры СССР. Географический тип — малоазийский. Данный вид А. А. Гроссгейм приводит для Артвинского и Ольтинского округов Турции как *M. serpyllifolia* (Bieb.) Boiss. Во «Флоре СССР» (том XXI) А. Г. Борисова приводит *M. serpyllifolia* как эндемик Крыма, приурочивая произрастание *M. marifolia* лишь к северо-востоку Турции и считая возможным его нахождение в южном Закавказье. *M. marifolia* нами собрана на территории Хосровского заповедника, в Армении: Араратский р-он, ущелье р. Хосров, между развалинами сел Агаси-беглу и Хосров, 20.X.1969 г., № 102255.

Saxifraga tridactylites L. Новый вид для Гегамского флористического округа. Географический тип — европейско-средиземноморский. Собран в ущелье р. Хосров, на сухих каменистых местах, в можжевелевом редколесье, на высоте 1750 м над ур. м., 23.V.1967 г., № 102258. Определен нами. Эта редкая камнеломка была собрана в пределах АрмССР Я. И. Мулкиджаняном и В. Е. Аветисян на Зодском перевале, в верхнем горном поясе, в 1956 г., и Я. И. Мулкиджаняном на г. Чкнавор (Мегринский хребет), на высоте 3000 м над ур. м., в 1959 г., а также по ущелью р. Памбак, между ст. Спитак и Налбанд, на скалах, в 1962 г.

Paliurus spina-christi Mill. Новое местонахождение для центральной Армении. Географический тип — средиземноморский. Собран и определен нами: Арташатский район, ущелье р. Милли, между развалинами сел Елиджа и Гиланлар, южный эродированный склон, 1700 м над ур. м., 15.X.1972 г., № 102261. Ближайшие местонахождения: окрестности сел Бюракан (Аштаракский район) и Арени (Азизбековский район).

Astragalus grammocalyx Boiss. et Hohen. Редкий вид для флоры Армении. Географический тип — атропатенский. Собран и определен нами: Араратский район, по левому борту ущелья р. Хосров, западный сухой каменистый и щебнистый склон, можжевелевое редколесье,

1650 м над ур. м., 20/VI-1966 г., № 102257. Единственное местонахождение в пределах заповедника и второе в Армении. Ранее был собран Я. И. Мулкиджаняном и В. А. Манакяном в Абовянском районе между селами Зар и Кянкан, на северном склоне, на высоте около 2000 м над ур. м., 14.VI.1950 г. Этот оригинальный северо-иранский астрагал в пределах СССР известен лишь из Нахичеванской АССР (между селами Азнабюрт и Бузгов).

Rosa vanhaerciana Cray. (= *R. atropatana* Sosn.). Редкий для флоры Армении вид. Географический тип — атропатенский. В Армении был известен только из Мегринского, Агинского и Мартунинского районов. Найден нами также в Араратском районе, в Хосровском заповеднике: ущелье р. Хосров, окрестности урочища «Дорах», на сухих местах, на высоте 2250 м над ур. м., 15.VII.1971 г., № 102253. На Кавказе произрастает в Нах. АССР.

Rosa zangezura P. Jarosch. Второе местонахождение в Армении. Географический тип — атропатенский. Эндемик. В Армении был известен только из Алекс-ванка, близ Гориса, откуда и описан П. Д. Ярошенко. Собран нами, определен И. П. Манденовой: Араратский район, левый борт р. Хосров, фазанарий, можжевельниковое редколесье, 1700 м над ур. м., 15.VI.1962 г., № 102254.

Rosa sosnovskyi Chrsan. Редкий для флоры Армении вид. Географический тип — закавказский. Произрастает в Араратском районе, по левому борту ущелья р. Хосров, на опушке дубового леса, 1700 м над ур. м., собран нами 29.IX.1965 г., № 102252. Определен И. П. Манденовой. Относится к числу лиановидных роз. В Армении известен из окрестностей курорта Джермук и из Иджеванского района (с. Лали-Гех). Описан из Кубинского района Азербайджанской ССР.

Populus euphratica Oliv. Новый вид для флоры Араратской котловины. Географический тип — переднеазийский. Собран и определен нами: Араратский район, ущелье р. Азат, у подножья западного склона горы Еранос, на постоянно увлажненных местах, 1150 м над ур. м., 1.VI.1971 г., № 102260. В Армении был известен только из Мегринского района (Карчеван, Мегри, Шванидзор, Ньюади). На Кавказе произрастает также по берегу р. Аракс и его притокам в пределах Нах. АССР и в Восточном Закавказье.

Cicer anatolicum Alef. Редкий для флоры Армении вид. Географический тип — малоазийский. В пределах заповедника впервые нами собран в Арташатском районе, в ущелье р. Ухтуакунк (Давагези), к северо-востоку от с. Каладиби, на каменистых осыпях, на высоте 1750 м над ур. м., 5.VII.1974 г., № 102259. Это растение на Кавказе произрастает в Нах. АССР (Урмис, Кю-кю), а также в Мегринском (Вагравар, Бугакяр) и Ехегнадзорском (верховья р. Арпа) районах Армении.

Adiantum capillis-veneris L. Этот редкий высокодекоративный папоротник из Ереванского флористического округа ранее не был известен. Собран и определен нами: Араратский район, Урцский хр., урочище «Ураноц», постоянно увлажняемые трещины скал, 20.IV.1962 г.,

№ 102256. В Армении известен из окрестностей Джермука, с. Татев (Зангезур) и из ущелья р. Хосров.

Институт ботаники
АН АрмССР

Поступило 25.XI 1974 г.

Մ. Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՖԼՈՐԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԽՈՍՐՈՎԻ ԱՐԳԵԼԱՆՈՑԻՑ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Խոսրովի արգելանոցի (ՀՍՍՀ) բուսաբանության ուսումնասիրման ընթացքում հավաքվել են Հայաստանի և ՍՍՀՄ-ի համար մի շարք հազվագյուտ և նոր տեսակներ, որոնց թվարկումը բերվում է ստորև՝

Micromeria marifolia (Willd.) Benth., *Saxifraga tridactylites* L., *Paliurus spina-christi* Mill., *Astragalus grammocalyx* Boiss. et Hohen., *Rosa vanhaerciana* Cry. (= *R. atropatana* Sosn.), *R. zangezura* P. Jarosch., *R. sosnovskyi* Chrsan., *Populus euphratica* Oliv., *Cicer anatolicum* Alef., *Adiantum capillis-veneris* L.