В. И. ХАЧОЯН, Л. А. АРАКЕЛЯН

РОЛЬ СЕЛЕЗЕНКИ ПРИ КРЫСИНОМ ТРИПАНОСОМОЗЕ

В работе приводятся результаты опытов по изучению некоторых особенностей экспериментального трипаносомоза у спленэктомированных белых крыс. Показано, что при этом у молодых особей происходит бурное размножение *T. lewisi*. Инвазия протекает острее и заканчивается гибелью животных на 8-й—10-й день, а у взрослых белых крыс возрастная резистентность не нарушается.

Селезенка, представляющая собой большую массу ретикулоэндотелиальной ткани, безусловно, играет значительную роль в системе неспецифической защиты организма от паразитарных заболеваний. Однако имеющиеся в литературе данные весьма противоречивы. По одним сообщениям, удаление этого органа приводит к усилению тяжести заболевания или длительности его протекания, а по другим — эти явления незначительны [3]. Отсутствуют также сведения о течении трипаносомоза у спленэктомированных животных различных возрастных групп. Все это послужило основанием для экспериментального изучения роли селезенки в крысином трипаносомозе.

Материал и методика. В опытах использовались беспородные белые крысы разного пола и возраста. Подопытные животные были разбиты на две основные группы: молодые, 3—4-месячные, восприимчивые к трипаносомозу (*Trypanosoma lewisi*), и взрослые, старше 7 месяцев, резистентные к заражению [2]. Воспроизведение трипаносомоза у них осуществлялось *T. lewisi*, выделенным нами у серых крыс г. Еревана. Для инокуляции из крови крыс-носителей трипаносомом готовилась взвесь на физиологическом растворе (рН 7.2), содержащая трипомастиготные формы паразита в количестве 10^4 в 1 мл. Эта взвесь вводилась животным внутрибрюшинно, по 0,5 мл каждому. В дальнейшем ежедневно из надреза кончика хвоста зараженных крыс бралась капля крови, которая микроскопировалась световым микроскопом (окуляр 7*, объектив 40*). Подсчет абсолютного количества трипаносом в 1 мл крови производился по методу Петана [5]. Мазки из периферической крови готовились обычным способом и после фиксации в смеси Никифорова окрашивались по Романовскому-Гимза. Биометрия трипаносомом производилась в окрашенных мазках. Полученные результаты подвергались статистической обработке.

Селезенка у крыс удалялась хирургическим путем после нембуталового наркоза (3%—0,15 мг на 100 г веса). Из удаленных селезенок готовился гомогенат растиранием ткани органа в ступке.

Результаты и обсуждение. Для выяснения возможной зависимости возрастной невосприимчивости от наличия селезенки десять взрослых крыс спленэктомировали, а пять оставили в качестве контрольных. После заживления операционной раны всех их инфицировали *T. lewisi*. В дальнейшем все они содержались в одинаковых условиях. Последующее микроскопирование сдавленных капель, приготовленных из периферии

ческой крови крыс контрольной и опытной группы, показало отсутствие трипаносом в их крови. Попытки заразить кровью этих крыс молодых, восприимчивых животных оказались безуспешными. Таким образом, спленэктомия не понижает возрастной резистентности крыс к трипаносомозу.

Для экспериментов, преследующих цель выяснить зависимость особенностей течения трипаносомоза от наличия или отсутствия селезенки, были взяты молодые крысы, которых разделили на четыре группы по 10 голов в каждой. Одна из них служила контрольной, а у крыс остальных трех групп была удалена селезенка; при этом у крыс одной группы 1/3 отделенной селезенки оставлялась в брюшной полости. Затем все животные подвергались инфицированию *T. lewisi*.

Учитывая тот факт, что молодые особи вообще восприимчивы к трипаносомозу, критерием для суждения об особенностях течения инвазии у них были приняты сроки появления паразитов в периферической крови после инокуляции, тяжесть течения инвазии и гибель животных, а также динамика накопления паразитов в организме и их биометрические характеристики.

Трипаносомоз у молодых крыс контрольной группы протекал как обычно. Паразиты начали обнаруживаться на 6-е сутки, к 11—12-му дню их количество доходило до 10^7 в 1 мл крови и держалось на этом уровне с небольшими колебаниями с последующим спадом.

У спленэктомированных молодых крыс паразиты начали обнаруживаться на 4-й день, т. е. на 2 дня раньше, чем обычно. Их число росло более стремительно и доходило до 10^9 в 1 мл крови, превышая обычный уровень на два порядка (рис. 1). В периферической крови этих живот-

Рис. Динамика накопления трипаносом у спленэктомированных крыс. а—спленэктомия; — б—спленэктомия+ткань селезенки; — в—спленэктомия+экстракт селезенки; — г—контроль; + гибель крыс; → введение экстракта селезенки.

ных наблюдался большой полиморфизм трипаносом (объем, расположение органелл и т. д.). Кроме того, наряду со зрелыми формами, отмеча-

лись многочисленные делящиеся паразиты, что обычно наблюдается очень редко и только в ранний период инвазионного процесса.

Спленэктомированные животные погибали на 8-е—10-е сутки после инфицирования, но в одной группе гибель животных была предотвращена внутрибрюшинной инъекцией 1 мл гомогената селезенки на 6-й день инвазии. Не погибали также животные с имплантатом селезенки. Течение трипаносомоза у них напоминало аналогичный процесс у спленэктомированных крыс, получивших инъекцию гомогената селезенки.

Особый интерес представляет сравнение результатов биометрий. Из этих данных видно, что в крови спленэктомированных крыс появляются отдельные гигантские особи, ширина и длина которых в два раза превышает средние параметры трипаносом у обычных крыс. У крыс, получивших гомогенат или имеющих имплантат селезенки, эти изменения в дальнейшем сглаживаются. Паразиты становятся более мономорфными, что хорошо иллюстрируется данными табл. 1, в которой приводятся биометрические характеристики трипаносом на 7-й и 17-й дни инвазии.

Был проведен также опыт с удалением селезенки при развитии инвазионном процессе. Биометрические параметры трипаносом в этом случае не претерпели заметных изменений.

Таким образом, удаление селезенки у взрослых белых крыс не повышает их восприимчивости к трипаносомозу, тогда как у молодых крыс эта операция приводит к значительно более острому протеканию инвазии, завершающейся, как правило, гибелью на 8-й—10-й день. Однократное парэнтеральное введение гомогената селезенки, а также наличие частиц селезенки в брюшной полости животных предотвращает их гибель.

Таблица
Биометрические данные *T. lewisi* у спленэктомированных крыс на 7-й и 17-й дни после заражения, мк

Сроки заражения	Измеряемая величина	Группы крыс (по 10 голов) и размеры трипаносом				
		спленэктомия	спленэктомия + экстракт селезенки	спленэктомия + ткань селезенки	контроль	
7-й день	Длина	И	24,2—40,7	24,0—33,0	22,0—41,8	23,1—30,8
		М	31,5±0,3	30,2±0,39	31,7±0,5	27,5±0,3
	Ширина	И	1,65—5,5	1,65—3,3	2,2—9,9	1,1—2,75
		М	3±0,03	1,8±0,1	6,6±0,5	1,8±0,03
17-й день	Длина	И	—	23,1—29,7	24,2—30,8	19,8—29,7
		М	—	27,1±0,2	27,3±0,3	24,6±0,3
	Ширина	И	—	1,65—2,2	1,1—2,75	1,65—2,2
		М	—	1,6±0,01	2,0±0,01	2,0±0,03

Так как опыты показали, что возрастная невосприимчивость не изменяется вследствие спленэктомии, можно считать неверным существующее в литературе мнение, согласно которому все крысы с удаленной селезенкой становятся восприимчивыми к *T. lewisi*, и, как правило, большинство их погибает при этом [1]. По-видимому, селезенка или ее

ткань у восприимчивых молодых крыс ограничивают развитие и размножение *T. lewisi*, чем и помогают организму преодолеть кризис, являющийся следствием инвазии. Однако в дальнейшем в защитный процесс включаются другие механизмы иммунитета. Таким образом, влияние селезенки в некотором смысле напоминает действие, приписываемое особым антителам—абластинам [4].

Институт зоологии АН АрмССР

Поступило 11.11 1975 г.

Վ. Ն. ԽԱՉՈՅԱՆ, Լ. Ա. ԱՐԱԿԵԼՅԱՆ

ՓԱՅՄԱՂԻ ԳԵՐԸ ԱՌՆԵՏԱՅԻՆ ՏՐԻՊԱՆՈՍՈՄՈՉԻ ԺԱՄՁԱՆԱԿ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Փորձառական ճանապարհով ուսումնասիրվել են առնետային տրիպանոսոմոզի առանձնահատկությունները փայծաղը հեռացրած առնետների մոտ: Պարզվել է, որ հասունների փայծաղի բացակայությունը չի անդրադառնում նրանց անընկալունակության վրա: Այնինչ մինչև 5—6 ամսական կենդանիների մոտ կրճատվում է վարակման գաղտնի շրջանը, վարակը ընթանում է անհամեմատ սուր և վարակումից ութ օր հետո վերջանում է կենդանու անկումով: Նրանց պերիֆերիկ արյան մեջ նկատվում է պարազիտների աճ և առանձին խոշոր պարազիտների առկայությունը, որոնք բացառված են տրիպանոսոմոզի նորմալ ընթացքի դեպքում: Փայծաղի հոմոգենատի ներարկումը այդ առնետներին, կասեցնում է վերջիններիս անկումը և պարազիտների բազմացումը նրանց պերիֆերիկ արյան մեջ:

ЛИТЕРАТУРА

1. Орлов Н. П. Паразитические простейшие Казахстана, Алма-Ата, 1948.
2. Хачоян В. И. Биологический журнал Армении, 24, 10, 1971.
3. Culbertson J. T. Immunity against animal parasites, Columbia, 1941.
4. D'Alessandro P. Nonpathogenic trypanosomes of rodents. In Immunity to parasitic animals, V. 2, 691—739, 1970.
5. Petana W. B. Ann. Trop. Med. Parasit, 58, 4, 467—472, 1964.