Г. М. ПАРОНИКЯН, М. А. КАЛДРИКЯН, Г. А. ДАРБИНЯН, Э. А. ТУМАСЯН

МУТАГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ N'-ЗАМЕЩЕННЫХ ДИГИДРОУРАЦИЛОВ И ТИОУРАЦИЛОВ

Приводятся результаты изучения мутагенного действия 22 новых производных дигидроурацилов и тиоурацилов, синтезированных в качестве лечебных препаратов.

Среди исследованных веществ обнаружены соединения, обладающие заметным мутагенным действием. Выявлена зависимость между структурой соединений и их мутагенной активностью.

Производные оснований и нуклеозидов изучены на различных объектах, и у многих из них выявлено четкое мутагенное действие. Среди этих соединений широко известны 5-бромурацил, 5-фторурацил, 5-аминопурин, 2,6-диаминопурин и др. [1—5]. Исходя из этого, а также из того, что некоторые дигидропиримидины подавляют рост опухолей у животных [6, 7], мы обратились к изучению мутагенного действия производных дигидропиримидинов—N'-замещенных дигидроурацила и тиоурацила, синтезированных в нашем институте [8], имея также цель выявить связь между строением соединений и их генетическим действием.

Материал и методика. Исследуемые соединения синтезированы в виде четырех гомологических рядов. К первому ряду относится N'-(4-алкоксибензил)-5,6-дигидроурацил, ко второму—N'-(4-алкоксибензил)-5,6-дигидротхиоурацил, к третьему—N'-(4-алкоксибензил)-5-метил-5,6-дигидроурацил, к четвертому—N'-(4-алкоксибензил)-5-метил-5,6-дигидротхиоурацил. Общая формула и значение радикалов приведены в таблицах.

Генетическая активность новых соединений сравнивалась с урацилом и 5-бромурацилом, исследованными в идентичных условиях. Объектом для изучения служили биохимические мутанты: *Escherichia coli* P-678, нуждающийся в треонине, лейцине и витамине B₁ и *Aspergillus nidulans* 222, нуждающийся в лизине и чувствительный к стрептомицину. Активность мутагенов определялась по частоте встречаемости обратных мутаций от аутокотрофного к прототрофному состоянию по локусам, ответственному за синтез треонина и лизина. Методика изучения мутагенной активности соединений описана ранее [9].

Результаты и обсуждение. Результаты изучения летального и мутагенного действия N'-(4-алкоксибензил)-5,6-дигидроурацила и N'-(4-алкоксибензил)-5,6-дигидротхиоурацила приведены в табл. 1. Как видно из этой таблицы, соединения первого гомологического ряда на треониновый локус кишечной палочки оказывают заметное мутагенное действие, начиная с пропокси-радикала. В этом ряду более выраженное действие оказывает соединение с изобутокси-радикалом (№ 6), индуцирующее мутации с частотой в 400 раз больше контроля (спонтанной

Таблица 1

Мутагенное и летальное действие N'-(4-алкоксибензил)-5,6-дигидроурацила и N'-(4-алкоксибензил)-5,6-дигидротиоурацила

Гомологический ряд	п/п №			Доза		E. coli P-678 (thr ⁻ → thr ⁺)				Доза		Act. rimosus 222 (lys ⁻ → lys ⁺)			
		R	X	молярность	время, мин	выживаемость, %	частота встречаемости ревертантов на 10 ⁶ выживших клеток		молярность	время, час	выживаемость, %	частота встречаемости ревертантов на 10 ⁵ выживших спор			
							число	% к контролю				число	% к контролю		
1	1	CH ₃ O	0	0,1	20	90	8	100	0,2	4	46	14	280		
	2	C ₂ H ₅ O	0	0,1	30	100	9	110	0,2	4	40	8	160		
	3	C ₃ H ₇ O	0	0,1	120	1	264	3300	0,2	4	44	18	360		
	4	н-30-C ₃ H ₇ O	0	0,01	60	0,5	600	7500	0,2	4	11	38	750		
	5	C ₄ H ₉ O	0	0,05	60	0,3	666	8330	0,2	24	2	165	3300		
	6	н-30-C ₄ H ₉ O	0	0,1	90	0,1	3200	40000	0,2	24	4	76	1500		
2	7	CH ₃ O	S	0,2	120	11	24	300	0,2	4	57	6	120		
	8	C ₂ H ₅ O	S	0,1	120	17	24	300	0,2	4	83	5	100		
	9	C ₃ H ₇ O	S	0,1	120	1,1	388	4850	0,2	4	18	31	620		
	10	н-30-C ₃ H ₇ O	S	0,1	40	0,5	912	11400	0,2	4	30	20	400		
	11	C ₄ H ₉ O	S	0,025	60	0,05	4568	57100	0,2	4	0,32	1920	38400		
	12	н-30-C ₄ H ₉ O	S	0,05	120	0,2	4000	50000	0,2	24	1,5	165	3300		

мутации). Эти же соединения, изученные в отношении лизинового локуса актиномицетов, оказались менее активными.

Соединения второго гомологического ряда в отношении треонинового локуса оказались активнее соединений первого ряда. И в этом ряду соединений активность возрастает начиная с пропокси-радикала. Наиболее активным среди них оказался препарат с бутокси-радикалом (№ 11). Последний индуцировал ревертанты в 571 раз больше контроля. Исследуемый ряд в отношении лизинового локуса, как и предыдущий ряд, оказался менее активным, за исключением препарата № 11, который индуцировал обратные мутации в 384 раза больше контроля.

В табл. 2 представлены данные о летальном и мутагенном действии соединений третьего и четвертого гомологических рядов. Соединения третьего ряда, как видно из табл. 2, в целом обладают мутагенным действием только в отношении треонинового локуса. Заметное возрастание активности наблюдается также с пропокси-радикала. Соединения № 15, 16 и 17 оказывают примерно одинаковое действие и индуцируют мутации в среднем в 250 раз больше контроля.

Исследуемые соединения четвертого гомологического ряда оказывают заметное мутагенное действие и по генетическому действию превосходят соединения третьего ряда. Наиболее активными в этом ряду оказались соединения с этокси- (№ 19) и бутокси- (№ 22) радикалами, они индуцировали реверсии соответственно в 937 и 476 раз больше контроля. В то же время соединения этого ряда оказывают слабое действие на лизиновый локус актиномицетов.

Рис Летальное действие и частота встречаемости ревертантов у биохимических мутантов *E. coli* P-678 (а) и *A. rimosus* 222 (б) при обработке N' -(4-бутоксибензил)-5,6-дигидроптиурацилом (1) и N' -(4-этоксibenзил)-5-метил-5,6-дигидроптиурацилом (2).

Таблица 2

Мутагенное и летальное действие N'-(4-алкоксибензил)-5-метил-5,6-дигидроурацила и N'-(4-алкоксибензил)-5-метил-5,6-дигидроурацила

Гомеологический ряд	№ п/п			Доза		E. coli P-678 (thr ⁻ → thr ⁺)			Доза		Act. rimosus 222 (lys ⁻ → lys ⁺)			
		R	X	молярность	время, мин	выживаемость, %	частота встречаемости ревертантов на 10 ⁸ выживших клеток		молярность	время, час	выживаемость, %	частота встречаемости ревертантов на 10 ⁵ выживших спор		
							число	% к контролю				число	% к контролю	
3	13	CH ₃ O	0	0,2	180	2	312	3900	0,1	4	100	5	100	
	14	C ₂ H ₅ O	0	0,1	180	1,5	312	4150	0,2	4	70	5,6	110	
	15	C ₃ H ₇ O	0	0,025	60	0,05	2128	26600	0,2	4	73	5	100	
	16	изо-C ₃ H ₇ O	0	0,1	120	0,2	2000	25000	0,2	4	50	7,5	150	
	17	C ₄ H ₉ O	0	0,025	40	0,3	1704	21300	0,2	4	2,5	200	4000	
4	18	CH ₃ O	S	0,05	80	0,8	832	10460	0,2	4	52	7,5	150	
	19	C ₂ H ₅ O	S	0,025	180	0,04	7500	93700	0,2	24	0,5	265	5300	
	20	C ₃ H ₇ O	S	0,025	120	0,1	3332	41650	0,2	4	18	25	500	
	21	изо-C ₃ H ₇ O	S	0,05	60	0,2	2208	27600	0,2	4	20	25	500	
	22	C ₄ H ₉ O	S	0,025	180	0,1	3808	47600	0,1	4	2,3	215	4300	
		урацил			0,2	24 ч.	23	38,4	480	0,2	24 ч.	52	12	240
		5-бромурацил			0,2	24 ч.	33	33,6	420	0,2	24 ч.	66	10	200
	контроль			—	—	100	8	100	—	—	100	5	100	

В этой таблице для сравнения приведены результаты изучения мутагенного действия урацила и его аналога—5-бром урацила. Не трудно заметить, что эти основания, изучаемые даже при жестком режиме обработки (высокая доза и продолжительная обработка), оказывают слабое ингибирующее действие на клетки и споры. При высоком проценте выживаемости они индуцируют обратные мутации всего лишь в 4,2—4,8 раза больше контроля.

На рисунке показано летальное и мутагенное действие двух соединений, оказывающих наиболее сильное действие (в зависимости от времени обработки объектов). Из кривых рисунка видно, что по мере увеличения экспозиции обработки мутагенных штаммов N'-(4-бутоксibenзил)-5,6-дигидротиоурацилом (№ 11) и N'(4-этоксibenзил)-5-метил-5,6-дигидротиоурацилом (№ 19) снижается процент выживаемости клеток и спор и одновременно увеличивается частота встречаемости ревертантов. Следует, однако, отметить, что увеличение частоты встречаемости ревертантов наблюдается до определенного предела времени обработки и зависит от объекта и мутагена. Более продолжительная экспозиция, как видно из рисунка, приводит к заметному снижению процента выживаемости и к уменьшению активности мутагена.

Рассматривая полученные результаты с точки зрения связи строения исследуемых N'-замещенных дигидроурацилов и тиоурацилов с их генетическим действием, можно прежде всего отметить избирательность действия их. Эти соединения, как показали опыты, оказывают более сильное мутагенное действие на треониновый локус, чем на лизиновый локус актиномицетов. Введение в пятое положение пиримидинового кольца метильной группы приводит к заметному усилению мутагенного эффекта в отношении треонинового локуса у соединений третьего и четвертого гомологических рядов по сравнению с теми, у которых подобное замещение не сделано.

Мутагенное действие указанных соединений усиливается и в тех случаях, когда во втором положении пиримидинового кольца кислород замещен серой.

Удлинение алкокси-радикала у испытуемых соединений, начиная с пропокси-радикала, приводит к усилению мутагенного эффекта у первых трех рядов. В четвертом ряду наблюдается отклонение от этого правила, здесь существенное увеличение активности наблюдается начиная с этокси-радикала.

Таким образом, изучение мутагенного действия N'-замещенных дигидроурацилов и тиоурацилов на биохимических мутантах показало, что многие из них обладают в той или иной степени мутагенным действием и значительно превосходят урацил и 5-бром урацил. Выраженное мутагенное действие выявлено у N'-(4-бутоксibenзил)-5,6-дигидротиоурацила и N'(4-этоксibenзил)-5-метил-5,6-дигидротиоурацила, которые генетически опасны в качестве лечебных средств, но могут быть полезны в селекционной работе.

Գ. Մ. ՊԱՐՈՆԻԿՅԱՆ, Մ. Հ. ԿԱԼԴՐԻԿՅԱՆ, Գ. Ա. ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ,
Է. Հ. ԹՈՒՄԱՍՅԱՆ

N⁻-ՏԵՂԱԿԱԿԱՍԾ ԴԻՀԻԴՐՈՈՒՐԱՑԻԼՆԵՐԻ ԵՎ ԹԻՈՈՒՐԱՑԻԼՆԵՐԻ
ՍՈՒՏԱԳԵՆ ԱԳՂԵՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա մ փ ո փ ու մ

Ուսումնասիրվել է N⁻-տեղակալված դիհիդրոուրացիլների և թիոուրացիլների 22 նոր ածանցյալների մուտագեն ազդեցությունը: Իբրև օբյեկտ ծառայել են կենսաքիմիական մուտանտներ՝ *Escherichia coli* P-678 (thr⁻) և *Actinomyces rimosus* 222 (lys⁻): Միացությունների մուտագեն ազդեցությունը որոշվել է ինդուկցված ռեվերտանտների հաճախականությամբ՝ դոզա-էֆեկտ մեթոդով: Առավելապես ակտիվ գտնվեցին N⁻-(4-թութօքսիբենզիլ)-5,6-դիհիդրոթիոուրացիլ և N⁻-(4-էթօքսիբենզիլ)-5-մեթիլ-5,6-դիհիդրոթիոուրացիլ, որոնք ինդուկցում են մեծ հաճախականությամբ մուտացիաներ և իրենց ակտիվությամբ գերազանցում են ուրացիլին և 5-բրոմուրացիլին:

Ուսումնասիրվել է նաև քիմիական միացությունների կառուցվածքի և նրանց մուտագեն ազդեցության միջև եղած կապը:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Гудкова Э. В., Митрофанов Ю. А., Шавельсон Р. А. Изв. АН СССР, сер. биол., 4, 508—514, 1970.
2. Простакова Р. А. Экспериментальный мутагенез у микроорганизмов и его практическое использование, М., 1966.
3. Скавронская А. Г. Мутация у бактерий, М., 1967.
4. Тимаков В. Д., Скавронская А. Г., Андреева И. В., Борисова Н. Б. Экспериментальный мутагенез у микроорганизмов и его практическое использование, М., 1966.
5. Фриз Э. Молекулярная генетика. 1, М., 1964.
6. Аксамитная И. А. Вопросы онкологии, 10, 29—35, 1963.
7. Вольфсон Н. И. Вопросы онкологии, 4, 235—244, 1963.
8. Калдрикян М. А., Ароян А. А. Арм. хим. журн., 27, 1031—1036, 1974.
9. Пароникян Г. М., Акопян Л. Г., Тумасян Э. А., Дарбинян Г. А. Генетика, 11, 10, 105—110, 1975.