

Հ. Հ. ՏՈՆԱԿԱՆՅԱՆ, Հ. Ս. ՍԵՐՈՐՅԱՆ

ԱՎԵԱՐԿԻ ՀՅՈՒՍԻՍԱՑԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ՇԻՐԱՅԱԿՆԵՐԻ ՖԼՈՐԻՍՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՄԱՍԻՆ

Հոգվածը նվիրված է Հայկական ՍՍՀ հյուսիսային մասում տարածված շիբլյակների ֆլորիստական կազմի ուսումնասիրությանը:

Բուսականության այդ տիպը հանդիպում է Իջևանի, Շամշադինի, Նոյեմբերյանի և Ալավերդու շրջանների անտառային գոտու ստորին շրջ, քարքարոտ լանջերին, ծովի մակերևույթից 450—1100 մետր բարձրության վրա:

Նշարկացվում է, որ Հայաստանում շիբլյակները ունեն երկրորդային ծագում և առաջացել են լայնատերև անտառների ոչնչացումից, որտեղ գերիշխում էր *Quercus iberica* Stev.

Բալկանյան ժողովուրդները շիբլյակ անվանել են թփուտատեսակներից: և ոչ մեծ ծառատեսակներից համադրված բուսական այն համակեցությանը, որը հիմնականում տարածված է շրջ, քարքարոտ լեռնալանջերին 400-ից 1000, իսկ որոշ վայրերում նույնիսկ 1200 մետր բարձրություններում:

Նման բուսական համակեցություններ հանդիպում են ինչպես Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներում, այնպես էլ Անդրկովկասում և մասնավորապես Հայաստանում: Վերջինիս հյուսիսային շրջաններում կատարած մեր դիտողությունների հիման վրա կարող ենք ասել, որ շիբլյակ կոչվող այս բուսական համակեցությունը տարածված է Իջևանի, Շամշադինի, Նոյեմբերյանի, Ալավերդու շրջաններում՝ շրջ, քարքարոտ սարավանջերին, անտառային գոտու ցածրադիր վայրերում (ուր տեղի է ունեցել առաջնային բուսականության ոչնչացումը մարդու, կենդանիների և այլնի կողմից), 450-ից 1100 մետր բարձրությունների սահմաններում:

Հոգվածում բերվում են 1974—1975 թթ. հունիս—հուլիս ամիսներին կատարած մեր դիտողությունների արդյունքները:

Շիբլյակներում յուրահատուկ և գերիշխող բուսատեսակ է համարվում ցաթին (*Paliurus spina christi* Mill.), որն իրենից ներկայացնում է փշոտ, խիստ ճյուղավորված, հզոր արմատային սխտեմով թուփ: Այն, ինչպես նշել են որոշ հեղինակներ [1—9] արագ բազմանում է ինչպես պտուղների տարածման, այնպես էլ վեգետատիվ բազմացման միջոցով:

Հիմնվելով նշված շրջաններում տեղագրիտական շրջագալությունների ընթացքում կատարած մեր ուսումնասիրությունների վրա, հարկ համարեցինք համառոտ ակնարկ տալ շիբլյակի բուսական կազմի վերաբերյալ, առայժմ չշրջափելով նրա էկոլոգիական և գեոբուսաբանական առանձնահատկությունները:

Այսպես՝ Իջևանի շրջանում, որտեղ շիբլյակները լայն տարածում ունեն, դիտողությունների համար ընտրեցինք երկու հողազանգվածներ: Առաջին հողազանգվածը գտնվում էր Կրասնոսելակ տանող կամուրջից դեպի Իջևան

150 մ հեռավորության վրա, Աղստե գետի ձախակողմյան սարալանջում: Այստեղ թփուտատեսակներից աճում են *Paliurus spina christi* Mill., *Rosa tomentosa* Sm., *R. spinosissima* L., *Astragalus* sp., իսկ ծառատեսակներից՝ *Zelkova carpinifolia* (Pall) Dipp., *Carpinus orientalis* Mill., *Ulmus subarosa* Moench., *Juniperus oblonga* M. G., *Juniperus excelsa* M. B.:

Խոտաբույսերից՝ 30-ից ավելի տեսակներ, որոնցից գերիշխում են՝ *Xeranthemum squarrosum* Boiss., *Achillea micrantha* M. B., *Inula cordata* Boiss., *Teucrium orientale* L., *T. polium* L., *Sideritis montana* L., *Salvia sclerea* L., *Tripleurospermum inodorum* (L.) Sch. Bip., *Erysimum cuspidatum* (M. B.) DC., *Plantago lanceolata* L., *Melilotus officinalis* (L.) Dsc., *Ajuga chla* (Poir) Schreb. *Linaria armeniacae* Chav., *Galium verum* L., *Convolvulus cantabrica* L.:

Այս հողազանգվածի բուսականության ծածկը կազմում է 3,5—4 բալ:

Ուսումնասիրվող երկրորդ հողատարածությունը գտնվում է Հափկիսու գյուղից դեպի Իջևան՝ 550 մ հեռավորության վրա, Աղստե գետի ձախակողմյան սարալանջում: Այստեղ, բացի նախորդ հողազանգվածում նշված թփուտներից, առկա են նաև *Rhamnus pallasii* F. et M., *Lonicera caucasica* Pall., *Spirea crenata* L., *Jasminus fruticans* L. տեսակները: Ծառատեսակներից տարածված են *Quercus iberica* Stev., *Carpinus orientalis* Mill., *Zelkova carpinifolia* (Pall) Dipp., որոնք բուսականության ընդհանուր ֆոնում հանդիսանում են էփիֆիտատորներ, իսկ *Juniperus* L. լրիվ բացակայում է: Այստեղ 30-ի հասնող խոտատեսակներից աչքի են ընկնում *Xeranthemum squarrosum* Boiss., *Achillea micrantha* M. B., *Achillea millefolium* L., *Teucrium polium* L., *Sideritis montana* L., *Salvia sclerea* L., *Tripleurospermum inodorum* (L.) Sch. Bip., *Achillea setacea* Waldst. et Kit., *Alyssum hirsutum* M. B., *Scutellaria orientalis* L., *Tragopogon dubius* Scop.

Բուսականության ընդհանուր ծածկը կազմում է մոտավորապես 4 բալ:

Այլ պատկեր են ներկայացնում շիրլանները Ալավերդու շրջանում, որտեղ մեր դիտողությունների համար որպես առաջին հողազանգված ընտրեցինք Կիրովականից դեպի Ալավերդի տանող ճանապարհի 20-րդ կմ-ի վրա գտնվող Դեբեդ գետի ձախակողմյան սարալանջի հյուսիս-արևելյան դիրքադրումը: Այստեղ բացի ցաքուց, թփուտատեսակներից առկա էին նաև *Prunus spinosa* L., *Crataegus orientalis* Pall., *Spirea crenata* L., *Rhamnus pallasii* F. et M., *Cotoneaster racemiflora* (Dsf) Koch., *Carpinus orientalis* Mill., *Astragalus* sp.:

Ծառատեսակներն այստեղ բոլորովին բացակայում են: Համեմատաբար ավելի շատ են տարածված խոտաբույսերը (մոտ 45 տեսակ), որոնցից գերիշխում են *Achillea micrantha* M. B., *Teucrium polium* L., *Sideritis montana* L., *Filipendula hexapetala* Gilib., *Brassica elongata* L., *Alyssum hirsutum* M. B.:

Այստեղ բուսականության ընդհանուր ծածկը կազմում է 4 բալ:

Այս շրջանում մեր ընտրած երկրորդ հողազանգվածը Ալավերդուց 12 կմ հեռավորության վրա գտնվող, Դեբեդ գետի ձախակողմյան սարալանջում է, որտեղ, նախորդ հողազանգվածի համեմատությամբ, կլիմայական պայմաններն ավելի չորային են: Այստեղ նույնպես ծառատեսակները լրիվ բացակայում են, իսկ թփուտատեսակներից աճում է միայն ցաքին: Խոտաբույսերի

տեսակային կազմը նույնպես աղքատ է (15-ից ավելի), որոնցից ավելի տարածված են *Achillea micrantha* M. B., *Ajuga chla* (Poir) Schreb., *Teuclium pollum* L., *Gypsophylla heteropoda* Freyn., *Reseda lutea* L., *Lisaea heterocarpa* (DC) Bolss., *Myosotis arvensis* (L.) Hill., *Allyssum hirsutum* M. B.:

Այս հողազանգվածի բուսականության ընդհանուր ծածկոցը կազմում է 3 բալ:

Երրորդ հողազանգվածը, որ ընտրեցինք Ախթալսի կայարանի ցուցատախտակի մոտ՝ Դերեղ գետի աջակողմյան սարալանջում, ունեն համեմատաբար խոնավ պայմաններ: Ի տարբերություն առաջին և երկրորդ հողազանգվածների, այստեղ աճում են նաև հետևյալ ծառատեսակները՝ *Quercus iberica* Stev., *Acer. trautvetteri* Medw., *Acer laetum* C. A. M., *Zelkova carpinifolia* (Pall) Dipp., որոնք և բուսականության ընդհանուր ֆոնում հանդիսանում են էդիֆիկատորներ: Իսկ թփուտատեսակներից տարածված են *Pallurus spina christi* Mill., *Robus celsius* L.:

Ինչ վերաբերում է խոտային ծածկին, ապա այստեղ նշեցինք մինչև 30 տեսակ, որոնցից գերիշխում են *Achillea micrantha* M. B., *Lamium album* L., *Origanum vulgare* L., *Plantago lanceolata* L., *Tripleurospermum inodorum* (L.) Sch. Bip., *Convolvulus cantabrica* L., *Calystegia sepium* L.) R. Br., *Urtica dioica* L., *Gallium verum* L., և այլն: Այս հողազանգվածի բուսական ծածկոցը կազմում է 4 բալ:

Շիրլյակների հանդիպում ենք նաև Նոյեմբերյանի շրջանում, որտեղ դրանք տարածված են համեմատաբար ավելի քիչ: Առաջին հողազանգվածը ընտրեցինք Իջևանից դեպի Նոյեմբերյան 18 կմ հեռավորության վրա գտնվող ճանապարհի ձախակողմյան սարալանջի հյուսիս-արևելյան հատվածում: Այստեղ, բացի ցաթուց, թփուտատեսակներից տարածված են նաև *Crataegus orientalis* Pall., *Rhamnus pallasii* F. et M.: Ծառատեսակները նշված վայրում բացակայում են, իսկ խոտաբույսերից, որոնց տեսակների թիվը հասնում է մինչև 30-ի, գերիշխում են *Achillea millefolium* L., *Coronilla varis* L., *Medicago sativa* L. et Vass., *Brunelia laciniata* (L.) Bge., *Trifolium campestre* Schreb., *Melampyrum arvense* L., *Fragaria vesca* L., *Agrimonia eupatoria* L., *Polygala anatolica* Bolss et Heldr., *Scabiosa micrantha* Dsf., *Cynanchum laxum* Bartl., *Campanula grossheimii* A. Char., *Ornithogalum areuatum* Stev., *Potentilla recta* L., *Inula germanica* L.:

Այստեղ բուսականության հիմնական ծածկոցը կազմում է 4 բալ:

Երկրորդ հողազանգվածը գտնվում է Նոյեմբերյանից 8 կմ հեռավորության վրա գտնվող ճանապարհի աջակողմյան սարալանջի հարավ-արևմտյան հատվածում: Այստեղ, ինչպես նախորդ հողազանգվածում, ծառատեսակները բացակայում են, իսկ թփուտատեսակներից աճում են նաև *Crataegus orientalis* Pall., *Rhamnus pallasii* F. et M.:

Ինչ վերաբերում է խոտաբույսերին, ապա դրանց թիվը հասնում է 20-ի, որոնցից գերիշխում են *Xeranthemum squarrosum* Bolss., *Achillea micrantha* M. B., *Lapsana intermedia* M. B., *Thalictrum minus* L., *Asparagus verticillatus* L., *Eryngium nudromontanum* Bolss et Buche.

Այստեղ բուսականության ծածկոցը կազմում է 3,5 բալ:

Շիրլաններ հանդիպում են նաև Շամշադինի շրջանում, որտեղ դրանք նույնպես լայն տարածում չունեն: Դիտողությունների համար որպես առաջին հողազանգված ընտրեցինք Իջևանից Բերդ տանող ճանապարհի խաչմերուկից 3 կմ հեռավորության վրա գտնվող, ճանապարհի ձախակողմյան սարալանջի հարավային հատվածը: Այստեղ, նախորդ շրջանի համեմատությամբ, բուսականության ծածկույթը բավական նոսր է և ծառատեսակները բացակայում են, իսկ բուսականության ընդհանուր ֆոնը արտահայտված է միայն ցածրվ: խոտաբույսերից նշեցինք մոտավորապես 19 տեսակ, որոնցից գերիշխում են *Tripleurospermum parviflorum* (Willd) Pobed., *Achillea micrantha* M. B., *A. setacea* Waldst. et Kit., *Teucrium pollum* L., *Stachys intermedia* Alt., *Ajuga chia* (Poir) Schreb., *Origanum vulgare* L., *Consolida orientalis* (J. Gay) Schröd., *Adonis flammæ* Jaq., *Mellilotus officinalis* (L.) Dsr., *Medicago sativa* L. em Vass., *Eryngium campestre* L., *Plantago lanceolata* L.:

Բուսականության ծածկոցը կազմում է ընդամենը 3 բալ:

Հետևյալ հողազանգվածում, որը ընտրեցինք նույն սարալանջի հյուսիսային հատվածում, ի տարբերություն նախորդի, աճում են նաև *Rhamnus pallasii* F. et M., *Spirea crenata* L., *Crataegus prientalis* Pall. Ինչ վերաբերում է խոտաբույսերին, ապա դրանց տեսակների թիվը հասնում մոտավորապես 18-ի, որոնցից աչքի են ընկնում *Xeranthemum sparrosom* Boiss., *Teucrium pollum* L., *Sideritis montana* L., *Origanum vulgare* L., *Gallium verum* L., *Anagallis arvensis* L.: *Scabiosa micrantha* Dsf. և այլն:

Բուսականության ընդհանուր ծածկոցը կազմում է 4 բալ: Հիշյալ վայրի երրորդ հողազանգվածը գտնվում է պահածոյի գործարանի դիմացի սարալանջի հարավ-արևմտյան հատվածում: Այստեղ ծառատեսակները բացակայում են, իսկ թփուտատեսակներից առկա են *Pallurus spina christi* Mill և *Spirea crenata* L.:

Խոտաբույսերի տեսակների թիվը այստեղ հասնում է մինչև 20-ի, որոնցից ավելի շատ տարածված են *Xeranthemum squarrosom* Boiss., *Achillea micrantha* M. B., *A. millefolium* L., *Teucrium orientale* L., *Medicago sativa* L., *Polygala anatolica* Boiss. et Heldr., *Sideritis montana* L., *Fragaria vesca* L., *Euphorbia arvalis* Boiss et Heldr., *Thymus orientalis* L., *Cynanchum scandens* (S ef L.) Kusn., *Campanula donontensis* L.:

Այս հողազանգվածի բուսականության ծածկույթը կազմում է 4 բալ:

Շրջագայություններ կատարեցինք նաև Ամասիայի, Ստեփանավանի, Ղուկասյանի շրջաններում: Սակայն այս շրջաններում շիրլաններ բուրգով չկան:

Այսպիսով, փ մի բերելով դիտողություններից ասացված տվյալները, կարող ենք ասել, որ հյուսիսային Հայաստանում տարածված շիրլաններն ունեն երկրորդային ծագում և առաջացել են լայնատերև անտառների ոչնչացումից, որտեղ գերիշխում էր կաղնի վրացականը՝ *Quercus iberica* Stev.:

Երևանի պետական համալսարան

Ստացված է 20. I 1976 թ.

Г. А. ТОНАКАНЯН, Г. А. СЕРОБЯН

ОЧЕРК О ФЛОРИСТИЧЕСКОМ СОСТАВЕ ШИБЛЯКА
В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ

Резюме

Проведено рекогносцировочное исследование растительности шибляка северных районов Армянской ССР. Установлено, что шибляк распространен в Иджеванском, Ноемберяпском, Шамшадинском и Алавердском районах и является вторичным, возникшим на основе уничтожения широколиственных лесов. Во флористическом отношении шибляки Северной Армении довольно разнообразны.

Դ Ր Ա Շ Ա Ն Ո Ւ Ք Յ Ո Ւ Ն

1. Липский В. И. Тр. тифл. бот. сада 4:7.—116, 1899.
2. Магакьян А. К. Растительность Арм. ССР. М.—Л., 1941.
3. Гроссгейм А. А. и Поликко Л. И. Тр. по геоб. обл. пастб. Азерб. сер. А., вып. 4, Баку, 1929.
4. Тахтаджян А. Л. Тр. Бот. ин-та Арм. фил. АН СССР, т. II. Ереван, 1941.
5. Тахтаджян А. Л. Тр. Бот. ин-та Арм. АН СССР, 4:51—107, Ереван, 1946.
6. Тахтаджян А. Л. и Федоров А. А. Флора Еревана, Ленинград, 1972.
7. Ярошенко П. Д. Изв. Арм. фил. АН СССР 7(2), 1942.
8. Махатадзе Л. Б. Тр. Кироваканск. опытной станции I, 1941.
9. Троицкий Н. А. Влияние человека на растительность в бассейне верхнего течения реки Памбак, Ереван, 1935.