

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 598.7.742

О НАХОЖДЕНИИ ХОХЛАТОЙ КУКУШКИ
(CLAMATOR GLANDARIUS L.) В АРМЕНИИ

М. С. АДАМЯН

По данным литературы [1, 2], гнездовым ареалом хохлатой кукушки является Западная Европа, Африка, Малая Азия, Ирак и Иран.

В окрестностях села Мехмандар Масисского района 10 июня 1978 года был добыт самец хохлатой кукушки.

Село Мехмандар расположено в долине Аракса, в 15 км к югу от Еревана. Долина Аракса характеризуется полупустынным ландшафтом и континентальным климатом. Плодородные земли полностью освоены под сельскохозяйственные культуры.



1. Хохлатая кукушка.

Птица была добыта на иве у берега реки Севджур участником нашей экспедиции В. Оганджяном. При подходе человека с ружьем она не проявила внешних признаков беспокойства.

В пределах Советского Союза были отмечены три случая залета этого вида: дважды в Молдавии—в 1840 г.—Нордманом и 27 июня 1914 г.—Парамоновым [1], а также в Туркменинии близ Кушки [2]. Наиболее вероятным путем проникновения этой птицы в Армению является Малая Азия и Иран.

При вскрытии птицы мужские половые органы оказались в стадии покоя. Промеры добытой хохлатой кукушки таковы: длина крыла—218 мм, тела—195 мм, клюва—27 мм, хвоста—237 мм, вес—150 г. Промеры гонад: левый семенник—1×3 мм, правый—1×2 мм.

Окраска оперения нашего экземпляра хохлатой кукушки в целом соответствует описаниям этой птицы, приведенным в литературе [1]. Голова птицы черно-бурая с небольшим хохолком, глаза и клюв—темные, спинная сторона—темно-бурая с крупными белыми пятнами на кроющих крыла, первостепенные маховые—темно-коричневые, горло, часть шеи и зоб—белые с охристым налетом, брюхо, грудь и подхвостье—белые, подмышечные перья—бледно-охристые, ноги и когти—темно-бурые. (рис.).

Таким образом, хохлатая кукушка, добытая в Армении, впервые зарегистрирована в Закавказье. Чучело птицы хранится в музее Института зоологии АН АрмССР.

Институт зоологии АН АрмССР

Поступило 5.VI 1978 г.

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՓՈՒՓՈՒՎԱՎՈՐ ԿԿՎԻ
(CLAMATOR GLANDARIUS L.) ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Մ. Ս. ԱԴԱՄՅԱՆ

1978 թվականի հունիսի 10-ին Մասիսի շրջանի Մելմանդար գյուղի ծայրամասերում մեր կողմից հայտնաբերվել է արու փոփոխված կկվի մեկ անհատ: Թռչունի գունավորումը և մարմնի չափերը հիմնականում համընկնում են գրականության մեջ բերված համապատասխան նկարագրի և չափերի տվյալների հետ:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Дементьев Г. П. и Гладков Н. А. Птицы Советского Союза, I, М., 1951.
2. Иванов А. И. Каталог птиц СССР. Л., 1976.