

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ БОБОВЫХ (ФАВАСЕЛЕ)  
 В АРМЕНИИ

Н. Г. АРЕВШАТЯН

После выхода в свет обработки семейства Fabaceae для «Флоры Армении» (т. 4, 1962), гербарий БИН АН АрмССР значительно пополнился новыми сборами. При определении накопившегося материала были выявлены как некоторые новые для флоры Армении виды из семейства бобовых, так и новые местонахождения. Гербарные образцы хранятся в гербарии Института ботаники АН АрмССР (ERE) под соответствующими номерами.

*Lathyrus setifolius* L. Новый вид для флоры Армении, редкий на Кавказе, до настоящего времени найден только в Карабахе. находка этого вида из Кафанского района подтвердила предположение С. Г. Тамашян о возможности нахождения его в Зангезуре [3]. Впервые собран: Кафанский район, Шикахохский заповедник, гора Махин, 1000 м над ур. м., 21.5.59, М. Григорян, № 110538, 110539.

*Lathyrus apicius* L. Новый вид для флоры Армении, в пределах Кавказа известен из Восточного Кавказа, Восточного Закавказья и Талыша. По данным «Флоры Армении», считается возможным его нахождение в республике. Впервые собран: Кафанский район, Шикахохский заповедник, с. Неркин Анд, «Сектар», восточный склон, 730 м над ур. м., 27.6.60, М. Григорян; № 110536.

*Lathyrus pallescens* (Bieb.) С. Koch. Этот вид приводился лишь для Севанского, Ереванского, Гегамского флористических районов. В действительности же он широко распространен в республике. Обнаружено это растение в В. Ахурянском, Пиджеванском, Апаранском, Арагацском, Даралегизском флористических районах: № 61792, 108979, 108984, 108981, 108982, 108982, 108987, 108985, 108750.

*Trifolium sebastianii* Savl. Редкий вид для флоры Кавказа, известный из Восточного, Западного и Юго-западного Закавказья, где встречается спорадически [1, 3]. Во «Флоре Армении» Н. В. Мирзоева считает возможным его нахождение в республике. В Армении впервые собран: Кафанский район, западная окраина с. Чакатен, смешанный лес, на прогалинах в лесу, 1750—1900 м над ур. м., 12.6.66, В. Манакян, № 110018

*Trifolium phleoides* Pourr. ex Willd. В ERE хранится лишь один образец этого вида—из Мегринского района. Был известен также

по сборам Липского из Гориса [2]. Новое местонахождение—Кафанский район, западная окраина с. Чакатен, смешанный лес, на прогалинах, 12.6.66. В. Манакян; № 110013.

*Trifolium echinatum* Vieb. Ранее был известен из Зангезура и Мегри. Новое его местонахождение, отдаленное от известного пункта произрастания, Ноемберянский район, с. Ламбалу, окр. питомника, 22.7.60, Э. Габриэлян, В. Аветисян; № 110007.

*Oxytropis pilosa* (L.) DC. Редкое для флоры Армении растение. Во «Флоре Армении» приводится для Севана и Зангезура. В настоящее время оно найдено в Лорийском и Гегамском флористических районах: Спитакский район, берег реки Дебет, гора Товшанджих, 15.6.77, Э. Габриэлян; № 110529; Арагатский район, северо-восточный макросклон г. Кётуз, к северу от с. Даштакар, 1500--2100 м над ур. м., 15.6.77, И. Аревшатян; № 110530.

*Lens orientalis* (Boiss.) Schmalh. Новинка для Даралегизского и Мегринского флористических районов. В пределах Армении этот вид приводился лишь для Ереванской котловины. Новые местонахождения: Микоянский район, между сс. Шатып и Гетап, 18.6.57, В. Аветисян, Э. Габриэлян, № 109254, 109255; Мегринский район, Шванидзор, 6.6.77, Я. Мулкиджанян, В. Манакян, № 90664; Мегринский район, сухие склоны в окр. с. Ньюади, 28.5.77, И. Аревшатян, № 110074.

*Onorbychis busheana* Vunge. Изгетен с Гегамского хребта, из Ереванской котловины и Даралагиза. Собран впервые в Ширакском флористическом районе: между г. Талин и с. Кармрашен, горная степь, скалы, 1.6.64, Я. Мулкиджанян; № 109926.

*Hedysarum caucasicum* Vieb. Новинка для Даралегизского и Апаранского флористических районов: Ехегнадзорский район, окр. с. Гядикванк, 23.7.73, К. Таманян, Н. Ханджян, № 109954; Разданский район, вершина горы Техенис (Алибек), юго-западный скалистый склон, 1896 м над ур. м., 7.8.1978, Н. Ханджян; № 111970.

Институт ботаники АН АрмССР

Поступило 24.II 1979 г.

## ՖԱԲԱՍԱԿԱՆ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ FABACEAE ՀՆՏԱՆԻՔԻՑ

Բ. Գ. ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ

Հոդվածում բերվում են Fabaceae ընտանիքից Հայաստանում քիչ հանդիպող 8 տեսակների համար աճման նոր վայրեր:

### Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Гроссгейм А. А. Определитель растений Кавказа. М., 1949.
2. Еленевский А. Г. Канд. дисс., М., 1964
3. Флора Армении. 4, Ереван, 1962.
4. Флора Еревана. Л., 1972.