

CAMPANULA RAPUNCULOIDES И CAMPANULA
GLOMERATA L. В ЮЖНОМ ЗАКАВКАЗЬЕ

М. Э. ОГАНЕСЯН

На территории Южного Закавказья из видов *Campanula rapunculoides* L. и *C. glomerata* L. различными авторами выделено множество разновидностей и видов. По последним сводкам, в этом регионе произрастают три вида ряда *Rapunculoideae* Charadze: *C. rapunculoides* L., *C. cordifolia* C. Koch и *C. grossheimii* Charadze, и два вида ряда *Glomeratae* Charadze: *C. oblongifolia* (C. Koch) Charadze и *C. trautvetteri* Grossh. ex Fedor. Эти виды изучены нами в природе и на материале гербариев БИН АН СССР (LE), Института ботаники АН Арм. ССР (ERE), АН ГрузССР (ТБИ), АН АзербССР (БАК) и Государственного музея Грузии (TGM). Исследования показали, что все диагностические признаки указанных видов варьируют в широких пределах и без корреляции с географическим распространением. *C. cordifolia* и *C. grossheimii* являются безареальными экологическими формами широко распространенного полиморфного вида *C. rapunculoides*, *C. oblongifolia* и *C. trautvetteri* — безареальными экологическими формами широко распространенного полиморфного вида *C. glomerata*. Между формами наблюдаются все переходы. *C. cordifolia* C. Koch и *C. grossheimii* Charadze отнесены в синонимы вида *C. rapunculoides* L. а *C. oblongifolia* (C. Koch) Charadze и *C. trautvetteri* Grossh. ex Fedor. — в синонимы вида *C. glomerata* L.

13 с., библиогр. 18 назв.

Институт ботаники АН АрмССР

Поступило 14.V 1980 г.

Полный текст статьи депонирован в ВНИИТИ